

BOUNDED 1939

HARVARD UNIVERSITY



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

9416

EXCHANGE

147.1

Jan. 21, 1884

Beiträge zur Naturkunde Preussens

herausgegeben

von der

physikalisch-ökonomischen Gesellschaft
zu Königsberg.

4.

Catalog der Preussischen Käfer

neu bearbeitet

von

Prof. Dr. Lentz.

(Preis 2,50 Mark.)

Königsberg 1879.

In Commission bei W. Koch.



Beiträge zur Naturkunde Preussens

herausgegeben

von der

physikalisch-ökonomischen Gesellschaft

zu Königsberg.

4.

Catalog der Preussischen Käfer

neu bearbeitet


von

Prof. Dr. Lentz.

(Preis 2,50 Mark.)

Königsberg 1879.

In Commission bei W. Koch.



Catalog der preussischen Käfer.

Nach den gewaltigen Leistungen von Gemminger und v. Harold (Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum 1868—71), nach dem neuen Catalog von Stein und Weise (Berlin 1877) ist auch eine neue Bearbeitung des Verzeichnisses der preussischen Käfer nothwendig geworden. In dem früher von mir (Königsb. 1857) herausgegebenen Catalog stehen begreiflicherweise viele Irrthümer, welche durch neuere Forschungen beseitigt sind, und die vier in diesen Schriften erschienenen Nachträge enthalten, abgesehen von der Unannehmlichkeit der Zerstückelung so manche Behauptungen, die wieder zurückgenommen oder wenigstens modifizirt werden mussten. — In Beziehung auf die Quellen unserer Kenntniss verweise ich auf das Vorwort meines früheren Verzeichnisses. Ich habe mir zu der vorliegenden Arbeit das vortreffliche Verzeichniß der Käfer Schlesiens von K. Letzner Breslau 1871 (Zeitsch. für Schles. Insektenkunde Heft 2; Nachtrag 1876 Heft 5) zum Muster genommen: nur habe ich geglaubt diejenigen Sammler namentlich anführen zu müssen, welche die Käfer entweder selbst gefunden haben oder wenigstens wissen, dass und von wem sie gefunden sind. Wenn man das Faunagebiet Schlesiens mit dem der beiden preussischen Provinzen vergleicht, so sollte man meinen, dass, sowie das Areal Preussens (etwa 1172 [J.M.]) um 332 grösser ist als das Schlesiens, so auch die Anzahl der Käferspecies höher wäre. Das ist nun nicht der Fall. In Schlesien sind Ende 1875 nach Letzner 4159 Species gezählt worden, in Preussen jetzt etwa 3250. Der Grund dieser Erscheinung liegt auf der Hand. Was die Verschiedenheit der Bodenbeschaffenheit betrifft, so möchte wohl die Gebirgsfauna Schlesiens der Seeflora Preussens entsprechen: aber Schlesien ist bedeutend besser durchforscht als unser Land, und namentlich ist der Sinn für coleopterologische Forschungen dort entschieden reger; man lese das Vorwort Letzners p. XIII bis XXIV. Bei uns ist es dem gewöhnlichen Manne noch immer unbegreiflich, wie man ohne materiellen Gewinn am Suchen und Forschen nach Insekten Freude haben kann, und angestaunt wird, wer etwa in einem Pilzenhaufen oder unter welkem Laube etwas sucht. Im Letzner'schen Verzeichnisse findet man aus den verschiedensten Gegenden Schlesiens Angaben: von den 55 Kreisen Preussens kann man nur etwa 6 zählen, die einigermassen durchforscht sind, und auch aus diesen wird jährlich noch eine ziemliche Anzahl neu aufgefunder Käfer angegeben. Im Norden ist die Fauna der Gegend von Königsberg und Danzig bekannt geworden durch die Bemühungen der Herren s. h. t. v. Siebold, v. Frantzius †, Andersch †, Steffahny †, Bogeng †, v. Dommer, Kumm, Helm,

Fritzen, Elditt †, Sauter, Kuwert, Schiefferdecker, Künow, Pfeil †, Seydler, Steiner, Dossow, Czwalina; in der Mitte der Provinz Osterode und Allenstein (Kugelann † 1815, dessen reiche Sammlung leider verschollen ist, woher die in seinen noch vorhandenen Manuscripten niedergelegten Namen zum grossen Theil nicht mehr deutungsfähig sind), Pr. Stargard (Schmidt Pr. Prov. Blätter 1839 p. 563); im Süden Gilgenburg (Kramer), Lyck (Sanio). Was die mächtigen Forsten und Seen des Ostens und Südwestens bieten, ist bis jetzt noch keinem Sterblichen kund geworden. Sollte also die Behauptung, dass in unserm Lande noch Hunderte von Species aufgefunden werden können, zu gewagt erscheinen? zumal da auch die Forschungen des preuss. botan. Vereins in den Kreisen Carthaus, Dt. Crone, Flatow, Allenstein schon jetzt eine beträchtliche Zahl von bisher nicht in Pr. gefundenen Pflanzen ergeben haben. Dass nun andererseits die Freude am Sammeln und Bestimmen des gesammelten Materials durch die unselige Verwirrung, die in neuerer Zeit in die Wissenschaft hingekommen ist, sehr verkümmert wird, ist ebenso betrübend als unleugbar. Man vergleiche den ehemaligen doch recht werthvollen Schaumschen Catalog der Käfer Europas 1859 mit dem jetzigen von Stein u. Weise 1877, man lese die Bemerkungen, Vorschläge, Erweiterungen und Erläuterungen dazu in der Deutschen entom. Zeitschrift XXII p. 161—196, ferner bei Katter in den entomol. Nachrichten, und man wird gestehen müssen, dass wir in ein Labyrinth von Genus-, Species- und Varietätennamen geführt werden, aus dem schwerlich ein Ariadnefaden uns herausführen möchte. Die consequente Durchführung des Prioritätsprincips ist wissenschaftlich wohl begründet, allein das Bedenken und die Warnung v. Kiesewetters l. c. p. 177 ist doch auch wohl zu beherzigen, und ich verstehe nicht, wie v. Harold die Nomenclatur des Catalogs vollständig aufrecht erhalten will, wie er p. 196 verspricht: leider sehen wir einer end- und zwecklosen Polemik entgegen. Wer vermuthet den allbekannten Omias hirsutulus Fabr. unter dem Namen Platytarsus echinatus Bonsd.? wer sucht den Lathridius liliputanus Mannh. unter Cartodere ruficollis Marsh.? Unter diesen Umständen habe ich es für zweckmässig gehalten, möglichst die bisher gebrauchten bekannten Namen beizubehalten; der Anordnung des neuen Catalogs bin ich aber gefolgt. Sehr oft wiederkehrende Namen von Localitäten habe ich abgekürzt; die wesentlichsten sind folgende:

Dz. = Danzig.

Fchst. = Friedrichstein bei Königsberg.

F. F. = Fritzensche Forst im Samlande.

Heub. = Heubude bei Danzig.

Hlgbl. = Heiligenbeil.

Ggbg. = Gilgenburg.

Kbg. = Königsberg.

Ktzn. = Katznase bei Marienburg.

Schr. = Schrombehnen bei Pr. Eylau.

Carabidae.

Cicindela campestris L. h. im Frühjahr auf Sandwegen überall, var. *connata* Heer. (Eld.).

C. hybrida h. — var. *maritima* Dej. gewiss nicht eigene Art, vielfache Uebergänge, am Nordstrand des Samlandes g. Juli (Ltz.).

C. silvatica L. n. s. auf sandigen Wegen unter Nadelholz. Rauschen, Caporn. Haide (Ltz.), Dz. (Czw.).

C. literata Sulz. var. *sinuata* F. n. s. bei Alt-Pillau in den Schluchten der Dünen, namentlich, wo der spärliche Sand die darunter liegende Thonschicht sichtbar lässt. Ende Juni. (Ltz.); Zoppot (Eld. Frantz.).

C. germanica L. n. h. auf Lehmboden. Elbing, Braunsbg. (Sieb.); Wehlau (Sauter).

Omophron limbatus F. n. s. an Teichrändern im Kiessande, Lauthsche Teich (Eld. Ltz.); Zoppot (Helm).

Notiophilus aquaticus L. h. an feuchten Orten, auf dem sandigen Boden wasserloser Gräben (Ltz.).

N. palustris Dst. ebenso.

N. biguttatus F. u. var. *semiguttatus* F. ebenso.

Elaphrus uliginosus F. s. im Uferschlamm der Gewässer. Sarkauer Wald (Nanke), Wehlau (Sauter).

E. cupreus Dst. n. s. an gleichen Orten (Ltz.), an der Mottlau (Helm).

E. riparius L. g. an gleichen Orten.

E. aureus Müll. n. h. Elbing (Sieb.), Ktzn. (Czw.).

Blethisa multipunctata L. n. s. am See- strande, Juli (Eld. Ltz.).

Cychrus rostratus L. n. h. in Laubwäldern unter Steinen (Eld.); var. *elongatus* Hoppe (Eld.).

Procrustes coriaceus L. n. h. in Laubwäldern. Warnicken, Kleinhaide (Eld.).

Carabus intricatus L. s. unter Waldmoos in Erdlöchern. Kahlberg (Ltz.).

C. purpurascens F. einmal bei Osterode (Kug.), seitdem nicht wieder gefunden.

C. violaceus L. n. s. in Laubwäldern. Neuhäuser (Ltz.).

C. catenulatus Scop. Osterode (Kug.), nachher nicht wieder gefunden.

C. auronitens F. s. in waldigen Strecken, Osterode (Kug.), Elbing, Kbg. (Sieb.), Capornische Haide, Galtgarben (Fritzen).

C. nitens L. n. s. auf Grasplätzen, Kbg. (Ltz.).

C. granulatus L. s. h. unter Steinen.

C. arvensis F. in versch. Farben n. s. im Frühjahr. Neuhausen (Ltz.).

C. clathratus L. n. h. in der Bludauer Forst in Sandlöchern und Käfergräben (Eld.). Einmal Sptbr. 1821 h. bei Pr. Stargard unter der Rinde alter Kiefernstubben (Schmidt Pr. Prov.-Bl. 1839 p. 563).

C. cancellatus Ill. s. h. unter Steinen. var. *tuberculatus* Schm. h.

C. auratus L. s. auf Aekern. Osterode (Kug. Sieb.).

C. convexus F. n. h. unter Steinen, Elbing (Ltz.).

C. hortensis L. n. s. in Laubwäldern. Neuhäuser, Blaustein (Ltz.).

C. silvestris F. s. s. in Preussen (Illig. K. Pr. p. 151), Tilsit (Andersch.).

C. marginalis F. in Kieferwäldern unter alten Baumwurzeln, August. Osterode (Kug.), Dz. (Helm), Pr. Stargard (Sieb.). Einmal in Menge bei Rosenberg (Eld.).

C. glabratus Pk. n. h. in Laubwäldern, in Sandgruben u. Käfergräben (Ltz.).

C. nemoralis Müll. n. s. in Feld u. Wald (Ltz.).

Culosoma inquisitor L. n. s. von Bäumen, besonders Eichen, herabgeklopft, auf denen er Nahrung sucht. Corjeiten (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

C. sycophanta L. s. Allensteiner Glashütte (Kug.), Warnicken, Schwarzort, Rothenen (Ltz.).

C. sericeum F. s. Neuhäuser (Ltz.).

C. investigator Ill. s. s. Kbg. (Illig. K. Pr. p. 142), Tilsit (Stf.).

C. reticulatum F. einmal bei Dz. in grösserer Zahl (Domm.), Ufer des Drewenzsee (Illig.). Neustadt auf tristen Brachfeldern, Juli, Aug. (Fritzen).

Nebria livida L. n. s. Sarkau an den Wurzeln von *Carex* (Nanke), Osterode einmal zahlreich an alten Ellernwurzeln (Kug.), an den Ufern der Weichsel und der Memel, Zoppot (Sieb.), Glettkau (Czw.), Chmelnko bei Carthaus (Helm). Die var. *lateralis* F. war ehemals bei der Kbg. Sternwarte s. h., jetzt daselbst nicht mehr vorhanden. Am Lauthschen Teiche (Eld. Ltz.), an der Ausmündung kleiner Bäche bei Rauschen unter Steinen auf Lehmboden (Eld. Ltz.), Dz. (Domm. Helm).

N. brevicollis F. n. s. unter Steinen und faulem Holze. Dz. (Sieb.), Georgenswalde (Ltz.).

Pelophila borealis Pk. s. s. Osterode (Kug.), Ggbg. (Janke teste Kr.).

Leistus rufomarginatus Dft. s. Putzig (Stf.), Dz., (Domm., Helm, Czw.).

L. ferrugineus L. spinilabris Pz. s. unter moderndem Laube, Warnicker Park (Ltz.).

L. rufescens F. n. s. ebenso.

Clivina fossor L. h. unter Steinen an Pflanzenstoffen. Die var. *collaris* Hbst. n. s. daselbst.

Dyschirius globosus Hbst. *gibbus* F. g. in Pflanzenerde.

D. laeviusculus Putz. s. Nogatufer bei Ktzn. (Czw.).

D. salinus Schaum. s. Dz. (Ltz.).

D. angustatus Ahr. s. Dz. (Frantz.).

D. chalceus Er. s. am Weichselufer (Sieb.).

D. nitidus Dej. *inermis* Curt. s. Helaer Strand (Stf.).

D. politus Dej. s. Dz. im Werder (Sieb. Czw.).

D. intermedius Putz. s. Schwarzort Juli (Ltz.), Schrb. (Czw.).

D. thoracicus Rossi h. am Weichselufer (Sieb.), Kbg. (Ltz.). Die var. *obscurus* Gyll. n. s. Seestrand bei Putzig u. Dz. (Stf. Czw.).

D. aeneus Dej. n. h. ebenda.

Brachynus crepitans L. s. s. Mewe (Stf.), Neustadt (Fritzen) auf Lehmboden.

Odacantha melanura L. n. h., lebt im Phragmites am Ufer von Landseen. Neuhausen. (Stnr.), Dammhof (Ltz.), Dz. (Fritzen).

Aëtophorus imperialis Germ. s. Dz. auf den Dünen (Helm), Ktzn. (Czw.).

Demetrias unipunctatus Germ. h. zwischen

den Stengeln von *Juncus balticus* u. auf *Elymus arenarius*, in dessen Halmen er sich entwickelt, Oxhöft, Heub. (Fritzen), Neuhäuser (Stnr.).

D. atricapillus L. s. daselbst (Sieb.).

Dromius longiceps Dej. s. unter Pappelrinde Dz. (Sieb.), Kbg. Neue Bleiche, Dammhof (Czw. Stnr.).

D. linearis Oliv. s. unter Pappelrinde Kbg. (Ltz.), Dz. (Czw.).

D. marginellus F. n. s. unter Rinde von Laub- u. Nadelhölzern. Margin bei Kbg. (Ltz.).

D. testaceus Er. n. h. Dz. unter Kiefern-rinde (Sieb.).

D. agilis F. h. unter Rinde vieler Bäume.

D. fenestratus F. s. Dz. (Sieb.).

D. quadrimaculatus L. n. s. unter Rinde Kbg. (Ltz.).

D. quadrinotatus L. n. h. ebenso.

D. nigriventris Thoms. *fasciatus* Dej. n. h. unter Weidenrinde, Rastenbg., Elbing (Ltz.), Dz. (Czw.).

D. sigma Rossi n. s. daselbst.

Blechrus glabratus Dft. *maurus* St. s. Wernsdorf, im Tharauer Walde (Kuwert), Dz. (Helm, Czw.). Vgl. v. Heyden Käf. v. Nassau p. 16.

Metabletus obscuroguttatus Dft. s. Ggbg. (Kr.), Heub. (Helm), Neustadt un'er Erica vulgaris (Fritzen).

M. truncatellus L. g. auf sandigen Aeckern.

M. foveola Gyll. g. ebenso.

Lebia cyanoccephala L. s. Aweiden b. Kbg. (Ltz.).

L. chlorocephala Hoffm. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Sieb.), liebt Hypericum perfore (Fritzen).

L. crux minor L. einmal Aug. 77 h. auf Nesseln bei Dammhof (Stnr.), sonst s. Pelonken bei Dz. (Sieb.), Caporn. Haide (Sauter), War-nicken, Fchst. (Ltz.).

Cymindis humeralis F. s. Dz. (Fritzen), Caporn. Haide (Ltz.), Rauschen (Stnr.)

C. axillaris F. wird von Kug. angeführt, ist aber bisher nicht wieder gefunden.

C. angularis Gyll. s. Ludwigsort bei Kbg. (Sauter, Künow).

C. macularis Dej. n. h. Hlgbl. (Seydler), Ragnit am Rombinusberge (Stf.), Rauschen (Ltz.), Neustadt (Fritzen), Heub. (Helm).

C. vaporarium L. n. h. Rauschen (Ltz.), Putziger Stadtwald (Stf.), Neustadt (Fritzen), Pr. Stargardt (Schmidt), Bohnsack (Helm).

Masoreus Wetterhallii Gyll. s. Tuchelsche Haide (Sieb.), Rauschen, Schwarzort unter Steinen und Brettern auf Sandboden (Ltz., Eld.), Neustadt (Fritzen), Dz. (Czw., Helm), Memel (Stnr.).

Loricera pilicornis F. h. unter abgefallenem Laube und im Moose.

Panagaeus crux major n. s. Kbg. Pregeldamm unter Steinen (Ltz.).

P. quadripustulatus St. s. Dz. (Sieb.).

Chlaenius spoliatus Rossi s. s. Ggbg. (Kr.), Elbing (Hennig).

C. vestitus Pk. s. Kbg. Teichufer bei Lauth unter Steinen (Ltz.), Koliebken bei Dz. (Fritzen).

C. Schrankii Dft. s. am Ufer des frischen Hafes bei Bodenwinkel, Elbing, Vogelsang (Dommer), Heub. (Fritzen).

C. tibialis Dej. n. s. Dz. Ottominer Wald an einer sumpfigen Stelle (Dommer), Radauneuser (Helm), Nogatufer bei Ktzn. (Czw.).

C. nigricornis F. mit var. *melanocornis* Dej. h. an feuchten Ufern unter Steinen.

C. sulcicollis Pk. einmal bei Rauschen zahlreich (Ltz.), sonst s., Dünen bei Heub. (Fritzen, Czw.).

C. holosericeus F. n. s. an denselben Stellen.

C. caelatus Web. s. s. Neukuhren (Eld.), Heub. (Fritzen).

C. quadrifuscatus Ill. s. auf Moorwiesen, Dammhof, Spittelhof (Eld.), Caporn. Haide (Ltz. Stnr.).

Oodes helopiooides F. n. s. auf den Weichselkämpfen unter Laub (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

Licinus depresso Pk. n. h. Dz. (Czw.), Braunsbg. (Sieb.), Fuchshöfen (Ltz.), an Waldrändern bei Oliva (Fritzen), Hlgbl. (Stnr.).

Badister unipustulatus Bon. s. Seestrand bei Steegen (Dommer), Neustadt (Fritzen).

B. bipustulatus F. mit var. *lacerfossus* St. n. s. im ausgeworfenen Röhricht an Teichen und Wiesen (Ltz.).

B. humeralis Bon. s. Grebbiner Wald und an Weidenstämmen in dessen Nähe (Dommer).

B. peltatus Pz. n. s. an Ulmen (Dommer), im ausgeworfenen Röhricht (Ltz.).

Broscus cephalotes L. h. im Sande unter Steinen u. Brettern in selbstgegrabenen Höhlen.

Miscodera arctica Pk. s. s. überwintert im Kiefernwalde in nach Norden gelegenen Ab-

hängen, deren Sandboden mit dünnem Moose bekleidet ist. Ein glänzendes Pünktchen zeigt den in einer Höhle ruhenden Käfer. Putzig (Stf.), Brösen (Dommer), Caporn. Haide (Ltz.), Neustadt an tristen Bergabhängen (Fritzen).

Pogonus chalceus Marsh. *halophilus* Nicol. s. s. am Weichselufer bei Käsemark (Dommer).

Patrobus excavatus Pk. n. h. Neustadt unter Steinen u. in Moos an feuchten Stellen (Fritzen), Neuhausen (Stnr.).

Sphodrus leucophthalmus L. s. in Ställen u. Kellern bei Bäckern (Fritzen), Kbg. (Czw.). Im Keller in Katzn. fing Czw. ein Stück mit doppelt so breitem Halssch. als gewöhnlich unter mehreren normalen.

S. inaequalis Pz. *terricola* Hbst. s. daselbst.

Calathus cisteloides Illig. n. s. in Wäldern unter *Erica vulgaris* (Ltz.).

C. flavipes Fourcr. *fulvipes* Gyll. g. daselbst.

C. fuscus F. g. ebenso.

C. melanocephalus L. h. unter Steinen, an Baumwurzeln; die var. *ochropterus* Dft. s. Dz. (Helm).

C. micropterus Dft. h. mit *flavipes*.

Taphria nivalis Pz. n. s. Neustadt unter Steinen an Bergabhängen (Fritzen), Samländ. Strand (Ltz.).

Dolichus flavicornis F. im Norden der Prov. s. auf einem lehmigen Brachfelde bei Gr. Zünder (Dommer); im Süden weniger selten, Ggbg. (Kr.).

Anchomenus livens Gyll. s. Kbg. (Ltz.), Memel (Stnr.).

A. prasinus Thunb. h. unter Steinen und an Baumwurzeln.

A. albipes F. n. s. an der Weichsel (Fritzen), Ufer des Rauschener Teichs (Ltz.).

A. oblongus F. n. s. in Stubben an sumpfigen Stellen (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

A. marginatus L. n. s. an schlammigen Teichufern, Lauth, Rauschen (Ltz.).

A. impressus Pz. n. h. Tilsit am Memel-ufer unter Weiden (Nanke), am Lauthschen Teiche im Kiessande (Ltz.).

A. sexpunctatus L. h. unter Steinen und im Grase.

A. ericeti Pz. in Wäldern unter Moos überwinternd (Dommer), bei Kbg. auf einer Pregelwiese bei Horst im Frühjahr zahlreich mit grosser Schnelligkeit umherlaufend (Kuwert).

A. parumpunctatus F. h. in Feld u. Wald.
A. gracilipes Dft. elongatus Dej. h. unter Tang am Seestrande (Ltz.).
A. lugens Dft. s. Putzig (Stf.), Neustadt an feuchten Waldstellen (Fritzen).
A. viduus Pz. (grünlich) moestus Dft. (schwarz) s. h. an feuchten Waldstellen; die var. *emarginatus* Gyll. s. auf Pregelwiesen (Czw.).
A. versutus St. s. Neuhausen (Stnr.).
A. dolens Sahlb. s. Dz. (Stf.).
A. micans Nicol. s. Kbg. (Ltz.)
A. scitulus Dej. s. Cranz unter Seetang (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).
A. piceus L. *picipes* F. h. am Seestrande unter Tang.
A. gracilis Gyll. s. an Flussufern (Fritzen).
A. fuliginosus Pz. n. s. wie *piceus*.
A. puellus Dej. *peliduus* Pk. n. s. Putzig (Stf.), Nordstrand des Samlandes (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
A. quadripunctatus Deg. s. Seestrand unter Tang (Ltz., Stnr.).
Olisthopus rotundatus Pk. s. Rauschen (Ltz.), Dz. (Czw.), Memel (Stnr.).
Stomis pumicatus Pz. s. an feuchten Waldstellen unter Steinen (Fritzen), Kbg. einmal mehrfach im botan. Garten (Czw.), F. F. (Stnr.).
Feronia (Pterostichus) punctulata F. n. s. Kbg. (Ltz.).
F. cuprea L. g. auf Aeckern.
F. versicolor St. *pauciseta* Thoms. n. h. Kbg. (Czw.).
F. dimidiata Oliv. s. Striesser Feld bei Dz. unter Steinen (Dommer), Nordenbg. (Andersch).
F. lepida F. n. s. mit *cuprea*. Rauschen (Ltz.).
F. subcoerulea Quens. s. Glettka (Czw.), Dz. (Helm); von Dommer fälschlich als *puncticollis* Dej. aufgeführt.
F. picimana Dft. s. Dz. in einem Pilzenhaufen (Dommer), Kbg. Putzig am Seestrande (Stf.). Warnicken (Eld., Ltz.).
F. vernalis Pz. *crenata* Dft. g.
F. aterrima Pk. n. s. Neuhäuser, Rauschen (Ltz., Stnr.).
F. nigra Schall. h. unter Steinen.
F. vulgaris L. *melanaria* Ill. h. ebenso.
F. nigrita F. h., var. *Rhaetica* Heer. Ggbg. (Kr. Schaum K. D. I. 457. 15).

F. anthracina Illig. h. unter Steinen.
F. gracilis Dej. n. h. Kbg. (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).
F. minor Gyll. n. h. ebenso.
F. strenua Pz. *erythropus* Marsh. g.
F. diligens St. *strenua* Er. g.
F. oblongopunctata F. n. s. in Wäldern unter Laub und im Moose.
F. angustata Dft. s. Neustadt (Fritzen); Putzig, Braunsbg. (Stf.), Dz. (Helm).
F. aethiops Pz. n. h. Ottominer Wald in Eichenstubben (Dommer), Warnicker Forst (Ltz.), Dzer Nehrung (Fritzen).
F. fasciatopunctata Creutz. nur einmal in Pr. gefangen (Illig. Magaz. I. p. 58), seitdem nicht wieder.
F. (Abax) carinata (Dft.) s. Belschwitz (Kr.).
F. ovalis s. Angerburg (Fritzen).
Amara concinna Zimm. *lepida* Er. s. s. Neustadt (Fritzen).
A. tricuspidata Dej. s. Putzig (Stf.).
A. strenua Zimm. s. Dz. (Czw.), Sammland. Strand (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
A. plebeja Gyll. n. s. unter Steinen. Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).
A. similata Gyll. ebenso.
A. ovata F. *obsOLETA* Dej. Dz. auf lehmigen Feldern (Dommer).
A. nitida St. s. Sandgruben bei Ludwigsort (Sauter).
A. communis Pz. g. Ich mache aufmerksam auf die sehr ähnliche *continua* Thoms. Dtsch. Ent. Ztschr. XX p. 183 u. 397.
A. lunicollis Schiöd. *vulgaris* Pz. h.
A. curta Dej. s. Neustadt (Fritzen).
A. trivialis Gyll. g.
A. spreta Dej. n. h. Neuhäuser (Ltz., Stnr.).
A. famelica Zimm. *contrusa* Schiöd. s. Neustadt (Fritzen).
A. acuminata Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. familiaris Dft. g.
A. lucida Dft. *gemina* Zimm. n. s. am Seestrande (Ltz.).
A. tibialis Pk. h. ebenda.
A. ingenura Dft. s. Neustadt (Fritzen), Kbg. (Ltz.).
A. municipalis Dft. s. Kbg. (Ltz.).
A. Quenselii Schh. s. s. Dz. (Sieb.).
A. silvicola Zimm. *maritima* Schiöd. n. s. Putzig (Stf.), Weichselmünde (Helm, Czw.), Cranz

(Ltz.), einmal bei Schwarzort zwischen den Dünengräsern s. h. (Ltz.).

A. rufocincta Dej. s. s. Schaum K. D. I. p. 547.

A. infima Dst. n. h. am Samländ. Strand (Ltz.).

A. brunnea Gyll. s. s. Dz. (Sieb.).

A. aulica Pz. *picea* Er. h. unter Steinen.

A. convexiuscula Marsh. s. Dz. Weichselmünde (Helm).

A. torrida Illig. nach dessen Bericht (K. Pr. 173. 42) von Kug. einmal gefangen, nachher nicht wieder. Illiger verbindet damit als var. *alpina* Pk., jedoch ist das Vorkommen beider Käfer in Pr. sehr zweifelhaft, sie sind hochnordisch.

A. consularis Dst. s. Kbg. (Ltz.).

A. fulva Dij. *ferruginea* Pk. n. s. Die var. *iridipennis* Heer. s. bei Gedingen am Meeresstrande. Mai (Dommer).

A. apricaria Pk. h. unter Steinen.

A. patricia Dst. n. s. Kbg. (Ltz., Stnr.).

Diachromus germanus L. s. Kbg. (Ltz.)

Dichrotrichus pubescens Pk. s. Putzig einmal unter Tang (Stf.).

D. rufithorax Sahlb. n. h. Kbg. unter Steinen vor dem Brandenburger Thor (Czw.).

D. lacustris Redt. s. Dz. (Helm).

Anisodactylus signatus Ill. s. Dz. (Fritzen, Czw.).

A. binotatus F. mit var. *spurcationis* Dij. h. im Frühjahr auf gedüngten Aeckern (Ltz.).

A. nemorivagus Dst. n. h. Neustadt (Fritzen).

Harpalus punctatulus Dst. s. Dz. Katzn. (Czw.).

H. azureus F. s. auf Lehmboden, Dz. (Dommer, Frantz.).

H. puncticollis Pk. s. Gr. Zünder in einem lehmigen Graben (Dommer), Dammhof (Stnr.).

H. brevicollis Dej. s. auf Lehmboden, Dz. (Sieb.).

H. ruficornis F. g. unter Steinen.

H. griseus Pz. h. ebenso.

H. calceatus Dst. n. h. Neustadt im Herbste auf Feldern (Fritzen), Schwarzort (Ltz.), Pr. Stargardt (Schmidt), Dz. (Czw.).

H. ferrugineus F. s. bei Ludwigsort am frischen Hafte, Kahlberg (Ltz.), Neustadt (Fritzen), Oliva (Czw.).

H. honestus Dst. *ignavus* Dst. n. h. Conitz (Sieb.), Heub. (Czw., Helm).

H. distinguendus Dst. n. h. Pröbbernau (Schindowski).

H. aeneus F. in allen Farbenvarietäten g.

H. discoideus F. s. Schwarzort (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).

H. rubripes Dst. s. Lyck (Sanio).

H. latus L. s. h. am Nordstrande von Samland (Ltz.).

H. luteicornis Dst. s. Neustadt (Fritzen).

H. quadripunctatus Dej. s. Pelonken, Cadienen (Dommer, Helm).

H. fuliginosus Dst. s. s. in den Dünen von Glettkau, Juli (Czw.).

H. neglectus Dej. s. Neustadt (Fritzen).

H. melancholicus Dej. s. Dz. unter Steinen auf Saatsfeldern (Dommer); Glettkau (Czw.).

H. tardus Pz. n. s. wie latus.

H. Frölichii St. n. h. Samländ. Strand (Ltz.), Dz. (Dommer).

H. serripes Quens. s. Neustadt auf sandigen Feldern (Fritzen).

H. hirtipes Pz. n. h. auf Sandboden, Allenstein (Eld.).

H. impiger Dst. s. Kbg. (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).

H. servus Dst. n. s. Neustadt (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

H. anxius Dst. n. h. Ludwigsort (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

H. picipennis Dst. *vernalis* F. h. in Sandgruben, Ludwigsort (Ltz.).

Stenolophus vaporiariorum F. s. Rauschen (Ltz.).

S. vespertinus Illig. n. s. Kbg. (Ltz.).

Acupalpus flavicollis St. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).

A. dorsalis F. g. unter Laub.

A. brunnipes St. s. Gbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

A. exiguus Dej. n. s. unter Laub. Kbg. (Sauter, Ltz.) Dz. (Helm).

A. meridianus L. n. s. Kbg. (Ltz.).

A. consputus Dst. ebenso.

Bradycellus cognatus Gyll. s. Dz. (Czw.).

B. placidus Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. collaris Pk. n. s. Blaustein (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).

B. similis Dej. n. h. Neustadt an tristen Bergabhängen unter Moos (Fritzen).

Trechus discus F. n. h. Rhedafluss bei Neustadt (Fritzen), Schwarzort (Ltz.), Dz. Weichsel-

kämpfen unter Weidenblättern, Gr. Zünder unter Schilf (Dommer), Kbg. Neue Bleiche (Czw.).

T. micros Hbst. Ggbg. (Kr.).

T. rubens F. paludosus Gyll. s. Ufer der Pengau bei Leesen (Dommer), Cranz (Ltz.), Kbg. Pregelwiesen (Czw.).

T. palpalis Dej. s. Kbg. (Sauter).

T. rivularis Gyll. s. s. Belschwitz (Kr.), Cranz (Ltz.).

T. minutus F. s. h. am Strande unter Tang.

T. obtusus Er. s. Neustadt (Fritzen).

T. secalis Pk. s. h. wie minutus.

Perileptus areolatus Creutz. s. s. Rastenbg. (Czw.).

Tachys nanus Gyll. s. wie Tr. obtusus.

Bembidium quinquestriatum Gyll. s. Ggbg.

B. obtusum St. s. Kbg. (Sauter), Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).

B. Mannerheimii Sahlb. unicolor Chaud. s. Schrb., F. F. (Czw., Stnr.).

B. guttula F. s. h. an sandigen Ufern zwischen Schilf.

B. biguttatum F. g. Ich mache aufmerksam auf das sehr ähnliche *B. inoptatum* Schaum (Seidl. Fn. Balt. p. 36).

B. assimile Gyll. h. wie guttula.

B. fumigatum Dft. s. Lyck (Sanio).

B. quadrimaculatum L. s. h. auf Lehmböden.

B. quadriguttatum F. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. humerale St. pulchrum Gyll. s. Fischhausen (Ltz.).

B. articulatum Pz. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. Doris Pz. n. s. zwischen den Wurzelfasern von Sagittaria (Kug.), Kbg. (Ltz.).

B. gilvipes St. s. Dz. (Czw. Helm), Neuhäuser (Stnr.).

B. Schüppelii Dej. s. s. Putziger Stadtwald (Stf.).

B. tenellum Er. s. Dz. (Sieb.).

B. minimum F. pusillum Gyll. s. Hlgbl. (Stnr.).

B. nigricorne Gyll. wird von Sieb. angeführt, von Schaum u. Stf. bezweifelt; wahrsch. war die Bestimmung falsch. Seidl. Fn. Balt. p. 38 stellt es zu pusillum. Fehlt im Catal. von Stein u. Wiese.

B. lampros Hbst. celere F. velox Er. s. h. in feuchtem Moose. var. felixianum. Heer. s. Dz. (Dommer).

B. bipunctatum L. n. h. Heub. (Fritzen), Kbg. Pregel (Stnr.).

B. nitidulum Marsh. rufipes Gyll. s. Neustadt (Fritzen), var. alpinum Dej. Dz. (Dommer).

B. saxatile Gyll. wird von Sieb. angeführt, wahrsch. nicht richtig bestimmt; mir unbekannt.

B. Andreeae F. femoratum St. g. unter ausgeworfenen Pflanzenresten.

B. rupestre L. Bruxellense Wesm. s. Dz. an der Weichsel und Radaune (Helm).

B. littorale Oliv. rupestre F. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. fluviatile Dej. s. an den Seen bei Karthaus (Helm).

B. lunatum Dft. s. Haffstrand bei Bodenwinkel (Dommer), Schwarzort (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

B. pallidipenne Illig. n. h. Haffuser bei Pillau (Eld.), Zoppot (Sieb.).

B. splendidum St. s. Neuhäuser (Stnr.).

B. pygmaeum F. s. Dz. am Weichselufer (Fritzen): var. bilunulatum Bielz. Cranz (Ltz.).

B. dentellum Thunb. undulatum St. n. s. Schwarzort (Nanke), Kbg. (Ltz.).

B. varium Oliv. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. adustum Schaum. fumigatum Dej. s. Wernsdorf (Kuwert).

B. obliquum St. h. Radauneuer (Dommer), Rauschener Teich (Ltz.), Neuhäuser, Memel (Stnr.).

B. ruficolle Pz. s. s. Osterode 1795 (Kug.), Heub. (Fritzen), Neufihr u. Zoppot (Helm).

B. punctulatum Drap. aerosum Er. n. h. Loppehnen (Eld.), Rhedafluss b. Neustadt (Fritzen), Rastenbg. (Czw.).

B. laticolle Dft. s. Dz. an der Weichsel (Sieb.).

B. striatum s. Dz. (Fritzen), Ktzn. (Czw.).

B. velox L. impressum Pz. s. Schwarzort (Ltz.).

B. argenteolum Ahr. s. ebenso, Ktzn. am Nogatuer (Czw.). Die var. azureum Gebl. dasselbst mit der Stammar (Czw.).

B. paludosum Pz. n. s. Weichsel- und Rhedafluss bei Neustadt (Fritzen), Kbg. (Ltz.).

Tachypus caraboides Schrk. s. Lyck (Sanio), Strand b. Broesen (Dommer), Rhedafluss (Fritzen).

T. pallipes Dft. n. s. unter Spreu u. Blättern. Kbg. (Ltz.).

T. flavipes L. s. h. ebenso.

Dytiscidae.

Cnemidotus caesus Dst. n. s. Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

Haliphus obliquus F. n. s. Glettka (Czw.), F. F. (Czw., Stnr.).

H. varius Nicol. s. s. Mühlenteich bei Glettka (Czw.).

H. confinis Steph. *lineatus* Aubé. s. F. F. (Czw.), Lyck (Sanio); merkwürdig ist eine einfarbige var. *concolor*, die Sanio in einzelnen Stücken gefangen hat.

H. variegatus St. n. s. Putzig (Stf.), Kbg. Landgraben (Eld.), Neustadt in den Gräben von Moorwiesen (Fritzen).

H. fulvus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

H. impressus Fabr. *flavicollis* St. s. Memel (Stnr.), in der Radaune bei Pechbude (Dommer), Hassauer bei Margen unter Blättern von *Tussilago* (Ltz.).

H. affinis Steph. *cinereus* Aub. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. Landgraben (Eld.).

H. ruficollis Deg. s. h.

H. Heydeni Wehncke s. s. F. F. (Czw.), Memel (Stnr.).

H. fluviatilis Aub. s. im Lyckflusse (Sanio).

H. fulvicollis Er. s. Dz., Neustadt (Fritzen).

H. lineatocollis Marsh. s. Putzig (Stf.), Dz. (Czw.).

Brychius elevatus Pz. s. Kbg. Landgraben, Palmburg (Eld. Ltz.), Memel (Stnr.), Neustadt im Cedronflüsschen (Fritzen).

Pelobius tardus Hbst. Hermanni F. 1 St. in einer Lehmpütze März 78 Wernsdorf (Kuwert).

Hyphydrus ovatus L. *ferrugineus* L. h. Dammhof (Ltz.).

Hydroporus reticulatus F. h. ebenso.

H. inaequalis F. h. ebenso.

H. decoratus Gyll. n. h. ebenso.

H. confluens F. s. Heub. (Dommer), Corjeiten bei Fischhausen (Ltz.), F. F. einmal zahlreich (Czw.).

H. parallelogrammus Ahr. s. Heub. (Dommer).

H. picipes F. ♀ *lineellus* Gyll. g.

H. Marklini Gyll. s. Kbg. in Teichen des Landgrabens (Eld.).

H. geminus F. n. s. Ggbg. (Kr.).

H. unistriatus Schrk. n. s. Dammhof (Ltz. Stnr.).

H. pictus F. n. s. in der Deime bei Goldbach (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

H. granularis L. n. s. Dz. (Dommer), Neustadt (Fritzen).

H. bilineatus St. s. Kbg. (Ltz.).

H. latus Steph. *ovatus* St. s. s. in einem Waldtümpel bei Ottomin (Dommer), Glettka (Czw.).

H. depressus F. zuw. h. im Uferschlamm, Rauschen, Schwarzort (Ltz., Stnr.), Karwenbruch bei Neustadt (Fritzen).

H. halensis F. einmal h. bei Belschwitz (Eld.), Loppehnen (Eld.), Dz. (Czw.), Neukuhren (Stnr.).

H. dorsalis F. s. h. in Moorgräben.

H. oblongus Steph. *nitidus* St. s. s. Heub. (Dommer), Neustadt (Fritzen).

H. rufifrons Dst. n. s. Ggbg. (Kr.).

H. erythrocephalus L. *deplanatus* Gyll.

h. Schwarzort, Kapkeim (Ltz.).

H. planus F. n. s. Schwarzort (Ltz.).

H. pubescens Gyll. n. h. Putzig (Stf.), Cranz (Ltz.), Weichselmünde (Helm).

H. fuscipennis Schaum. *piceus* St. n. h. Ggbg. (Kr.).

H. discretus Fairm. s. Kbg. am Veilchenberge, F. F. (Czw.).

H. nigrita F. s. Heub. (Dommer).

H. brevis Sahlb. s. Kbg. (Ltz.).

H. melanarius St. s. Schwarzort (Ltz.).

F. F. (Stnr.), Neustadt (Fritzen).

H. elongatus St. s. Schießdr.

H. tristis Pk. n. s. Ggbg. (Kr.).

H. umbrosus Gyll. n. s. ebenso.

H. obseurus St. s. Neustadt (Fritzen).

H. notatus St. s. ebenso.

H. vittula Er. n. h. Grebbiner Forst (Dommer).

H. palustris L. h. Dammhof (Ltz.).

H. angustatus St. n. h. Neustadt (Fritzen).

H. pygmaeus St. s. Ggbg. (Kr.).

H. lineatus F. h. wie palustris.

Noterus crassicornis F. h. ebenso.

N. semipunctatus F. *sparsus* Marsh. n. s. ebenso.

Laccophilus minutus L. *interruptus* Pz. n.

h. Dammhof (Ltz.).

L. hyalinus Deg. *obscurus* Pz. h. ebenso.

Colymbetus fuscus L. g.

C. Paykulli Er. n. h. Neuhäuer (Stnr., Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

C. striatus L. n. s. Samländ. Strand (Stnr. Ltz.).

C. pulverosus Steph. s. Saspe bei Dz. (Dommer), Glettkau (Czw.).

C. notatus F. h. Ggbg. (Kr.), Memel (Stnr.).

C. notaticollis Aub. s. Heub. in einem Moortümpel (Dommer), Lyck (Sanio).

C. bistratus Bergstr. s. mit dem vorigen (Dommer), Ggbg. (Kr.), Neuhäuser (Stnr.).

C. adspersus F. h. in den Strandgegenden.

C. collaris Pk. h. ebenso.

C. Grapei Gyll. n. s. Rauschen (Ltz.).

Anm. Was den *C. dolabratus* Pk. be-

trifft, so ist Elditts Irrthum längst nachgewiesen worden, es war ein etwas kleineres St. von *striatus* ♀. Auch Fritzen Preuss. Käfer p. 52 beschreibt ihn zwar, ist aber den Fundort schuldig geblieben.

Der Käfer ist hochnordisch.

Ilybius fenestratus F. n. h. Dammhof (Ltz.).

I. subaeneus Er. n. h. ebenso.

I. fuliginosus F. h. in den Strandgegenden.

I. similis Thoms. s. Kbg. (Czw.), Rauschen (Ltz.).

I. ater Deg. s. h. am Strande.

I. obscurus Marsh. *quadriguttatus* Er. h. ebenso.

I. guttiger Gyll. h. ebenso.

I. aenescens Thoms. n. h. überall noch als *angustior* Gyll. angegeben, der uns fremd und hochnordisch ist. Kraatz Berl. Ent. Ztsch. XV. p. 166. Lentz in der Altpreuss. Monatsschrift XV. p. 366.

Liopterus agilis F. n. h. Schwarzort (Ltz.).

Agabus fuscipennis Pk. h. am Seestrande (Ltz.), Dammhof (Czw.).

A. maculatus L. n. s. in Bächen unter Steinen. Rauschen (Ltz.).

A. femoralis Pk. n. h. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).

A. unguicularis Thoms. s. Kbg. Hufen (Hensche, Tiessen, Czw.), Dz. (Berl. Ent. Ztschr. 1871 p. 167).

A. abbreviatus F. mit *maculatus*, aber seltener; die var. mit verloschener Queerbinde s. Kbg. (Ltz.).

A. Sturmii Gyll. bei Putzig g. (Stf.), sonst n. h.

A. bipunctatus F. n. h. Corjeiten (Ltz.), Braunsb. (Sieb.), Glettkau (Czw.).

A. uliginosus L. n. s. Neustadt (Fritzen).

A. paludosus F. h. in den Strandgegenden, Cranz, Rauschen (Ltz.).

A. congener Pk. ebenso.

A. affinis Pk. s. Ggbg. (Kr.).

A. guttatus Pk. s. Kug. Schieffdr.

A. bipustulatus L. h. Kapkeim, Seestrand (Eld., Ltz.).

A. nigroaeneus Er. s. Lyck in der Milchbuder Forst (Sanio).

A. chalconotus Pz. s. Grebbiner Wald (Dommer), Pregel bei Palmburg (Eld.).

A. neglectus Er. s. Dz. am Strande (Dommer, Frantz.).

A. subtilis Er. s. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).

Cybister Roeselii F. bei Belschwitz h. (Eld.), sonst einzeln, Schwarzort (Ltz.), Dz. in der Weichsel (Sieb., Helm), Liebschauer See. bei Dirschau (Czw.).

Dytiscus latissimus L. in mehreren Masurischen Seen h., im Norden s. (Eld.).

D. marginalis L. ♀ var. *conformis* Kunze s. h.

D. circumcinctus Ahr. n. s. Dammhof (Ltz., Stnr.), die var. *dubius* Gyll. s. s. Putzig (Stf.).

D. circumflexus F. s. in Gesellsch. der verwandten Arten, Dz. (Dommer).

D. lapponicus Gyll. im Dammhofer Teich h., sonst s. Braunsbg (Sieb.), in den Karthauser Seen (Fritzen).

D. punctulatus F. n. h. im Herbste in Gräben Neustadt (Fritzen), Dz. (Sieb.).

D. dimidiatus Bergstr. s. Weststr. v. Samland (Nanke), Dammhofer Teich (Ltz.), Ktzn. (Czw.), Hlgbl. (Stnr.).

Hydaticus bilineatus Deg. s. Heub. (Dommer), Dammhof (Stnr.).

H. zonatus Pz. n. s. ebenso.

H. piciventris Thoms. s. s. 1 St. ♀ Ggbg. (Kr. Berl. Ent. Ztschr. XV. 168 cf. XVII. 225.)

H. cinereus L. s. in stehenden Gewässern (Dommer), Pregel bei Palmburg (Eld.), Neuhäuser (Stnr.).

H. austriacus St. s. mit *bilineatus* (Dommer).

H. Hybneri F. h. Rauschen (Ltz.).

H. transversalis Pontopp. n. h. Dammhof (Ltz.).

H. stagnalis F. s. ebenso.

Gyrinus concinnus Klug. im Festungsgraben von Dz. und in der Radaune s. h. (Fritzen, Helm).

G. minutus F. n. s. Heub., Putzig (Sieb.); Dammhof (Stnr.).
G. natator L. mergus Ahr. g.
G. bicolor Pk. s. in der Drewenz bei Strasburg in Westpr. (Stf.).
G. columbus Er. s. Kbg. (Ltz.).
G. Suffrani Scrib. Kbg. (Czw.).
G. marinus Gyll. n. s. Elbing (Ltz.), Dammhof (Stnr.).
G. opacus Sahlb. n. s. Lyck (Sanio), Memel (Stnr.), Glettkau (Czw.).
Oretochilus villosus F. n. s. ein nächtliches Thier, in der Weichsel (Dommer), in d. Alle bei Heilsbg. u Schippenbeil (Andersch), Putzig (Stf.).
Hydrophilus piceus L. stellenweise h. Lyck 1875 (Sanio), im Norden s. s.
H. aterrimus Eschsch. n. s. in krautreichen Wassergräben, Kbg. (Ltz.).
Hydrops caraboides L. n. s. in den Strandgegenden.
H. flavipes Stev. s. Loppehnen, Cranz (Eld.), Belschwitz (Eld.), Ktzn. (Czw.).
Hydrobius oblongus Hbst. s. Dz. auf einer sumpfigen Wiese von Wasserpflanzen geschöpft (Dommer), Ggbg. (Kr.).
H. fuscipes L. g.
H. bicolor Pk. n. s. Dammhof (Ltz.).
H. globulus Pk. h. daselbst.
Phillydrus testaceus F. h. daselbst.
P. melanocephalus Oliv. h. ebenso.
P. nigricans Zett. frontalis Er. n. h. ebenso.
P. maritimus Thoms. s. Ktzn. (Czw.), Dz. (Helm), Kbg. (Stnr.).
P. marginellus F. marginatus Dst. ovalis Thoms. g.
Helochares lividus Forst griseus F. n. s. Dammhof (Ltz.).
Laccobius sinuatus Motsch nigriceps Thoms. in Bächen unter Steinen n. s. Kbg. (Ltz.), Ktzn. Schrb. (Czw.).
L. bipunctatus Thoms. h. Kbg. (Sauter, Czw., Ltz.).
L. minutus L. n. h. Kbg. (Ltz.).
L. alutaceus Thoms. s. Schrb. (Czw.).
Berosus luridus L. h. Dammhof (Ltz.).
B. aericeps Curt. s. Ggbg. (Kr.).
Limnebius truncatellus Thunb. s. h.
L. papposus Muls. s. Kbg. (Czw.).
L. truncatulus Thoms n. s. Kbg. Landgraben (Czw.).

L. nitidus Marsh. n. h. Ktzn. (Czw.).
L. atomus Dst. minutissimus Germ. s. Dz. (Sieb.), Neustadt (Fritzen).
Cyllidium seminulum Pk. s. h. im Uferschlamm u. unter Steinen.
Spercheus emarginatus Schall. n. s. Kbg. Lizentgraben (Sauter).
Helophorus nubilus F. h. in Conserven. Dammhof (Ltz.).
H. tuberculatus Gyll. s. unter ausgeworfenem Seegrase, Neuhäuser (Ltz.), Brösen (Helm); einmal bei Rauschen zahlreich (Ltz.).
H. arvernicus Muls. s. s. Kbg. im Festungsgraben am Brandenburger Thor (Czw.).
H. aquaticus L. grandis Illig. s. h. in Wiesengräben.
H. granularis L. g.
H. griseus Hbst. g.
H. obscurus Muls. acneipennis Thoms. s. Neustadt (Fritzen).
H. nanus St. s. ebenso.
H. pumilio Er. n. s. ebenso.
Hydrochus elongatus Schall. g. Dammhof (Ltz.).
H. carinatus Germ. g. ebenso.
H. brevis Hbst. n. s. ebenso.
Ochthebius gibbosus Germ. n. h., einmal zahlreich gefangen bei Ktzn. (Czw.)
O. margipallens Latr. n. h. Schrb., Pregelwiesen (Czw.).
O. pygmaeus F. g.
O. bicolon Germ. s. in Waldbächen unter Steinen, Putzig, Neustadt (Stf.), Neuhausen (Stnr.).
O. rufomarginatus Er. s. Kbg. Pregel-damm, Neue Bleiche (Czw.).
O. loveolatus Germ. s. Neuhäuser unter Seetang (Ltz.).
Hydraena palustris Er. s. einmal bei Heub. von Riedgras geschöpft (Stf.), Kbg. (Stnr.), Blaustein (Ltz.).
H. riparia Kugel. n. s. im Bache bei Loppehnen (Eld.), Putzig, Neustadt, Dz. (Stf.).
H. angustata St. s. Neustadt in Waldbächen (Fritzen).
H. gracilis Germ. s. Memel in der Dange (Stnr.).
H. pulchella Germ. Schrb. an einem Wiesenbach (Czw.).
Cyclonotum orbiculare F. h. im Uferschlamm und unter Steinen. Dammhof (Ltz.).
 2*

- Sphaeridium scarabaeoides* L. g. in frischem Rinderdünger.
- S. bipustulatum* F. mit var. *marginatum* F. ebenso.
- Cercyon obsoletus* Gyll. n. s. im Dünger, Kbg. (Stnr.), Loppehnen (Eld.), Dz. Cranz unter Seetang (Stf.).
- C. haemorrhoidalis* F. n. s. in fetter Erde Kbg. (Ltz.).
- C. haemorrhous* Gyll. ebenso.
- C. lateralis* Marsh. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. nasse Garten (Czw.), Fuchshöfen (Stnr.).
- C. flavipes* F. g.
- C. palustris* Thoms. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.).
- C. littoralis* Gyll. n. s. am Meeresufer, Dz. (Dommer), Samländ. Strand (Ltz.), Memel (Stnr.).
- C. unipunctatus* L. n. s. Kbg. (Ltz.).
- C. quisquilius* L. h. Loppehnen (Eld.).
- C. melanocephalus* L. n. h. Kbg. (Ltz.).
- C. pygmaeus* Illig. h. ebenso.
- C. terminatus* Marsh. *plagiatus* Er. s. im Pferdedünger, Dz. (Dommer).
- C. centrimaculatus* St. h. im Rinderdünger, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).
- C. minutus* F. s. h. ebenso.
- C. lugubris* Pk. n. s. am Rande von Gewässern, Neustadt (Fritzen).
- C. analis* Pk. h. im Schlamm und in fetter Erde, Kbg. (Ltz.).
- C. granarius* Er. s. ebenso, Dz. (Helm), Neustadt (Fritzen).
- C. pulchellus* Heer. s. Kbg. Plantage (Stnr.).
- Megasternum bolitophagum* Er. s. in faulen den Pflanzenstoffen Putzig (Stf.), Schrb. (Czw.).
- Cryptopleurum atomarium* F. g. im Dünger.
- Staphylinidae.**
- Autalia impressa* Oliv. s. in Blätterpilzen, Dz. (Dommer), Warnicken (Stnr., Ltz.).
- A. rivularis* Gray. n. s. Blaustein (Ltz.), am Pregelufer (Stnr.).
- Falagria thoracica* Curt. n. h. Pillau (Sauter), Neuhäuser (Ltz.).
- F. sulcata* Pk. n. s. unter faulenden Ge wachsen (Kug.), Kbg. (Ltz.).
- * *F. sulcatula* Grav. n. s. an Wasserrändern, Haffstrom (Eld.).
- F. obscura* Grav. n. s. Putzig (Stf.).
- F. nigra* Grav. n. s. wie *sulcata*.
- Bolitochara lunulata* Pk. n. h. in Blätter pilzen.
- B. obliqua* Er. s. Kbg. an Baumschwämmen auf dem Kneiph. Kirchhof (Stor., Ltz.), auf Holzwiesen (Czw.).
- Phytosus balticus* Kraatz s. s. Glettka (Czw.).
- Silusa rubiginosa* Er. n. h. Kbg. (Ltz.).
- Oculea castanea* Er. s. Conitz (Sieb.).
- O. badia* Er. n. h. Nodems am Samländ. Weststrande (Ltz.). Kbg. Poln. Kirchhof (Czw.).
- Ischnoglossa prolixa* Grav. s. s. Dz. (Kumm.).
- I. corticina* Er. s. Kbg. (Ltz.).
- Leptusa analis* Gyll. s. F. F. unter Carpinusrinde (Czw.).
- L. *fumida* Er. s. Dz. (Kumm.).
- L. *ruficollis* Er. n. h. Dz., Kbg. (Czw., Stnr.).
- Thiasophila angulata* Er. s. h. unter Ameisen, Putzig (Stf.).
- T. inquilina* Märk. s. Loppehnen (Eld.).
- Homoeusa acuminata* Märk. wird von Zebe in lit. aus Dz. angegeben; ist aber noch zu bezweifeln.
- Microglossa (Haploglossa) gentilis* Lünem. n. s. an Eichenwurzeln unter Ameisen, Kbg., Moosbude (Pfeil, Ltz.).
- M. pulla* Gyll. n. h. Dz. unter Steinen (Dommer).
- M. rufipennis* Kraatz. s. Kbg. (Sauter).
- M. praetexta* Er. n. h. Kapkeim (Ltz.), Ktzn., Dz. (Czw.), Neuhausen (Stnr.).
- Aleochara fuscipes* Grav. n. s. unter Steinen, im Dünger und bei Aesern (Kug.), Georgens walde (Ltz.).
- A. curta* Sahlb. *fumata* Er. s. Kbg. aus Moos (Sauter).
- A. brevipennis* Grav. n. s. Ggbg. (Kr.).
- A. bipunctata* Oliv. n. h. in sandigen Ge genden unter Dünger (Kug.), Cranz (Ltz.).
- A. morion* Grav. s. Kbg. (Ltz.).
- A. puberula* Klug. s. s. Ktzn. in einem Stalle (Czw.).
- A. crassiuscula* Sahlb. s. Kbg. (Czw.).
- A. tristis* Grav. *nigripes* Mill. n. s. Kbg. (Ltz.).
- A. bisignata* Er. n. s., unter faulendem Holz (Kugel.), Kbg. (Ltz.).
- A. brunneipennis* Kr. s. Kbg. (Ltz.), von Lindenblüthen geklopft Glettka (Czw.).

- A. rufitarsis* Heer. s. Kbg. (Ltz.).
A. lanuginosa Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. villosa Mannh. s. in Taubennestern, Dz. (Dommer).
A. mycetophaga Kr. n. h., Loppehnens (Eld.), Kbg. (Ltz.).
A. moerens Gyll. n. s. Fischhausen (Ltz.), Dz. (Dommer).
A. moesta Grav. h. an Exrementen, Kbg. (Ltz.).
A. bilineata Gyll. n. s. ebenso.
A. nitida Grav. h. ebenso.
A. binotata Kr. h. Loppehnens (Eld.), in den Dünen von Glettkau (Czw.).
A. obscurella Grav. s. Dz. am Seestrande (Dommer), Glettkau (Czw.).
Dinarda Märkelii Kow. n. s. in Ameisennestern, Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).
D. dentata Grav. viel seltener an gleichen Orten (Stf.), Kbg. Wilkie (Sauter).
Atemeles paradoxus Grav. s. bei Ameisen, Putzig (Stf.), Rauschen (Ltz.).
A. emarginatus Grav. n. h. Putzig (Stf.), Ludwigsort in Sandgruben (Sauter).
Lomechusa strumosa Fabr. einmal bei Kbg. unter Ameisen zahlreich (Sauter), sonst s. Dz. (Dommer), Rauschen (Ltz.).
Myrmecodia collaris Payk. n. s. unter moderndem Laube, im Garten von Margen (Ltz.); an Schwämmen unter der Rinde abgestorbener Bäume (Kugel.).
M. humeralis Grav. s. Blaustein (Ltz.).
M. cognata Märk. s. Rosenau bei Kbg. (Ltz.), Dz. (Helm).
M. funesta Grav. s. in Pilzen bei Dz. (Stf.), Vierbrkr. (Stnr.).
M. limbata Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).
M. lugens Grav. s. Dz. (Sieb.).
M. laticollis Märk. s. Loppehnens (Eld.), Dz. (Helm), Vierbrkr. (Stnr.).
M. canaliculata Fabr. s. h. unter Steinen.
Ilyobates nigricollis Pk. s. unter Steinen im Putziger Stadtwalde (Stf.), Schwarzort (Ltz.), Glettkau (Czw.).
I. forticornis Lac. s. s. Ktzn. unter faulenden Pflanzen. (Czw.).
Calodera nigrita Mannh. n. h. in Wäldern, Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.).
C. uliginosa Er. n. h. Ktzn. (Czw.).
C. riparia Er. s. Kbg. am Pregel (Sauter, Czw.).
- C. aethiops* Grav. s. Dz. (Dommer).
C. umbrosa Er. s. wie riparia.
Chilopora rubicunda Er. s. Dz. (Dommer), Neue Bleiche (Czw.);
Tachysa constricta Er. n. h. Ktzn. am Nogatufer, Kbg. Neue Bleiche, Neuhausen (Czw., Stnr.).
T. coarctata Er. h. Dz. am Seestrande (Dommer), Heilsberg am Alleufer (Ltz.), Rastenburg Guberufer, Ktzn. Nogatufer (Czw.).
T. scitula Er. s. Rauschen (Ltz.). Die Angabe von Dommer war unrichtig, es war *Homalota puncticeps* Thoms. (Czw.).
T. flavitarsis Sahlb. *chalybea* Er. s. Ktzn. Rastenbg. (Czw.), Dz. (Dommer).
T. umbratica Er. s. Dz. aus Moos (Dommer).
T. atra n. s. Kbg. (Ltz.).
T. concolor Er. s. Ktzn. am Nogatufer, Kbg. Pregelufer (Czw.).
Ocyusa maura Er. s. Kbg. (Sauter, Stnr., Czw.).
O. picina Aubé s. Ktzn. (Czw.).
Oxypoda ruficornis Gyll. n. s. in Schwämmen u. unter abgefallenem Laube, Putzig, Dz., Elbing (Stf.). Die var. *spectabilis* Märk. bei Ggbg. (Kr.).
O. lividipennis Mannh. *luteipennis* Er. überall h.
O. vittata Märk. s. Kbg. (Sauter).
O. humidula Kr. *umbrata* Er. s. Ggbg. (Kr.).
O. opaca Grav. überall h.
O. funebris Kr. s. Ggbg. (Kr.), F. F. (Czw.).
O. longiuscula Er. n. s. Kbg. (Ltz.).
O. lentula Er. s. Ktzn., Schrb. (Czw.).
O. umbrata Gyll. n. s. Ggbg. (Kr.).
O. cuniculina Er. s. Kbg. (Ltz.).
O. togata Er. h. daselbst.
O. abdominalis Sahlb. s. Dz. (Kumm.).
O. testacea Er. s. s. Sieb.
O. alternans Grav. n. s. Dz. am Meeresstrande und aus Moos (Dommer), Kbg. (Ltz.).
O. exoleta Er. n. h. Dz., Kbg. (Sauter, Czw.).
O. incrassata Rey s. F. F. (Czw.).
O. formiceticola Märk. n. h. in Ameisenhaufen, Kbg. (Dommer, Ltz.).
O. haemorrhoa Sahlb. *myrmecophila* Märk. ebenso, Putzig (Stf.).
O. amoena Fairm. s. Glettkau (Czw.).

- O. terrestris* Kr. wie incrassata.
O. rufescens Kr. s. Kbg. (Czw.).
O. annularis Sahlb. s. Ggbg. (Kr.).
O. brachyptera Steph. ferruginea Er. s. Schrb. (Czw.)
- Homalota.* Der Uebersichtlichkeit wegen werde ich die sehr bedeutende Menge der Species (97) in alphabetischer Reihenfolge aufzählen.
- H. aequata* Er. n. s. Kbg. (Sauter, Ltz., Stnr.).
H. analis Grav. g. unter Blättern u. im Moose.
H. anceps Er. h. am Meeresstrande (Dommer, Ltz.).
H. angusticollis Thoms. s. Schrb. in Pilzen (Czw.), nach Eppelsh. ♀ von ravilla.
H. angustula Gyll. h. Dz. (Frantz.), Kbg. (Ltz.).
H. aterrima Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. atramentaria Gyll. n. s. Kbg. Pregelwiesen, Glettkau im Kuhdünger (Czw.).
H. atricolor Sharp. mortuorum Sharp. s., wie angusticollis.
H. cadaverina Bris. ebenso.
H. cauta Er. parvula Mannh. s. Kbg. (Sauter).
H. cavifrons Sharp. s. F. F. (Stnr. Czw.).
H. celata Er. n. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).
H. cinnamomea Grav. s. am ausgeflossenen Eichensaft Dz. (Dommer); Neuhausen, Memel (Stnr.).
H. circellaris Grav. unter Abiesrinde g.
H. coriaria Kr. n. h. Kbg. (Ltz.).
H. cuspidata Er. unter Rinden s. h.
H. debilis Er. s. im Röhricht am Pregel-damme (Ltz.).
H. decipiens Sharp. s. Schrb., F. F. (Czw.), nach Eppelsh. ♀ zu analis gehörig.
H. deformis Kr. n. h. Pregelwiesen, Schrb., Ktzn. (Czw.).
H. depressa Grav. brunnea Fabr. s. unter faulenden Vegetabilien, Putzig (Stf.).
H. divisa Märk. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. elongatula Grav. h. am ausfliessenden Baumsaft Kbg. (Ltz.).
H. exilis Er. n. s. Kbg. (Sauter, (Ltz.).
H. flavipes Grav. h. überall.
H. fragilicornis Kr. s. Ktzn. am Nogatufer (Czw.).
- H. fungi* Grav. g. unter Laub; var. órbata Er. Glettkau (Czw.).
H. fungicola Thoms. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. gagatina Baudi. variabilis Kr. n. s. Kbg (Ltz.).
H. gemina Er. s. Kbg. (Ltz.).
H. germana Sharp. n. h. Kbg. (Czw.).
H. graminicola Grav. h. Kbg. (Ltz.).
H. granigera Ksw. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Sauter).
H. gregaria Er. Tachyusa immunita Er. h. Kbg. (Ltz.).
H. grisea Thoins. s. Kbg. (Czw.). Seidl. Fn. Balt. p. 302.
H. humeralis Kr. s. in der F. F. im Schwamm eines Carpinusstammes (Czw.).
H. hygrobia Thoms. s. Kbg. (Czw.).
H. hypnorum Ksw. silvicola Fuss. s. Corjeiten, am Meeresstrande (Ltz.).
H. ignobilis Sharp. s. Kbg. (Sauter, Stnr.), Dz. (Czw.).
H.immersa Er. s. Loppehnen (Eld.); Ggbg. (Kr.).
H. incana Er. s. Kbg. Holzwiesen- (Ltz., Stnr.).
H. inquinula Er. n. s. Loppehnen (Eld.), Ggbg. (Kr.).
H. insecta Thoms. languida Scriba s. Neuhäuser, unter Tang (Stnr.), Pregelwiesen (Czw.).
H. labilis Er. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. laevana Rey. setigera Sharp. n. s. an Excrementen Ggbg. (Kr.), Schrb. (Czw.).
H. languida Er. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Sauter); in der Dommerschen Sammlung hat Czw. 3 St. geschen.
H. lepida Kr. corvina Thoms. s. in Pilzen bei Jäschkenthal (Czw.).
H. linearis Grav. s. Kbg. (Ltz.).
H. lividipennis Er. überall h. am Baum-saft.
H. longicornis Grav. h. ebenso.
H. luridipennis Mannh. h. ebenso.
H. luteipes Er. s. F. F. (Czw.).
H. marcida Er. s. Kbg. (Ltz.).
H. merdaria Thoms. n. s. in übelriechen-den Pilzen, Kbg. (Ltz.).
H. nigerrima Aubé. s. Seestrand (Eld.).
H. nigricornis Thoms. n. h. Kbg., Dz. (Czw.).
H. nigritula Grav. s. Kbg. vom Pregel-damm (Ltz.).

H. nitidula Kr. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. obliterata Er. s. Ktzn. (Czw.).
H. oblonga Er. s. Kbg. (Czw.).
H. occulta Er. h. Dz., im Frühjahr am Meeresstrande (Dommer).
H. orphana Er. n. s. Kbg. (Ltz.).
H. pagana Er. s. Kbg. (Czw.).
H. palleola Er. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.).
H. palustris Ksw. s. Dz. am Strande (Dommer), Kbg. (Ltz.).
H. pilicornis Thoms. pilosa Kr. s. Schrb. (Czw.).
H. plana Gyll. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Stnr.).
H. pulchra Kr. s. Schrb. Ktzn. (Czw.).
H. pumila Kr. s. Kbg. (Czw.).
H. puncticeps Thoms. s. an der Seeküste, Neufahrwasser (Czw.), in der Dommerschen Sammlung als *Tachyusa scitula* bezeichnet (Czw.).
H. pygmaea Grav. n. h. Ggbg. (Kr.), die var. *obfuscata* Grav. aus Moos, Kbg. (Sauter).
H. ravilla Er. s. F. F. (Czw.), cf. *angusticollis*.
H. sericea Rey. s. Ggbg. (Kr.).
H. simillima Sharp. s. F. F. (Stnr.).
H. sodalis Er. s. Kbg. (Ltz.).
H. sordidula Er. h. Kbg., im Pferdedünger auf den Holzwiesen (Czw.), Loppehnen (Eld.).
H. soror Kr. s. Kbg. Ktzn. (Czw.).
H. splendens Kr. s. Rastenburg (Czw.).
H. stercoraria Kr. s. Dz., an der Krähen- schanze unter Steinen (Czw.).
H. subalpina Rey. s. Kbg. (Sauter).
H. sublinearis Kr. s. Kbg. (Ltz.); mitunter sehr zahlreich bei Katzn. (Czw.).
H. subrugosa Ksw. s. F. F. (Czw.).
H. subsinuata Er. s. Karlikau bei Zoppot (Czw.).
H. subterranea Rey. s. Ggbg. (Kr.).
H. subtilis Scriba. s. Schrb., F. F. (Czw.).
H. talpa Heer. n. s. Kbg. (Dommer), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.).
H. terminalis Gyll. n. s. Samland. Seestrand (Eld. Ltz.), Ggbg. (Kr.).
H. testudinea Er. s. ebendaselbst.
H. thinobioides Kr. s. Loppehnen (Eld.).
H. tibialis Heer. obwohl ein entschiedener Gebirgskäfer, doch in 2 Stück von Czw. bei Schrb. und in der F. F. gefangen (von Scriba bestimmt).

H. trinotata Kr. socialis Thoms. n. s. am Baumsaft Kbg. (Ltz.).
H. validicornis Märk. n. s. am Eichensaft Kbg. (Ltz.).
H. velata Er. n. s. Dz. (Dommer).
H. vernacula Er. n. s. Dz. (Dommer) Kbg. (Ltz.), Ggbg. (Kr.).
H. vestita Grav. n. s. am Ostseestrande (Dommer, Eld., Ltz.).
H. vicina Kr. nigra Kr. n. s. Loppehnen (Eld.), Löwenhagen (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
H. vilis Er. s. F. F. (Czw.).
H. violans Scriba. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. auf den Pregelwiesen (Czw.).
Placusa complanata Er. s. aus Röhricht am Pregeldamme (Ltz.).
P. atrata Sahlb. s. Ktzn. (Czw.).
P. infima Er. s. Kbg. ♂ ♀ (Sauter).
P. adscita Er. s. F. F. (Czw.).
Cyphea curvula Er. s. F. F. unter Rinde von carpinus; die Vermuthung von Kraatz K. D. H. 191 ist richtig (Czw.).
Phloecopora reptans Grav. h. unter Tannen- rinde Kbg. (Ltz.).
P. corticalis Grav. ebenso.
Hygronoma dimidiata Grav. s. auf Wasser- pflanzen b. Heub. (Dommer); unter ausgespültem Röhricht Zinten (Ltz.); Ktzn., Kbg. (Czw.).
Oligota pusillima Grav. n. s. aus Moos vom Seestrande (Eld.); auf Waldwiesen bei Sonnen- untergang geschöpft Putzig (Stf.).
O. parva Kr. s. Kbg. Poln. Kirchhof (Czw.).
O. inflata Mannh. n. h. Dz., Ktzn. (Czw.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).
O. granaria Er. s. wie pusillima, Kbg. (Czw. Stnr.), Schwarzort (Stnr.).
O. flavidornis Lac. s. F. F. (Stnr.).
Encephalus complicans Westw. s. s. Löwen- hagen auf dem östlichen Abhange des Waldes, Rastenburg. (Czw.), Vierbrkr. aus Moos (Stnr.).
Gyrophaena pulchella Heer. n. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Czw.). Alle Species in Blätterpilzen.
G. affinis Sahlb. n. s. Neuhäuser (Ltz.).
G. punctulata Rey. s. F. F. (Czw.), 6 St. alles ♂; auch Muls. sagt: la femelle nous est inconnue (Société Linn. Lyon 1872).
G. gentilis Er. s. Schrb. (Stnr.).
G. nana Pk. überall g.
G. laevipennis Kr. n. h. Kbg. auf dem Poln. Kirchhof (Czw. Stnr.).

- G. lucidula* Er. s. daselbst (Czw.).
G. congrua Er. h. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
G. bihamata Thoms. s. F. F. Ktzn. (Czw.).
G. minima Er. n. s. Dz. (Dommer).
G. manca Er. n. s. Loppehn (Eld. Ltz.).
G. polita Grav. ebenso.
G. strictula Er. s. ebenso, im Schlossgarten von Friedrichstein (Ltz.).
G. boleti L. n. s. ebenso, F. F. (Stnr.).
Pronomaea rostrata Er. bei Ggbg. (Kr.) nicht sehr selten; Heub. Dz. (Czw.).
Myllaena dubia Grav. s. im Grebbiner Walde im Frühjahr unter feuchtem Laube (Dommer), Kbg. (Stnr.).
M. intermedia Er. n. s. ebenso.
M. minuta Grav. h. aus Moos von Sorquitten (Eld.), unter Tang bei Zoppot, Mai (Stf.).
Gymnusa brevicollis Pk. s. Dz. in Wäldern unter Laub und im Moose (Dommer).
Dinopsis fuscata Math. s. Grebbiner Wald (Dommer), Ktzn. (Czw.).
Hypocyptus longicornis Pk. n. h Putzig Mai, Juni (Stf.); Neuhausen, F. F., Metgethen (Stnr.), Oliva (Czw.).
H. seminulum Er. n. s. Neuhäuser (Ltz.), Glettka (Czw.).
H. laeviuscula's Mannh. s. Dz., aus Moos (Dommer), Kbg. (Czw.).
Trichophya pilicornis Gyll. s. s. Rastenburg (Czw.).
Habrocerus capillaricornis Grav. n. h. Kbg. auf dem Poln. Kirchhof, Dz. am Carlsberg, Ktzn. unter Stroh (Czw.), F. F. (Stnr.).
Leucoparyphus silphoides L. n. s., im Frühjahr an Apfelblüthen (Dommer); auf Eichen, Rauschen (Ltz.), im Kuhdüniger in den Dünen von Glettka (Czw.).
Tachinus humeralis Grav. Loppehn (Eld.).
T. rufipes Deg. h. im Dünger (Ltz.).
T. flavipes Fabr. g. ebenso.
T. rufipennis Gyll. s. Kbg. bei Wilkie (Pfeil), Ggbg. (Kr.).
T. marginatus Gyll. n. h. Rauschen (Ltz.), Hlglb. (Stnr.), in der Dommerschen Sammlung als *T. pallipes* Grav. (Czw.).
T. pallipes Grav. s. Blaustein (Ltz.).
T. bipustulatus Fabr. n. h. unter Steinen (Kug.), hiezu gehören die 4 St. der Dommerschen Sammlung, die er *pallipes* Gray. bezeichnet hat (Czw.).
T. subterraneus L. n. h. am ausfliessenden Birkensaft, Blaustein (Ltz.).
T. simetarius Fabr. g. auf Hollunderblüthen.
T. marginellus Fabr. s. Dz. (Sieb.).
T. laticollis Grav. n. s. Kbg. (Czw. Ltz.).
T. collaris Grav. h. an feuchten, schattigen Stellen (Kugel.), Kbg. (Ltz.).
Tachyporus obtusus L. überall h.
T. formosus Matth. s. s. Schrb. (Czw.).
T. ruficeps Kr. s. aus Ellernlaub gesiebt an der Dallnitz bei Lyck (Sanio).
T. solutus Er. n. s. Kbg. (Ltz. Stnr.)
T. chrysomelinus L. g.
T. hypnorum Fabr. g.
T. tersus Er. s. s. Dz. 1869 (Helm).
T. atriceps Steph. humerosus Er. s. bei Stegen, unter Fichtennadeln (Dommer), Kbg. (Stnr.).
T. ruficollis Grav. s. Kbg. (Sauter).
T. transversalis Grav. h. Dz. aus Moos (Dommer), Kbg. (Ltz.).
T. scitulus Er. ebenso.
T. pusillus Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
T. brunneus Fabr. n. s. an feuchten, schattigen Stellen (Kugel. Sieb.).
T. saginatus Grav. s. Osterode, in der Erde, auf Blumen, in Schwämmen (Kugel.), Dz. (Sieb.), Glettka (Czw.), F. F. (Stnr.).
Conurus pubescens Pk. h. unter Laub, Kbg. (Ltz.).
C. pedicularius Grav. n. s. an alten Baumstämmen im Moose (Kugel. Dommer).
C. littoreus L. n. s. Kbg. Holzwiesen, Ju-ditten (Ltz. Stnr.).
C. bipustulatus Grav. Osterode unter modernem Holze, unter Baumrinde (Kugel.), jedoch nicht wieder gefunden.
C. bipunctatus Grav. s. an einem Weiden-stubben bei Heub. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
Bolitobius lunulatus L. atricapillus Fabr. h. in faulenden Pilzen, Kbg. (Ltz.).
B. pulchellus Mannh. lunulatus Er. bei Putzig n. s. Mai—October (Stf.).
B. trinotatus Er. s. Kbg. vom Pregeldamm (Ltz.)
B. exoletus Er. n. s. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
B. pygmaeus Fabr. g. hierher gehört sicher auch *B. trimaculatus*, von dem Kugel. sagt, dass er von ihm in einem Agaricus wohl über

tausend Stücke gefunden habe. Die var. *intrusus* Hampe. Rauschen (Ltz.).

B. striatus Oliv. s. Osterode in faulendem Holze, (Kugel.), Kbg. aus Moos (Sauter), Schrb. (Czw.).

B. cingulatus Mannh. n. h. Kbg. bei Liep (Ltz.), Glettkau (Czw.).

B. analis Payk. s. Putzig, Elbing Mai — October (Stf.).

B. inclinans Grav. s. s. überwinternd an Weiden, die mit Pilzen besetzt sind, Gr. Zündler (Dommer).

B. formosus Grav. n. s. in feuchtem Moose, Putzig (Stf.), Ktzn. Schrb. F. F. (Czw. Stnr.).

B. cernuus Grav. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

B. rufus Er. s. Schwarzort (Ltz., Schieff.).

Mycetoporus splendidus Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).

M. lucidus Er. s. aus Moos von Dammhof (Sauter).

M. nanus Er. n. h. Kbg., nasser Garten (Czw.).

M. punctus Gyll., wie *lucidus*; Schwarzort (Ltz.).

M. brunneus Marsh. *longulus* Mannh. *lepidus* Grav. *ruficornis* Kr. n. s. in Pilzen, Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer, Czw.).

M. splendens Marsh. s. Rauschen (Ltz.).

M. pronus Er. n. s. aus Moos, F. F. (Ltz., Stnr.).

Acylophorus glabriocollis Grav. s. s. Ggbg. (Kr.).

Euryporus picipes Payk. s. Schrb., F. F., Löwenhagen im Spätherbst (Stnr.), Ggbg. (Kr.).

Heterothops praevia Er. n. s. an Stubben im Moose (Dommer), Kbg. (Ltz.).

H. binotata Grav. *quadripunctula* Gyll. h. am Seestrande (Ltz.), Kbg. Holzwiesen, F. F. (Stnr.).

H. dissimilis Gray. s. an feuchten, dumpfigen Orten (Kugel.), an Stubben im Moose (Dommer).

Quedius dilatatus Fabr. s. s. im Ottominer Walde an ausgeflossenem Eichensaft, August (Dommer); Warnicken (Eld.).

Q. chrysurus Ksw. s. Ggbg. (Kr.).

Q. brevis Er. n. h. Putzig, April—Juni, unter Ameisen (Stf.), Neuhausen (Stnr.).

Q. lateralis Grav. n. s. in faulenden Pilzen bei Zoppot, Aug. Septbr. (Dommer), Putzig (Stf.), Rauschen (Stnr.).

Q. fulgidus Fabr. (mit rothen Decken) n. h. Katznase (Czw.), Kbg. (Stnr.).

Q. mesomelinus Marsh. (schwarz) h. im Moose (Ltz.).

Q. cruentus Oliv. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. Plantage (Stnr.).

Q. xanthopus Er. n. s. im Waldlaube (Dommer), Kbg. (Stnr.).

Q. scitus Grav. s. Kbg. (Ltz.).

Q. laevigatus Gyll. s. Putzig (Stf.), Schrb., F. F. (Czw. Stnr.).

Q. impressus Panz. s. unter Steinen in Wäldern (Kugel.), Putzig (Stf.), Kbg. am Trenker Waldhause (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

Q. fuliginosus Grav. h. im Moose.

Q. molochinus Grav. ebenso.

Q. umbrinus Er. s. im Moose überwinternd (Dommer).

Q. nigriceps Kr. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).

Q. praecox Grav. s. von Blumen geschöpft (Dommer).

Q. suturalis Ksw. n. s. Ggbg. (Kr.).

Q. marginalis Kr. s. s. Dz. Jäschkenthal (Czw.).

Q. scintillans Grav. s. Trenker Waldhaus (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

Q. maurorufus Grav. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

Q. lucidulus Er. s., von Büschen geklopft (Dommer), Ggbg. (Kr.).

Q. attenuatus Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

Q. boops Grav. s. Putzig (Stf.), am Pregel (Stnr.).

Emus maxillosus L. h. am Aase, Kbg. (Ltz.).

E. hirtus L. s. Blaustein an Kuhdünger (Ltz.).

Leistostrophus nebulosus Fabr. h. wie *Emus maxillosus*.

L. murinus L. ebenso.

Staphylinus pubescens Deg. n. s. wie *Emus maxillosus*.

S. fulvipes Scop. s. s. unter Laub in Wäldern (Dommer), Vierbrkr. (Stnr.).

S. stercorarius Oliv. s. Dz. (Sieb.).

S. latebricola Grav. s. ebenso.

S. erythropterus L. h. in Wäldern, Warnicken, Lyck, Rastenburg (Ltz.).

- S. caesareus* Cederh. überall h.
- S. Ocypus olens* Müll. s. Heilsberg, Rastenburg (Sieb.).
- S. brunnipes* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).
- S. cyaneus* Payk. s. Allenstein, in faulenden Stämmen (Kugel.), Braunsberg (Stnr.), im Walde von Schwarzort, Juli (Ltz.), Oliva (Czw.).
- S. similis* Fabr. s. Dz. (Sieb.).
- S. picipennis* Fabr. n. s. im Moose, Fischhausen (Ltz.).
- S. fuscatus* Grav. n. h. Zoppot (Ltz.), Ggbg. (Kr.).
- S. cupreus* Rossi. n. h. Kbg. (Ltz.).
- S. ater* Grav. s. Ktzn. (Czw.).
- S. morio* Grav. s. in trockenen Gräben bei Gr. Zünder (Dommer), Kbg. (Ltz.)
- Philonthus xantholoma* Grav. an der Sammländ. Seeküste unter Tang mitunter n. s. (Eld. Ltz.).
- P. cinerascens* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
- P. elongatus* Er. s. Kbg. auf Pregelwiesen (Czw. Stnr.).
- P. procerulus* Grav. Kgb. (Ltz. Stnr.).
- P. prolixus* Er. s. Rastenburg, am Kiesufer der Guber (Czw.).
- P. splendidens* Fabr. s. Kbg. (Ltz.), Schrb. (Czw.).
- P. intermedius* Lac. s. Dz. (Ltz.)
- P. nitidus* Febr. s. Kbg. (Ltz.).
- P. proximus* Kr. carbonarius Er. succicola Thoms. z. h. im Dünger, Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
- P. carbonarius* Gyll. tenuicornis Muls. n. s. Schromb. (Czw. Stnr.).
- P. aeneus* Rossi. s. h. überall.
- P. punctus* Grav. mit var. *binotatus* Grav. s. Schwarzort (Ltz.), Kbg. nasse Garten (Czw.).
- P. puella* Nordm. s. am Eichensaft, Schrömb. (Czw.).
- P. cephalotes* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
- P. umbratilis* Grav. s. Ludwigsort (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
- P. sordidus* Grav. n. s. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
- P. fuscus* Grav. s. Dz., Grebbiner Wald am Eichensaft (Dommer, Ltz.), Schwarzort in Reihernestern (Czw.), Kbg. am Pappelsaft (Stnr.).
- P. sanguinolentus* Grav. n. s. am Aase (Kugel.), in frischem Dünger (Ltz.).
- P. ventralis* Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
- P. debilis* Er. s. ebenso.
- P. discoideus* Grav. n. s. unter faulenden Gewächsen (Kugel.), Dz., in Stubben (Dommer), Kbg. am Trenker Waldhause (Ltz.).
- P. laminatus* Creutz. n. s. Dirschau an der Weichselbrücke (Ltz.).
- P. atratus* Grav. ebenso.
- P. laevicollis* Lac. s. Kbg. (Ltz., Sauter).
- P. dimidiatus* Sahlb. s. am Weichsel- und Haffuser, Juli (Dommer).
- P. ebeninus* Grav. in allen Größen g. Die var. *coruscus* Grav. seltener, Kbg. (Ltz.), Ggbg. (Kr.).
- P. quisquiliarius* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.), die var. *rubidus* Er. Ggbg. (Kr.).
- P. splendidulus* Grav. n. s. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).
- P. simetarius* Grav. ebenso, Dz. (Kumm.).
- P. nigritulus* Grav. *trossulus* Nordm. s. h. Kbg. (Ltz.).
- P. decorus* Grav. n. h. Kapkeim (Ltz.).
- P. politus* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
- P. lepidus* Grav. s. im Frühjahr, Putzig (Stf.), Dz. (Czw.).
- P. nitidulus* Grav. s. Dz. auf der Krähenschanze (Czw.).
- P. varius* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.), die var. *bimaculatus* Grav. s. Putzig (Stf.).
- P. tenuis* Fabr. im Süden der Prov. n. s. bei Osterode auf Aeckern unter Steinen (Kugel.), Conitz (Sieb.), Blaustein (Ltz.).
- P. marginatus* Müll. h. im frischen Dünger, Kbg. (Ltz.).
- P. bipustulatus* Panz. n. h. Kbg. (Ltz.).
- P. scybalaria* Nordm. n. h. ebenso, Dz. (Czw.).
- P. varians* Payk. *opacus* Thoms. in frischem Dünger g. auch die var. *agilis* Grav. Kbg. (Ltz.).
- P. albipes* Grav. s. Ggbg. (Kr.).
- P. fumarius* Grav. s. in abgefallenem Laube, Kbg. (Ltz.), am Dammteich, Juni (Czw.).
- P. nigrita* Grav. s. h. ebenso.
- P. micans* Grav. g. ebenso.
- P. fulvipes* Fabr. n. s. an Flussufern (Czw.).
- P. virgo* Grav. s. s. Kbg. (Pfeil).
- P. vernalis* Grav. n. s. unter abgefallenem Laube, Kbg. (Ltz.).
- Xantholinus relucens* Grav. s. Ggbg. (Kr.).
- X. glaber* Nordm. s. in fetter Erde (Kugel.), Juditten (Stnr.).

X. rufipennis Er. s. Kbg. an Birkenstubben in Wilkie (Pfeil).

X. tricolor Fabr. n. s. in Fanggräben der Forsten und unter Moos (Dommer, Frantzius, Ltz.).

X. distans Rey. ebenso, Kbg. (Czw., Ltz.).

X. linearis Oliv. longiventris Heer. h. unter Laub, Kbg. (Ltz.), Dz. (Helm.).

X. punctulatus Payk. ochraceus Gyll. h. ebenso.

X. fulgidus Fabr. s. in Wäldern unter faulendem Holz, Osterode (Kugel.), Dz. (Dommer), Kbg. im Tharauer Walde (Ltz.).

X. lenfus Grav. bei Rastenburg im Walde von Blaustein n. s. unter Abiesrinde (Ltz.).

Leptacinus batychrus Gyll. *linearis* Grav. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. Plantage (Stnr.).

L. formicetorum Märk. h. unter Ameisen, Kbg. (Eld., Ltz.).

Baptolinus pilicornis Payk. s. Dz. in einer Sägegrube (Dommer), Kbg. in Abiesstubben (Ltz.).

B. alternans Grav. s. Loppehnen (Eld.), Schwarzort im Pilz einer alten Weide (Ltz.), unter Kiefernrinde Kbg. (Czw.).

Othius fulvipennis Fabr. n. s. unter abgefallenem Laube und Nadeln, Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).

O. melanocephalus Grav. h. in feuchtem Moose u. Baummoder Kbg. (Ltz., Stnr.).

O. lapidicola Ksw. s. Ludwigsort (Ltz.), Wilkie (Pfeil).

O. myrmecophilus Ksw. s. Dz. aus Laub gesiebt neben dem Carlsberg bei Oliva (Czw.), Kbg. (Ltz.).

Lathrobium brunnipes Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

L. elongatum L. s. h. unter Laub, Kbg. (Ltz.).

L. boreale Hochh. s. s. F. F. (Czw.).

L. fulvipenne Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).

L. rufipenne Gyll. s. Dz. (Dommer).

L. filiforme Grav. s. Kbg. (Ltz.).

L. longulum Grav. s. aus Moos (Eld.), Putzig Juni (Stf.).

L. multipunctum Grav. Dz. auf Feldern n. s. (Dommer), Corjeiten (Ltz.).

L. scutellare Nordm. s. s. auf einem Felde neben der F. F. (Czw.).

L. quadratum Payk. n. s. unter Laub, Kbg. (Ltz.).

L. terminatum Grav. ebenso, bei Putzig s. (Stf.). bei Kbg. h. Wernsdorf (Kuwert). Ich kann mich von der Identität mit *quadratum* nicht überzeugen, letzteres ist stets grösser, breiter und überhaupt plumper gebaut; auch habe ich *terminatum* ohne rothe Punkte hier noch nicht gesehen. Czw. sagt darüber folgendes: Auch ich würde nach den bei uns vorkommenden Stücken die Arten sicher trennen: aber aus Italien (Vallombrosa) habe ich wirkliche Mittelformen mitgebracht und bin seitdem Fauvels Ansicht von der Nothwendigkeit der Vereinigung beigetreten. Es scheinen werdende Arten (Darwin), die bei uns schon getrennt sind.

L. punctatum Zett. n. h. Kbg. (Ltz.).

L. pallidum Nordm. s. in trocknen Gräben, Gr. Zünder (Dommer), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

L. scabricolle Er. s. s. Kbg. in Birkenstubben bei Wilkie (Pfeil).

Cryptobium fracticorne Pk. n. s. auf alten Baumwurzeln unter Moos (Kugel.), Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz., Stnr.).

Lithocharis ochracea Grav. s. aus Moos Dz. (Frantz.), Kbg. (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

L. obsoleta Nordm. *obscurella* Er. s. Ktzn. (Czw.).

L. melanocephala F. s. Dz. (Dommer), Wilkie in Abiesstubben (Ltz.).

Scopaeus laevigatus Gyll. n. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Sauter, Stnr.).

S. cognatus Rey. s. unter Röhricht, Kbg. (Ltz.), Rauschen (Stnr.).

S. sulcicollis Steph. *minutus* Er. s. in einer Sandgrube, Ktzn. (Czw.).

S. fragilis Grav. s. am Seestrande bei Adlershorst, Juni (Dommer).

S. orbiculatus Payk. h. unter faulendem Heu, Kbg. (Ltz.).

S. geniculatus Er. s. Kbg. auf der Plantage 1 ♂ (Czw.).

S. similis Er. s. Kbg., in der Brandenburger Haide (Ltz.).

S. rufipes Germ. s. h. mit *orbiculatus*.

S. subtilis Er. s. Dz. (Sieb.).

Sunius filiformis Latr. s. Seestrand bei Kahlberg (Dommer), Ggbg. (Kr.).

S. angustatus Payk. n. s. Putzig, unter Steinen (Stf.), Kbg. im Moose (Sauter, Czw., Ltz.).

Paederus riparius L. h. auf sandigen Ufern unter Schilf, Kbg. (Ltz.).

- P. littoralis* Grav. ebenso.
P. longipennis Er. ebenso.
P. limnophilus Er. s. Rauschen (Stnr.).
P. ruficollis Fabr. s. Osterode (Kugel.), Dz. (Sieb.).
Dianous coeruleoalbus Gyll. s. Putzig, am Seeufer unter Tang, im ersten Frühjahr (Stf.).
Stenus biguttatus L. s. h. unter feuchtem Laub in Gärten.
S. bipunctatus Er. weniger h. Kbg. (Ltz.).
S. guttula Müll. s. Dz. (Dommer).
S. aterrimus Er. n. h. Putzig, bei Ameisen, April-Juni (Stf.), F. F. (Stnr.).
S. nanus Steph. declaratus Er. n. h. Kbg., aus Röhricht (Sauter).
S. stigmata Er. s. Ktzn. am Nogatufer (Czw.).
S. bimaculatus Gyll. s. Kbg. (Dommer, Ltz.).
S. speculator Lac. n. s. Conitz (Sieb.); Kbg. Dammhof unter Schilf (Ltz.).
S. providus Er. h. Kbg. (Ltz.).
S. lustrator Er. s. Kbg. (Ltz.).
S. silvester Er. s. F. F. 2 ♂ (Czw., Stnr.).
S. calcaratus Scrib. s. Glettkauf, Schromb. Neue Bleiche (Czw.), am Pregel (Stnr.).
S. Juno Fabr. s. h. überall.
S. ater Mannh. n. s. F. F. (Stnr.), Dz. (Czw.).
S. longitarsis Thoms. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.).
S. circularis Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. palpus Zett. *argentellus* Thoms. s. Glettkauf (Czw.).
S. bupthalmus Grav. h. Kbg. (Ltz.).
S. incrassatus Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.), Dammhof (Stnr.).
S. melanarius Steph. *cinerascens* Er. n. h. Kbg. (Ltz.).
S. canaliculatus Gyll. n. h. Conitz (Sieb.).
S. nitens Steph. *aemulus* Er. s. Blaustein (Ltz.).
S. melanopus Marsh. *nitidus* Lac. s. Ktzn. unter Spreu (Czw.), Kbg. (Stnr.).
S. atratulus Er. n. s. Kbg. (Sauter, Ltz.).
S. morio Grav. h. ebenso.
S. vaellus Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw.).
S. cautus Er. s. ebenso.
S. fuscipes Grav. g.
S. crassiventris Thoms. s. Schwarzort (Stnr.).
S. opticus Grav. s. Putzig (Stf.), Pregelufer, Dammhof (Stnr.).
S. argus Grav. s. Kbg. (Ltz., Schieffdr.).
S. humilis Er. s. h.
S. carbonarius Gyll. *niger* Mannh. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. nigritulus Gyll. s. ebenso.
S. latifrons Er. s. ebenso.
S. paganus Er. s. Dz. am Seestrande (Dommer).
S. tarsalis Ljung. g. auf Wasserpflanzen.
S. oculatus Grav. h. ebenso.
S. cicindeloides Schall. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. Holzwiesen (Star.), Rastenbg. (Czw.).
S. contractus Er. s. Radauneuer (Dommer), Kbg. (Czw., Stnr.).
S. subimpressus Er. s. Blaustein (Ltz.), Kbg. Prege wiesen (Czw.), Neuhausen (Stnr.).
S. binotatus Ljung. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. plantaris Er. s. h. wie *tarsalis*.
S. picipes Steph. *ruficollis* Er. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. bifoveolatus Gyll. s. Kbg. (Czw.).
S. tempestivus Er. s. Oliva, Juli (Czw.).
S. filum Er. n. s. auf feuchten Waldwiesen, F. F. (Czw.), Horst am Pregel (Ltz.).
S. impressus Germ. n. s. im Waldmoose, Kbg. (Ltz.).
S. geniculatus Grav. s. Oliva, Schrb. (Czw., Stnr.).
S. pallipes Grav. n. s. Kbg. (Ltz.).
S. palustris Er. s. Ktzn. (Czw.).
S. flavipes Er. n. s. F. F. (Stnr.), Kbg. (Sauter).
Euaesthetus scaber Grav. n. s. Putzig (Stf.) Kbg. Pregeldanum (Ltz.).
E. ruficapillus Lac. n. s. Teichrand von Dammhof (Eld.), Kbg. (Ltz.).
E. laeviusculus Mannh. n. h. wie *scaber*.
Oxyporus rufus L. h. in Blätterpilzen.
O. maxillosus Fabr. s. Elbing (Ltz.), Rauschen, Georgenswalde (Stnr.).
Bledius tricornis Hbst. Osterode in fetter Gartenerde (Kugel.), Hlgl. (Stnr.), Pregelwiesen (Czw.).
B. arenarius Payk. n. h. Tilsit (Ltz.), Glettkauf (Czw.).
B. talpa Gyll. einmal im Mai in Menge gefunden, am Ufer des Ottominer Sees, sonst nicht wieder (Dommer).

- B. subterraneus** Er. h. Kbg. (Ltz., Stnr.).
B. pallipes Grav. terebrans Schiödt. s.
Dz. am Seestrande (Dommer), Loppehnen (Stnr.).
B. erraticus Er. h. daselbst; Cranz (Ltz.).
B. atricapillus Germ. nanus Er. s. Neuhäuser (Stnr.).
B. opacus Block. n. h. in trocknen Gräben (Dommer).
B. longulus Er. s. Dz. (Sieb.).
B. crassicollis Lac. ebenso (Dommer).
B. procerulus Er. s. Kbg. Pregeldamm (Czw., Stnr.).
B. fracticornis Payk. n. s. Kbg. Trenker Waldhaus (Ltz.).
Platystethus morsitans Payk. g. im Dünger.
P. cornutus Gyll. n. h. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).
P. capito Heer. s. Kbg. (Ltz.)
P. nodifrons Sahlb. n. h. ebenso.
P. nitens Sahlb. n. s. Kbg. Neuhäuser (Ltz., Stnr.).
Oxytelus rugosus Fabr. g. im Dünger.
O. Eppelsheimii Bethe. s. Dz., F. F. (Czw., Stnr.).
O. insectatus Grav. s. Kbg. Liep (Ltz.).
O. fulvipes Er. s. s. besitzt aus Pr. Schiffdr.
O. luteipennis Er. s. Dz. im Pferdedünger (Dommer), Neuhausen (Stnr.).
O. piceus L. h. Conitz (Sieb.), Marienburg (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).
O. sculptus Grav. s. Kbg. (Ltz., Stnr.).
O. inustus Grav. s. ebenso.
O. sculpturatus Grav. s. im Pferdedünger (Dommer).
O. nitidulus Grav. g.
O. complanatus Er. g.
O. Saulcyi Pand. s. Kbg. auf dem Polnischen Kirchhof, Ktzn. (Czw.).
O. transversalis Czw., n. h. Berl. Ent. Zt. 1870 p. 411, unter Laub, Kbg., Ktzn. Dz. (Czw.).
O. depressus Grav. g.
O. affinis Czw. s. Kbg., Ktzn. (Czw.).
O. tetratomata Czw. s. s. Kbg. auf dem Poln. Kirchhoff (Czw.).
Haploderus caelatus Grav. n. h. Putzig (Stf.), Zinten (Ltz.).
H. caesus Er. s. Rauschen (Ltz.).
Trogophloeus bilineatus Steph. riparius Lac. n. h. Putzig (Stf.), Wilkie (Eld.), Ktzn. (Czw.).
- T. obesus** Ksw. s. Ggbg. (Kr.).
T. fuliginosus Grav. s. Putzig (Stf.).
T. inquilinus Er. s. Kbg. (Eld.).
T. corticinus Grav. g.
T. elongatus Er. n. s. Ggbg. (Kr.), Vierbrkr. (Stnr.), Ktzn. (Czw.).
T. foveolatus Sahlb. s. Putzig (Stf.), Heub. (Czw.).
T. exiguum Er. n. h. im Pferdedünger (Dommer), Kbg. (Stnr.).
T. pusillus Grav. n. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Czw.).
T. tenellus Er. s. Loppehnen (Eld.), Ggbg. (Kr.), Kbg. (Czw.).
T. subtilis Er. s. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.), Zinten (Ltz.).
Thinobius longipennis Heer. s. Rastenburg, an der Guber (Czw.).
T. brevipennis Ksw. s. Kbg. (Sauter), Heub. (Czw.).
Syntomium aeneum Müll. s. Neuhäuser (Stnr.), Ktzn. an einem Grabenrande unter Blättern, October (Czw.).
Coprophilus striatus Fabr. n. s. Seestrand bei Zoppot, Mai (Dommer), Zinten (Ltz.).
Compsochilus palpalis Er. Ggbg. (Kr.), Pregelwiesen (Czw.).
Acrognathus mandibularis Gyll. s. Ggbg. (Kr.).
Deleaster dichrous Grav. s. Dz., am Seestrande (Dommer, Helm), die var. *adustus* Küst. ebenda (Kumm.).
Anthophagis caraboides L. abbreviatus Fabr. s. h.
A. testaceus Grav. ebenso.
Geodromicus plagiatus Er. aus der Sammlung Nanke's von Kugel. angeführt, aber nicht weiter gefunden.
Lesteva pubescens Mannh. n. s. Kbg. aus Röhricht (Ltz.).
L. bicolor Fabr. s. von Büschchen am Seestrande geschöpft (Dommer).
Olóphrum picum Gyll. s. unter Moos im Spätherbst bei Heub. (Dommer); Dammhof, Juditten (Stnr.).
O. fuscum Grav. s. besitzt aus Pr. Schiffdr.
O. assimile Payk. n. s. unter Laub, Rauschen (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
O. consimile Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Heub. (Fritzen), Pregeluser (Czw.).

Lathrimaeum melanocephalum Illig. n. s. Osterode, an verwundeten Stellen der Eichen und Buchen, auch unter deren Rinde (Kugel.); Dz. unter feuchtem Laub, besonders in Gräben (Dommer).

L. atrocephalum Gyll. s. Dz. unter Schilf (Dommer), Juditten (Stnr.).

L. fuscum Er. s. Dz. im Moose (Dommer).

Deliphrum tectum Payk. n. h. Osterode am ausquellenden Saft von Buchen und Birken (Kugel.); Kbg. (Ltz.).

Acidota crenata Fabr. s. Osterode, im Herbst an Zäunen und Mauern (Kugel.); Kbg. bei Rosenau (Ltz.).

A. cruentata Mannh. s. s. Putzig (Stf.).

Arpedium quadratum Grav. s. Dz. unter Moos (Dommer), Ggbg. (Kr.).

Homalium rivulare Payk. n. s. Osterode an schattigen Stellen unter faulenden Gewächsen (Kugel.), Ggbg. (Kr.).

H. fossulatum Er. ebenso, Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

H. caesum Grav. ebenso, Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.).

H. oxyacanthae Grav. s. besitzt aus Pr. Schffdr.

H. exiguum Gyll. s. Kbg. (Ltz.).

H. minimum Er. s. wie oxyac.

H. pusillum Grav. h. auf Ebereschenblüthen bei Liep (Ltz.). Dz. (Dommer).

H. monilicorne Gyll. s. Kbg. (Ltz.).

H. planum Payk. h. wie pusillum.

H. conforme Kr. pineti Thoms. s. unter Carpinusrinde, F. F. (Czw., Sauter, Stnr.).

H. concinnum Marsh. s. wie pusillum.

H. deplanatum Gyll. s. Conitz (Sieb.), Dz. (Dommer).

H. testaceum Er. s. Kleinhaide (Stnr.).

H. lucidum Er. h. wie pusillum, auch unter Eichenrinde bei Ludwigsort (Ltz.).

H. brunneum Payk. n. h. Osterode (Kugel.), Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).

H. florale Er. ruficorne Steph. h. an Gartenspiräen, Kbg. (Ltz.).

H. salicis Gyll. s. Kbg. Rosenau (Ltz.).

H. pygmaeum Payk. s. Neuhäuser (Ltz.).

H. striatum Grav. s. Dz. (Dommer), Kbg. (Stnr.).

H. inflatum Gyll. s. wie oxyacanthae.

Pycnoglypta lirida Gyll. einmal h. unter Röhricht am Pregeldamm (Pfeil, Ltz., Stnr.).

Anthobium florale Panz. s. besitzt aus Pr. Schffdr.

A. primulae Steph. triviale Er. h. in Pilzen (Dommer).

A. ophthalmicum Payk. im Radaunethal h. auf Spiraea ulmaria (Dommer).

A. minutum Fabr. g. auf Wiesen.

A. luteipeum Er. s. Blaustein (Ltz.).

A. longipenne Er. s. im Moose (Dommer).

A. sorbi Gyll. n. s. Putzig, Juni—Aug. (Stf.).

Protinus brachypterus Fabr. n. h. im Moose, Cranz (Ltz.).

P. macropterus Gyll. ebenso.

P. atomarius Er. s. in Blätterpilzen, Hirschau (Stnr.), Neuhäuser (Ltz.).

Megarthrus depressus Payk. n. h. aus Moos, Kbg. (Ltz.).

M. nitidulus Kr. s. Kbg. (Sauter), Poln. Kirchhof (Czw.).

M. sinuatocollis Lac. n. s. an Abiesstubben, Blaustein (Ltz.).

M. denticollis Beck. marginicollis Er. s. Dz. in Pilzen (Dommer).

M. hemipterus Ill. s. Osterode unter Eichen- und Buchenrinde (Kugel.), Dz. in Pilzen (Dommer), im Walde von Kleinhaide (Eld.).

Phlococharis subtilissima Mannh. n. s. im Moose und unter Rinde, Kbg. (Eld., Ltz.), F. F. (Stnr.).

Prognatha quadricornis Krb. Osterode, in Schwämmen (Kugel.), aber bisher nicht wieder gefunden.

Micropeplus porcatus Fabr. n. h. Rauschen (Ltz.), Dz. Ktzn. (Czw.).

M. caelatus Er. n. h. auf Pregelwiesen (Pfeil, Czw., Stnr.).

M. fulvus Er. s. in verrottendem Stroh (Czw.).

Pselaphidae.

Batriscus Delaportei Aub. s. in Masuren unter morscher Baumrinde, Eichen, Kiefern, Birken (Mühl.).

B. venustus Rehb. s. aus Moos von Karlschau (Eld.), Masuren (Mühl.).

Trichonyx sulcicollis Rehb. s. unter Kiefernrinde, Osterode (Kugel.), Kbg. unter Mistbeetbrettern (Ltz.).

Tyrus mucronatus Panz. s. Putzig, aus Moos (Stf.), Wehlau (Ltz.).

Pselaphus Heisei Hbst. n. s. aus Moos (Ltz., Czw.).

P. dresdensis Hbst. s. aus Moos von Gr. Karschau (Eld.), Masuren, Juni (Mühl.).

Tychus niger Payk. h. Kbg. (Ltz.).

Bryaxis fossulata Rehb. h. Blaustein (Ltz.).

B. haematica Rehb. n. h. ebenso

B. juncorum Leach. n. h. Zoppot (Czw.), Ggbg. (Kr.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

B. impressa Panz. s. Kbg. (Sauter).

B. sanguinea L. h. im Waldmoose (Ltz.).

Bythinus puncticollis Denny. n. s. aus Moos von Wundlack (Eld.).

B. validus Aub. s. ebenso (Sauter).

B. bulbifer Rehb. ♀ glabricollis Aub. n. s. Kbg. (Ltz.).

B. glabricollis Rehb. s. Kbg. in Erde (Eld.) Seidl. Fn. Balt. p. 229; fehlt im Catalog. von St. u. W.

B. Curtisi Denny. s. Kbg. in Gartenerde (Eld.).

B. Burellii Denny s. Kapkeim (Ltz.), Karschau (Eld.).

Euplectus Erichsonii Aub. s. s. einmal unter einem Steine, Kbg. (Ltz.).

E. signatus Rehb. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.).

E. sanguineus Denny s. im Moose, Dz. (Dommer), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

E. Karstenii Rehb. gracilis Chaud. n. s. Kbg. (Eld.), Dz. (Dommer, Frantz.).

E. nanus Rehb. s. unter Ameisen u. Baumrinde (Stf., Eld.), Ggbg. (Kr.), F. F. (Stnr.).

E. ambiguus Rehb. s. h. im Moose.

Trimium brevicorne Rehb. n. s. im Moose (Dommer), Kbg. (Ltz.).

T. brevipenne Chaud. n. s. aus Moos von Zimmerbude (Eld.), F. F. (Czw.).

Clavigeridae.

Claviger testaceus Preyssler. foveolatus Müll. n. s. unter Ameisen, Kbg. (Sauter).

C. longicornis Müll. s. s. Lyck, auf den Schedlisker Bergen unter einem Steine (Sanio).

Scydmaenidae.

Cepheum thoracicum Müll. n. s. Zimmerbude (Eld.), Margen (Ltz.), Dammhof, F. F. (Stnr.).

Euthia plicata Gyll. s. in einem Stalle in Wernsdorf, Neuhausen (Stnr.).

E. abbreviatella Er. n. h. Kbg. unter Gartenbrettern (Ltz.), Holzwiesen am Pregel, Juni (Czw.), im Moose von Karschau (Eld.).

Seydmaenus Godarti Latr. s. Kbg. (Eld.), Putzig, Mai (Stf.), Rastenburg (Czw.).

S. scutellaris Müll. h. unter Laub; Wundlack (Eld.).

S. collaris Müll. h. ebenso. Kbg. (Ltz.).

S. pusillus Müll. unter Kiefernrinde Osterode (Kugel.), aber bisher nicht wiedergefunden.

S. exilis Er. s. im Moose von Karschau (Eld.).

S. angulatus Müll. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.), Ktzn. (Czw.).

S. elongatus Müll. s. Putzig (Bogeng.). Schrb. (Czw.).

S. pumilio Schaum. s. Kbg. unter Ameisen (Dommer).

S. Motschulskyi St. s. 1 ♂ im Moose aus der F. F. (Stnr.), Jäschkenthal bei Dz. (Czw.).

S. denticornis Müll. s. F. F. (Czw.).

S. rutilipennis Müll. s. Ggbg. (Kr.), am Dammtreit (Stnr.).

S. hirticollis Illig. h. unter Mistbeetbrettern und leichtem Steingerölle (Ltz.).

S. claviger Müll. s. im Moose, Dz. (Dommer), F. F. (Stnr.).

S. Mäklini Mannh. s. Kbg. (Eld.), Putzig (Stf.).

S. Wetterhalli Gyll. s. Putzig, Mai, aus Moos (Stf.).

S. nanus Schaum. s. Kbg. (Eld.).

S. tarsatus Müll. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Frantz.).

S. Hellwigii Fabr. s. unter Kiefernrinde und Ameisen, Kbg. (Eld.).

S. rufus Müll. n. s. im Moose, Dz. (Dommer), unter Mistbeetbrettern Liep (Stnr., Ltz.).

Silphidae.

Leptinus testaceus Müll. s. s. aus Laub, Putzig (Stf. Bogeng.).

Choleva intermedia Kr. s. unter trocknem Laube, im Samlande (Hagen, Ltz.), Putzig (Stf.).

C. angustata Fabr. s. ebenso (Ltz.).

C. cisteloides Fröhl. castanea St. s. s. unter Pilzen im Grebbiner Walde (Dommer), Kbg. Kleinhäide (Eld.).

C. agilis Illig. s. Osterode, Kbg. unter Eichen- und Buchenrinde (Kugel.), Samland (Ltz.).

C. velox Spence. wird von Zebe als preussisch angeführt ist jedoch zweifelhaft.

C. praecox Er. s. Loppehnen unter trocknem Laube (Eld.).

Catops picipes Fabr. s. im Grebbiner Walde in einem faulen Eichenstübben (Dommer), Fuchshöfen (Stnr.).

C. fuscus Panz. h. Ggbg. (Kr.), Loppehnen (Eld.), Ktzn. (Czw.).

C. nigricans Spence. s. Dz. unter verwesenden Pflanzenstoffen (Dommer), die var. *fuliginosus* Er. daselbst (Kumm.).

C. morio Fabr. n. h. Blaustein (Ltz.).

C. nigrita Er. h. unter Pilzen (Dommer, Frantz.).

C. tristis Pz. s. in Pilzen einer Kieferwaldung, Pr. Stargard (Schmidt).

C. Watsoni Spence. *fumatus* Er. g. am Aase.

C. fumatus Spence. *scitulus* Er. s. unter faulem Holze (Dommer, Czw.).

C. sericeus F. n. s. wie Watsoni.

Colon viennense Hbst. s. s. Masuren (Mühl.), F. F. (Czw., Stnr.).

C. bidentatum Sahlb. s. Loppehnen in trocknem Laube (Eld.).

C. serripes Sahlb. n. h. wie viennense.

C. clavigerum Hbst. s. s. Glettkau (Czw.), Neustadt (Fritzen).

C. fuscicornis Kraatz. s. s. Neustadt (Fritzen).

C. dentipes Sahlb. s. Ggbg. (Kr.).

C. appendiculatum Sahlb. s. Masuren (Mühl.); Rastenbg., Glettkau, Oliva (Czw.).

C. armipes Kraatz. s. s. Glettkau (Czw.).

C. denticulatum Kraatz. s. s. ebenso.

C. affine St. s. Neustadt (Fritzen).

C. brunneum Latr. n. s. Neuhausen; Hlgbl. (Stnr.), F. F. Oliva (Czw.).

C. latum Kraatz. s. Ggbg. (Kr.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

Phosphuga laevigata Fabr. s. Kug. Sieb.

P. atrata L. mit var. *brunnea* Hbst. h. Kbg. (Ltz.).

P. opaca L. n. s. am Aase, Loppehnen (Eld.).

P. reticulata Fabr. n. s. Rauschen (Ltz.), Glettkau (Czw.).

Thanatophilus thoracicus L. h. in Wäldern am Aase.

T. rugosus L. h. ebenso.

T. sinuatus Fabr. n. h. ebenso

T. dispar Hbst. s. Pregelwiesen (Czw.).

Xylodrepa quadripunctata L. n. s. sucht auf Bäumen (Eichen) nach Insekten, Osterode (Kugel.), Galtgarben (Ltz.), F. F. (Czw.), Hlgbl. (Stnr.).

Silpha tristis Illig. n. h. Leesen und Gr. Zündler (Dommer), Tilsit, Pillau (Eld.), Schwarzort (Ltz.).

S. obscura L. h. Kbg. (Ltz.).

S. carinata Illig. n. s. Schwarzort (Ltz.).

S. littoralis L. ebenso, an todten grösseren Säugetieren.

Necrophorus Germanicus L. n. h. am Aase, Rauschen (Ltz.).

N. humator Goeze. n. s. ebenso.

N. vespillo h. ebenso.

N. vestigator n. h. ebenso

N. ruspator Er. *microcephalus* Thoms h. Fischhausen (Ltz.), Dz. (Czw.).

N. interruptus Steph. *fossor* Er. n. h. Loppehnen (Eld.).

N. sepultor Charp. s. Dz. (Dommer), Kalkstein bei Fischhausen (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

N. mortuorum Fabr. n. h. in Pilzen, Neuhäuser (Ltz.), Dz. Kbg. (Czw.).

Agyrtes castaneus Pk. s. s. Dz.. Kleinhäide (Stf.).

Sphaerites glabratus Fabr. s. Fchst. am Birken-safte (Sauter), Schrb. Oliva (Czw.), Vierbrüderkrug (Stnr.).

Triarthron Märkelii Schm. s. s. Putzig im Stadtwalde (Stf.), Hochwasser bei Oliva Juli 78 1 Ex. (Czw.).

Anisotoma cinnamomea Pz. s. Sieb. Die Arten an unterirdischen Pilzen (Tuber), Neustadt (Fritzen).

A. oblonga Er. s. s. Osterode (Kugel.), Er. K. D. III p. 53 Anm.

A. triepkii Schm. s. Lyck (Sánio), Dz. (Czw., Helm.).

A. picea Illig. s. Rauschen (Ltz.).

A. obesa Schm. s. Dz. (Kumm.).

A. brunnea St. s. Dz. (Helm.), Neustadt (Fritzen).

A. dubia Kugel. n. s. Osterode, an trocknen Weidenschwämmen, Ggbg. (Kr.).

A. silesiaca Kr. s. s. ein St. in der Sammlung der pr. Käfer des Museums. Dz.

A. ciliaris Schm. s. s. Kbg. (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

A. ovalis Schm. s. Dz. (Frantz.).

A. rubiginosa Schm. s. s. Dz. Sieb.

A. calcarata Er. n. s. bei Fuchshöfen von Gräsern geschöpft, Juni 69 (Ltz.), Danziger Glacis, Oliva (Czw.).

A. badia St. s. Schwarzort (Ltz.), Dammhof (Stnr.).

A. parvula Sahlb. n. s. in Laubwäldern des Abends von Gräsern geschöpft, Kadienen (Stf.), Masuren (Mühl.), F. F., Fuchshöfen (Sauter, Ltz., Czw.).

Cyrtusa subtestacea Gyll. s. an Baum schwämmen, Putzig (Stf.), Loppehnen (Eld.), Dammkrug (Stnr.).

C. minuta Ahr. s. Dz. (Kumm).

C. pauxilla Schm. s. s. F. F. Juni 67 (Czw.).

Colenis dentipes Gyll. n. s. im Moose, Creuzburg (Eld.), Kadienen (Stf.), F. F., Oliva (Czw.)

Liodes humeralis Kug. n. h. in Schwämmen an alten Eichenstubben, zuweilen unter Kiefern rinde, Osterode, Warnicken (Ltz.).

L. glaber Kug. n. h. ebenso.

L. axillaris Gyll. s. ebenso.

L. serricornis Gyll. s. s. in rothfaulen Eichenstubben, Föddersdorf Mai 68 (Mühl.).

L. castaneus Hbst. s. Masuren (Mühl.).

L. orbicularis Hbst. s. aus Moos von Wund lack (Eld.), Putzig, Dz. (Stf.), Kbg. (Czw.), Hirschau (Stnr.).

Amphicyllis globus Fabr. s. unter Kiefern rinde, Putzig Mai — Juni (Stf.), Vierbrüderkrug (Sauter, Stnr.).

A. globiformis Sahlb. bei Ggbg. n. s. (Kr.), F. F. (Czw.).

Agathidium nigripenne Kug. s. Osterode, in Eichenschwämmen; Memel (Nanke), Dz. (Dommer), Wehlau (Sauter), F. F. (Stnr.).

A. atrum Pk. s. Ggbg. (Kr.), F. F. Vier brüderkr. (Stnr.).

A. seminulum L. h. unter Eichen- und Kiefernrinde, Kbg. (Ltz.).

A. laevigatum Er. s. Wilkie (Eld.); Putzig, im Frühjahr an Schwämmen (Stf.).

A. badium Er. s. F. F., Vierbrkr. (Stnr.).

A. mandibulare St. s. Kbg. (Ltz.).

A. rotundatum Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Vier brüderkrug (Stnr.).

A. nigrinum St. s. F. F. (Stnr.).

A. piceum Er. s. 1 St. in der Sammlung von Eld.

A. marginatum St. wie laevigatum.

A. haemorrhoum Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.).

Clambidae.

Cybocephalus exiguis Sahlb. s. an Pappel stämmen, Ggbg. (Kr.), Wernsdorf (Kuwert).

Clambus minutus St. s. an faulenden Vegetabilien, Kbg. Aweiden (Stnr.).

C. Armadillo Deg. punctulum Beck. n. s. in Schwämmen, Putzig (Stf.), Dz. (Dommer).

C. pubescens Redt. n. h. Kbg. (Sauter, Ltz., Stnr.).

C. punctulum Gyll. s. Rastenburg (Czw.), Schromb. (Stnr.).

Sphaeriidae.

Sphaerius acaroides Waltl. s. Dz. (Kumm), Ktzn., Rastenburg am Ufer der Guber unter Kies (Czw.).

Trichopterygidae.

Ptenidium formicetorum Kr. apicale Er. h. unter Ameisen und im Moose, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).

P. laevigatum Gillm. n. s. Kbg. (Ltz.).

P. pusillum Gyll. ebenso.

Ptilium elongatum Thoms. n. s. Kbg. Liep (Czw.), Plantage unter Mistbeetbrettern (Stnr.).

P. transversale Er. s. s. Heub. (Czw.).

P. minutissimum Ljung. n. s. unter Spreu, Ktzn. (Czw.).

P. inquilinum Gillm. s. h. unter Ameisen, Kbg. (Sauter, Eld.).

P. canaliculatum Gillm. n. s. ebenso.

P. angustatum Er. s. Dz. (Zebe), Kbg. Aweiden (Stnr.).

P. fuscum Gillm. s. Loppehnen (Eld.).

P. Kunzei Heer. n. s. Kbg. (Sauter, Czw., Stnr.).

Trichopteryx pumila Er. s. Kbg. aus Gerüsse vom ehemaligen Philosophendamm (Sauter).

T. brevipennis Er. s. ebenso (Stnr.).

T. sericans Heer. h. Kbg. (Ltz.), Putzig (Bogeng.).

- T. fascicularis* Hbst. h. unter feuchtem Laube (Dommer).
T. grandicollis Mannh. h. Kbg. (Czw.), F. F. (Stnr.).
T. atomaria Dej. s. h. überall.
T. thoracica Waltl. n. s. Putzig, Mai — Juli (Stf.), Dammhof (Stnr.).
Pteryx suturalis Heer. s. unter Ameisen, Kbg. (Eld.).

Scaphidiidae.

- Scaphidium 4-maculatum* Ol. n. h. an Baumschwämmen, Zinten (Ltz.).
Scaphisoma agaricinum L. s. h. unter Rinde an Pilzen, überall.
S. boleti Pz. s. Kbg. aus Gerüllle (Sauter).
S. assimile Er. s. Kbg. Holzwiesen, Neuhausen (Stnr.).

Histeridae.

Hololepta plana Füssly. s. s. bei der Allensteinschen Glashütte in dem vermoderten Baste alter gefällter Pappeln und Birken, einige St. Mai 1793 (Kugel.); Dammhof (Dossow).

Platysoma frontale Pk. s. unter Buchenrinde (Kugel.), Zinten (Ltz.), Pr. Stargardt (Schmidt).

P. depressum Fabr. n. s. unter Abiesrinde, Zinten (Ltz.)

P. oblongum Fabr. s. Grebbiner Wald, in Eichenstubben (Dommer), Masuren (Mühl.), Schromb. (Stnr.).

P. lineare Er. s. Osterode (Kugel.), Zinten (Ltz.), Frauenburg (Czw.), Metgethen (Stnr.), an Pinusstubben Neustadt (Fritzen).

P. angustum Hoffm. s. (Sieb.)

P. filiforme Er. s. s. Kbg., unter Abiesrinde (Pfeil.).

Hister 4-maculatus L. n. h. Putzig (Stf.)

H. unicolor L. h. Kbg. (Ltz.).

H. cadaverinus Hoffm., *striola* Sahlb. ebenso, Schromb. (Stnr.).

H. succicola Thoms. n. h. am ausfliessenden Eichensaft. Schrb. (Czw.).

H. terricola Germ. s. Kbg. (Ltz.).

H. merdarius Hoffm. n. s. ebenso.

H. simetarius Hbst. *sinuatus* Fabr. n. s. Loppehnen (Eld.).

- H. neglectus* Germ. n. h. Kbg. (Ltz.).
H. carbonarius Illig. h. ebenso.
H. ventralis Marsh. n. s. Lyck (Sanio), Dz. (Helm).
H. purpurascens Hbst. n. s. auf sandigen Wegen im Mist, Kbg. (Ltz.).
H. marginatus Er. s. in Wäldern unter faulenden Vegetabilien, unter Rinde von Baumstübben, Dz., Putzig (Stf.), Pillau, Loppehnen (Eld.).

- H. stercoarius* Hoffm. h. Kbg. (Ltz.).
H. sinuatus Illig. *uncinatus* Illig. s. Dz. (Dommer), Cranz (Eld.).
H. 4-notatus Scrib. bei Lyck h (Sanio).
H. bissexstriatus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.)
H. arenicola Thoms. s. Kbg. 2. St. (Stnr.).
H. bimaculatus L. s. Kapkeim (Ltz.), Glettka (Czw.).

- H. 12-striatus* Schrk. n. s. Tilsit, Kbg., Elbing, Putzig (Stf.), die var. *14-striatus* Gyll. seltener, Loppehnen (Eld.), Tilsit (Stf.).

- H. corvinus* Germ. n. h. Loppehnen (Eld.), Putzig, Mai (Stf.), Neuhäuser (Stnr.).

- Carcinops pumilio* Er. n. s. Seestrand, in Sandgruben (Eld., Ltz.); Putzig (Stf.), Ktzn. (Czw.).

- Paromalus complanatus* Pz. s. unter Eichen- und Buchenrinde, Osterode (Kug.), Ortelsburg unter Espenrinde (Mühl.).

- P. parallelepipedus* Hbst. unter Kiefernrinde (Eld., Ltz.).

- P. flavigornis* Hbst. n. h. ebens.

- Hetaerius sesquicornis* Preyssl. n. h. unter Ameisen, Kbg. (Eld.), unter Birkenrinde (Kugel.), Pilzenkrug (Stnr.).

- H. Sartorii* Redt. s. s. Ggbg. (Kr.). Berl. E. Z. VII. 233.

- Dendrophilus punctatus* Hbst. n. h. im Kaninchendünger, Dz. (Dommer), Kbg., Pillau (Eld.); bei Ameisen, Putzig (Stf.), Ktzn. (Czw.).

- D. pygmaeus* L. s. Dz. (Dommer), F. F. bei Ameisen (Stnr.).

- Saprinus nitidulus* Pk. s. h. an sandigen Ufern im Miste (Kugel.), Kbg. (Ltz.).

- S. immundus* Gyll. s. Conitz (Sieb.), Rauschen (Ltz.).

- S. rugifer* Pk. s. am Seestrande, Putzig (Stf.).

- S. speculifer* Latr. s. Loppehnen, Pillau (Eld.).

S. aeneus Fabr. h. an Exrementen am See-strande (Ltz.).

S. virescens Pk. s. Ggbg. (Kr.), Westpr. (Strübing B. E. Z. IV. 322), Neuhäuser (Stnr.), Dz. (Helm).

S. conjungens Pk. s. ebenso

S. rufipes Pk. s. Schwarzort (Ltz.), Lop-pehnen (Eld.), Insterburg (Bachmann), Dz. (Helm).

S. antiquulus Illig. wird zwar von Sieb. angegeben, doch ist die Bestimmung wahrsch. unrichtig gewesen. Kraatz B. E. Z. XII. 336.

S. 4-striatus Hoffm. n. s. auf der kurischen Nehrung, Rossitten (Nanke), Schwarzort (Ltz.), Glettkau (Czw.).

S. rugifrons Pk. g. wie aeneus.

S. metallicus Hbst. h. in sandigen Gegen-den beim Aase u. im Miste (Kugel.), Schwarz-ort (Ltz.), Dz. (Helm).

Gnathoncus rotundatus Kugel. n. s. Nord-strand (Eld., Ltz., Stnr.).

G. punctulatus Thoms. n. h. Dz. (Czw., Helm); aus Reihernestern bei Schwarzort, Pfing-sten 78 (Czw.).

Myrmetes piceus Pk. s. im faulenden Holze (Dommer), Putzig (Stf.), Kbg. (Stnr.).

Teretrius picipes Fabr. s. unter Buchen- u. Eichenrinde (Kugel.), Cadienen (Stf.), in Bohr-löchern alter Weiden auf der Pregeleitstrift bei Fehstein, Juni (Pfeil, Ltz.), Kbg. neue Reiserbahn (Czw.).

Plegaderus saucius Er. s. s. unter Baumrinde, Dammhof (Ltz.).

P. vulneratus Pz. n. s. unter Eichen- und Pappelrinde (Kug.), Juditten (Eld.), Dammhof (Ltz.).

P. caesus Illig. s. unter Pappelrinde (Kug.), Kbg. (Ltz.).

P. dissectus Er. s. s. einmal an der Wurzel einer alten Eiche bei Schwarzort, Juli (Ltz.).

P. discisus Er. s. s. in faulendem Kasta-nienholze (Dommer).

Onthophilus sulcatus Fabr. s. Osterode (Kug.), Putzig (Stf.).

O. striatus Forst. s. ebenso.

Abraeus globulus Creutz. n. s. unter Mist-beetbrettern, Kbg. (Ltz.).

A. globosus Hoffm. s. Kbg. im botan. Garten unter Blumentöpfen (Eld.), Putzig unter Ameisen (Stf.).

Acritus sulcipennis Fuss. s. s. einmal zwei Stück unter einem Mistbeetbrette, Liep bei Kbg. (Ltz.), ist nicht = punctum Aub. Reitt. Dt. Ent. Zt. XXII. p. 50.

A. minutus Hbst. g. unter faulenden Vege-tabilien.

Phalacridae.

Phalacrus corruscus Pk. h. auf Blumen u. Sträuchern, Kbg. (Ltz.).

P. grossus Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.).

P. substriatus Gyll. s. Loppehnen (Eld.).

P. caricis St. s. Neuhäuser (Stnr.), Putzig (Stf.).

Olibrus corticalis Pz. n. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Fritzen, Czw.).

O. aeneus Fabr. h. überall.

O. bicolor Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

O. liquidus Er. s. Neustadt (Fritzen).

O. affinis St. s. Dammhof (Stnr.).

O. millefolii Pk. h. auf Syngenesisten, überall.

O. pygmaeus St. s. Neuhäuser (Ltz.), auf Epilob. angustif. Neustadt (Fritzen).

O. testaceus Pz. geminus Illig. h. Kbg. (Ltz.).

O. atomarius L. *piceus* Steph. n. h. ebenso, F. F. (Czw.), Neustadt (Fritzen).

Nitidulariae.

Cercus pedicularius L. g. auf Thymus, Rauschen (Ltz.).

Brachypterus pubescens Er. n. h. Kbg. (Ltz.).

B. urticae Fabr. g. auf blühender Urtica dioica.

B. gravidus Illig. n. h. wie pubescens.

B. cinereus Heer. Schwarzort, ausschliess-lich in den Blüthen der Linaria Loeselii zahlreich (Czw.).

Carpophilus hemipterus L. s. s. Putzig (Stf.)

Epuraea limbata Fabr. n. s. unter Rinde von Apfel- und Birnbäumen (Kugel.), Putzig, in Löcherpilzen (Stf.).

E. 10-guttata Fabr. s. am Safte v. Eichen und Buchen (Kugel), Blaustein (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).

- E. silacea* Hbst. s. (Sieb.).
E. aestiva L. mit var. *bisignata* St. s. h.
 auf Blüthen.
E. melina Er. ebenso.
E. deleta Er. s. am Seestrande (Eld.).
E. immunda Er. s. ebenso (Eld., Ltz.).
E. neglecta Heer. n. s. am Birkensafta, Apr.
 Mai (Dommer, Ltz.).
E. variegata Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
E. obsoleta Fabr. h. ebenso.
E. boreella Zett. s. s. aus einer Ostpr.
 Forst (Dossow).
E. pygmaea Gyll. h. Zinten (Ltz.).
E. pusilla Illig. s. Osterode, unter Weiden-
 rinde (Kugel.), Ludwigsort (Ltz.), Dz. (Helm).
E. florea Er. h. Osterode an Birnbäumen
 (Kugel.), Kbg. (Ltz.).
Nitidula bipustulata L. s. an thierischen
 Stoffen, Kbg. (Ltz., Stnr.).
N. obscura Fabr. n. h. im Grebbiner Walde,
 einmal an einem todten Igel zahlreich (Dommer),
 Kbg. aus Moos (Eld.).
N. 4-pustulata Fabr. s. Gr. Zündler, in
 todten Maulwürfen (Dommer), Rauschen (Ltz.).
Omosita depressa L. s. am Eichensaft (Dom-
 mer), aus Moos von Rosenberg (Eld.), an einem
 todten Reiher in Schwarzort (Czw.).
O. colon L. g. überall.
O. discoidea Fabr. s. Osterode unter Eichen-
 rinde (Kugel.), Elbing (Ltz.).
Soronia punctatissima Illig. n. s. am Saft
 von Eichen, Birken, Espen (Kugel., Dommer);
 Liep, Georgenswalde (Ltz.), Dz. (Helm), Fchst.
 (Stnr.).
S. grisea L. g. an Weiden u. am Eichen-
 safte.
Amphotis marginata Fabr. s. Masuren (Mühl),
 Oliva (Czw.).
Ipidia 4-notata Fabr. s. Masuren, unter
 morscher Birkenrinde, Septbr. (Mühl)
Pria dulcamarae Scop. s. Dz., im Frühjahr
 am Seestrande (Dommer), Rosenberg (Eld.),
 Rauschen (Ltz.), Osterode s. h. auf *Lycium*
 europ. (Kugel.).
Meligethes rufipes Gyll. s. Sieb.
M. hebes Er. s. Dz. (Frantz.).
M. pumilus Er. s. Kbg. (Czw.).
M. coracinus St. n. s. ebenso, Dz. (Dommer).
M. coeruleovirens Forst. n. s. Kbg. auf
 Weiden (Czw.).
- M. aeneus* Fabr. g. überall.
M. viridescens Fabr. h. Kbg. (Ltz.), var.
azureus s. Kbg. (Czw.).
M. symphyti Heer. h. ebenso.
M. subrugosus Gyll. s. Dz. Aug. (Czw.).
M. serripes Gyll. s. ebenso.
M. umbrosus St. s. Georgenswalde (Czw.).
M. maurus St. s. Dz., Hlgbl. (Czw.).
M. incanus St. s. Kbg. (Czw.).
M. picipes St. h. ebenso.
M. memnonius Er. n. s. ebenso.
M. ochropus St. n. s. auf *Lamium album*,
 Dz. (Czw.).
M. difficilis Heer. mit var. *Kunzei* Er.
 n. s. ebenso.
M. morosus Er. h. wie *ochropus*, Dirschau
 (Czw.).
M. viduatus St. h. Dz. (Czw.).
M. pedicularius Gyll. n. s. ebenso.
M. assimilis St. s. ebenso.
M. aestimabilis Reitt. s. Ggbg. (Kr.) B. E.
- Z. XVI. 133. 11.
- M. tristis* St. h. auf *Echium vulgare*, Lyck
 (Sanio), Kbg. (Czw.).
M. gagatinus Er. h. Kbg. (Ltz.).
M. exilis St. s. Dz. (Czw.).
M. erythropus Gyll. s. Ggbg. (Kr.).
M. solidus St. Osterode (Kug.), aber nicht
 wieder gefunden.
Thalyra sericea St. n. h. auf *Spiraea ulm.*
 Craam (Ltz.), Oliva (Czw.).
Pocadius ferrugineus Fabr. n. s. in Staub-
 pilzen, Rauschen (Ltz.), Dz. (Czw.), Hlgbl.
 (Stnr.).
Cychramus 4-punctatus Hbst. n. h. von
 Abies geklopft, Löwenhagen (Ltz.).
C. fungicola Heer. h. in Pilzen, Dz., Putzig
 (Stf.), Kleinhaide (Eld.).
C. lu'teus Fabr. s. h. auf *Spiraea ulm.*
Strongylus (Cylloides) ater s. s. in morschem
 Kieferholz, Masuren (Mühl), Wilkie an einem
 Birkenstubben (Pfeil).
Cryptaracha strigata Fabr. n. s. am Eichen-
 safte, Dz. (Dommer, Helm), Georgenswalde (Ltz.).
 Mehlsack (Eld.).
C. imperialis Fabr. n. s. ebenso, Neu-
 hausen (Stnr.).
Ips 4-guttatus Fabr. s. unter Eichenrinde
 (Kugel.), Kbg. Holzstellen (Stnr.), Dammhof
 (Kuwert).

I. 4-punctatus Oliv. n. s. im Frühjahr auf Stubben, Kbg. (Ltz.).

I. 4-pustulatus L. n. s. ebenso.

I. ferrugineus Fabr. n. s. an Eichen, Kbg. (Ltz.), Vierbrüderkr. (Stnr.).

Rhizophagus grandis Gyll. s. s. Putzig (Stf.).

R. depressus Fabr. s. h. unter Rinde von Abiesstubben.

R. cibratus Gyll. s. Dammhof unter Abies-Rinde 2 St. (Ltz.).

R. ferrugineus Pk. n. s. Wilkie (Eld.), Vierbrüderkr. (Stnr.).

R. parallelocollis Gyll. einmal h. an einem schönen Sommerabend auf dem Altrossg. Kirchhof umherfliegend, Kbg. (Ltz.).

R. nitidulus Fabr. n. s. Marge an Birkenstubben (Ltz.).

R. dispar Pk. n. s. Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).

R. bipustulatus Fabr. s. h. unter Eichen-, Abiesrinde, Kbg. (Ltz.).

R. politus Hellw. s. unter Abiesrinde, Osterode (Kugel.), Mehlsack (Eld.).

R. coeruleipennis Sahlb. s. Kbg. bei Moosbude 2 St. (Ltz.), Pregelwiesen (Czw., Stnr.).

R. parvulus Pk. s. unter Pappelrinde Kbg. (Ltz.), Albrechtsthal bei Wehlau (Sauter).

Trogositidae.

Nemosoma elongatum L. n. h. unter Kiefern-, Buchen-, Weidenrinde, Dahlheim (Wohlfrohm), Perkkappen (Ltz.), Putzig (Stf.), Kbg. (Eld.).

Temnochila coerulea Oliv. von 3 pr. St. berichtet Kugel., wovon 1 bei Kbg., aber nicht wieder gefunden.

Trogosita mauritanica L. caraboides Fabr. s. s. durch den Handel eingeführt bei Apothekern (Naumann), aber auch unter Weidenrinde (Sieb.).

Peltis dentata Fabr. s. s. unter Rinde von Kiefernstubben, Cadienen (Stf.).

P. grossa L. s. unter Eichenrinde, Elbing (Sieb.), Zinten (Ltz.).

P. ferruginea L. s. in Falten der Baum schwämme, in altem Holze (Kugel.), Dz. (Czw.)

P. oblonga L. n. s. an Weidenschwämmen, Kbg. (Ltz.).

Thymalus limbatus Fabr. s. s. Osterode unter Kiefernrinde (Kug.), Masuren unter Eichenrinde 3 St. (Mühl.).

Colydiidae.

Sarrotrium clavicornne L. h. bei Loppehnen in Sandgruben (Eld.), Rauschen, Neuhäuser (Stnr.).

Ditoma crenata Hbst. h. unter Birkenrinde, Löwenhagen (Ltz.).

Synchita juglandis Fabr. obscura Redt. s. unter Rinde von Birnbäumen (Kug.), Birken, Erlen und Linden (Ltz., Czw., Fritzen).

Cicones variegatus Hellw. s. s. Stadtwald zu Neustadt, aus einer abgestorbenen Buche (Fritzen).

Colydium elongatum Fabr. Osterode, in altem Eichenholz (Kug.), aber seitdem nicht wieder gefunden.

C. filiforme Fabr. s. Putzig, unter Eichenrinde (Stf.); einige alte Eichen bei Liep und Moosbude haben mir zahlreiche Stücke geliefert, wo sie in Bohrlöchern wohnen, Juni (Ltz.).

Aglenus brunneus Gyll. s. an Mistbeeten bei Dz. und Putzig (Stf.), Kbg., Liep (Czw.).

Bothrideres contractus Fabr. s. Kug., Sieb.

Cerylon histeroides Fabr. h. unter Buchen-, Kiefern- und Eichenrinde, Kbg. (Ltz.).

C. angustum Er. s. Blaustein aus Buchenstubben (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

C. impressum Er. s. Hlgbl., unter Rinde von Kiefern (Czw.), von Buchen, Neustadt (Fritzen).

C. deplanatum Gyll. s. unter Pappelrinde, Kbg. (Sauter), unter Carpinusrinde, Fehst. (Ltz.).

Cucujidae.

Prostomis mandibularis Fabr. von Senator Schneider als preussischen Käfer erhalten unter dem Namen *Cucujus maxillosus* (Kug.), später nicht wieder gefunden.

Cucujus haematodes Er. s. s. unter Kiefern- und Eichenrinde (Kug.), Putzig (Stf.).

Dendrophagus crenatus Pk. s. unter Eichenrinde in Masuren (Mühl.), unter Birkenrinde in einem Holzgarten in Kbg. (Ltz.), Domszin bei Labiau (Wahnschaffe).

Brontes planatus L. *flavipes* Fabr. unter versch. Rinden (Kug.), Memel (Nanke), Kbg. auf den Holzwiesen (Ltz., Stnr.).

Lacmophloeus denticulatus Preyssl. *monilis* Fabr. s. unter Lindenrinde, Putzig (Stf.), Domnau (Sauter), Liep (Ltz.), Fehstein. (Stnr.).

L. muticus Fabr. unter Birnbaumrinde (Kug.), nachher nicht wieder gefunden.

L. bimaculatus Pk. s. unter Birkenrinde, Putzig (Stf.).

L. testaceus Fabr. s. unter Baumrinde, Kadinen (Stf.).

L. duplicatus Waltl. s. unter Abiesrinde, Loppehnen (Eld.), Dz. (Kumm.).

L. ferrugineus Steph. s. s. Kbg. an Birkenholz auf der Altstädtischen Holzwiese, 1 Stück (Ltz.).

L. ater Oliv. s. s. am Harzausfluss einer Abies in Masuren, Juli 63 (Mühl), und zwar die rothe Var., Dz. in Speichern an altem Brode (Fritzen), Ggbg. (Kr.).

L. corticinus Er. s. s. unter Baumrinde Putzig (Stf.).

Pediacus dermestoides Fabr. s. s. nur einmal bei Osterode unter Eichenrinde (Kugel.), ein preuss. St. besitzt Schiefferdecker.

Psammoechus bipunctatus Fabr. bei Osterode s. h. in einer feuchten Gegend unter abgemähtem Schilf (Kugel.), Ktzn. (Czw.), Neuhäusen (Stnr.).

Nausibius dentatus Marsh. s. s. einmal unter Buchenrinde bei Putzig (Stf.), einmal Dz. (Helm).

Silvanus frumentarius Fabr. *sex dentatus* Fabr. s. Kbg. in einem Garten (Eld.).

S. bidentatus Fabr. n. h. aus Moos von Wündlack (Eld.), Wilkie, Blaustein (Ltz.).

S. unidentatus Fabr. n. s. unter Buchen- und Eichenrinde (Kug.), Fehstein (Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

S. similis Er. s. s. Holstein an der Pregel-mündung 1 St. (Czw.).

Airaphilus elongatus Gyll. bei Dz. auf dem Dünengrashe h. (Erichs. K. D. III. 340. 7).

Monotoma conicicollis Aub. *angusticollis* Thoms. h in Ameisenhaufen, Kbg. (Eld.).

M. angusticollis Gyll. *formicetorum* Thoms. s. Cranz (Ltz.).

M. spinicollis Aub. n. s. an Scheunen-wänden, Liep (Ltz.).

M. 4-foveolata Motsch. s. s. Dz. (Helm).

M. brevicollis Aub. s. in trocknem Miste, Putzig (Stf.).

M. picipes Hbst. n. s. Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen), Cranz (Ltz.).

M. longicollis Gyll. s. Neustadt (Fritzen), Putzig (Stf.).

Hypocoprus lathridioides Motsch. s. in den Dünen von Glettkau, bei Oliva in trocknem Ziegenmiste (Czw.).

Cryptophagidae.

Telmatophilus caricis Oliv. n. s. Dzer. Neh-rung, Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).

T. brevicollis Aub. n. s. auf Typha, Blau-stein (Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).

T. typhae Fall. s. von Blumen und Schilf geschöpft (Dommer), am Pregel (Czw., Stnr.).

T. pumilus Reitt. s. von einer Pregelwiese 1 St. (Czw.).

T. Schönherri Gyll. s. bei Glettkau 1 St. (Czw.).

Antherophagus nigricornis Fabr. s. (Sieb.).

A. silaceus Hbst. n. h. Galtgarben (Eld.), Putzig auf Umbellaten (Stf.), Warnicken (Ltz.).

A. pallens Oliv. n. h. Löwenhagen (Ltz.).

Emphyllus glaber Gyll. s. von Blumen ge-schöpft (Dommer), unter Ameisen Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).

Henoticus (Paramecosoma) serratus Gyll. s. Dz. (Sieb.).

Cryptophagus crenatus Gyll. *crenulatus* Er. s. Kbg. aus Moos (Eld.), Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).

C. Lycoperdi Hbst. n. s. in Staubpilzen (Kug.), Rauschen (Ltz.).

C. pilosus Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).

C. setulosus St. s ebenso (Ltz., Czw.), in Blätterpilzen an Buchen, Neustadt (Fritzen).

C. Schmidtii St. s. ebenso.

C. affinis St. n. s. Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).

C. cellaris Scop. n. h. im Moose aus der Caporn. Haide (Eld.), Putzig (Stf.).

C. acutangulus Gyll. ebenso, Ktzn. in Spreu (Czw.).

C. fumatus Marsh. s. Putzig (Stf.).

C. quercinus Kraatz h. Kbg. (Ltz.).

C. badius St. s. Kbg. (Sauter), Putzig (Stf.).

C. labilis Er. s. Kbg. (Ltz.); unter Spreu, Ktzn. (Czw.).
C. bicolor St. n. s. unter Ameisen (Eld.), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.).
C. saginatus St. s. Dz. (Frantz.).
C. dentatus Hbst. n. s. wie affinis.
C. scanicus L. mit var. *cellaris* St. h. in Häusern, auch unter Baumrinde (Kug.), Kbg. (Ltz.).
C. dorsalis Sahlb. s. wie affinis, Schwarzort (Czw.).
C. subdepressus Gyll. s. Kbg. (Ltz., Czw.), Neustadt (Fritzen).
C. lapponicus Gyll. pubescens St. s. s. Glettkau (Czw.).
C. bimaculatus Pz. s. Dz. (Dommer), Oliva (Czw.), Kbg. (Ltz.).
C. vini Pz. s. Kbg. von einer Abies geklopft (Ltz.)
Paramecosoma abjetis Pk. h. von Abies geklopft (Ltz.), Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.).
P. pilosulum Er. n. s. Ggbg. (Kr.), nach Thoms. = *Cryptophagus vini* Pz.
P. melanocephalum Hbst. n. h. aus Moos (Sauter), Putzig (Stf.), Pregelwiesen (Czw.).
Atomaria simetarii Hbst. s. s. Dz. (Czw.).
A. umbrina Gyll. fumata Er. z. h. an Baumschwämmen bei Schrb. (Czw., Stnr.).
A. linearis Steph. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. elongatula Er. s. Ggbg. (Kr.), Pregelwiesen (Czw.).
A. nana Er. h. aus Moos von Zimmerbude (Eld.), Putzig (Stf.).
A. impressa Er. s. Kbg. (Czw.), Neustadt (Fritzen).
A. munda Er. n. s. wie nana.
A. nigripennis Pk. s. Dz. (Kumm.).
A. cognata Er. s. aus Moos, Kbg. (Sauter).
A. gravidula Fr. s. ebenso (Eld.).
A. fuscata Schh. h. ebenso, Putzig (Stf.).
A. pusilla Pk. n. s. ebenso.
A. atricapilla Steph. nigriceps Er. s. Dz. (Czw., Fritzen).
A. atra Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. basalis Er. n. h. Putzig (Stf.).
A. mesomeles Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
A. gutta Steph. h. Kbg. Holzwiesen (Stnr., Ltz.).
A. fuscipes Gyll. n. h. wie basalis, Kbg. (Stnr.).

A. turgida Er. s. wie nana.
A. versicolor Er. s. wie basalis.
A. analis Er. n. s. ebenso.
A. apicalis Er. n. h. wie nana.
A. ruficornis Marsh. terminata Com. h. ebenso.
A. gibbula Er. s. ebenso.
Ephistemus globosus Waltl. s. Dz. (Czw.), F. F. (Stnr.).
E. globulus Pk. ovulum Er. dimidiatus St. h. im Moose von Zimmerbude (Eld.), unter faulenden Vegetabilien Putzig (Stf.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.).
E. exiguum Er. seltener, ebenso.

Lathridiidae.

Myrmecoxenus subterraneus Chevr. h. unter den kleinen gelben Ameisen (Dommer, Stf., Eld.); F. F., Dammhof (Stnr.).
M. vaporariorum Gnér. einmal h. bei Ggbg. in einem auf Ameisen liegenden Unkrauthaufen (Kr.).
Lathridius lardarius Deg. s. h. im Moose.
L. angulatus Mannh. s. Masuren (Mühl.).
L. angusticollis Humm. n. s. Dz. (Frantz.), Blaustein (Ltz.), Kbg. (Czw.).
L. alternans Mannh. s. Loppehnen (Eld.), Neuhäuser im Eichenschwamm 2 St. (Ltz.).
L. rugicollis Oliv. Ludwigsort (Ltz.).
L. carinatus Gyll. s. s. Dz. 1 St. (Helm.).
L. constrictus Humm. s. s. (Sieb.).
L. hirtus Gyll. n. s. Kbg. an Weidenstämmen (Ltz.).
L. minutus L. g. überall.
L. anthracinus Mannh. s. ist eigene Art (Seidl. Fn. Balt. p. 167). Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen).
L. rugosus Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).
L. transversus Oliv. n. s. an Scheunenwänden (Dommer, Ltz.).
L. elongatus Curt. s. Putzig (Stf.).
L. liliputanus Villa. n. s. wie *E. transversus*, Liep (Ltz.).
L. collaris Mannh. s. Loppehnen (Eld.).
L. filiformis Gyll. n. h. Putzig (Stf.).
Corticaria pubescens Gyll. piligera Mannh. n. s. im Moose, Kbg. (Ltz.).
C. cylindrica Mannh. s. Neustadt (Fritzen).

- C. crenulata* Gyll. h. Kbg. (Ltz.).
C. fulva Com. s. wie cylindrica.
C. denticulata Gyll. n. h. ebenso.
C. longicornis Hbst. s. Dz. (Frantz., Fritzen).
C. formicetorum Mannh. n. s. Kbg. (Ltz.), Putzig (Stf.); unter Ameisen, Vierbrkr. (Stnr.).
C. serrata Pk. h. Kbg. (Ltz.).
C. linearis Pk. s. Sieb.
C. foveola Beck. n. h. Dz. an Gebäuden (Dommer).
C. elongata Humm. n. h. Loppehnen (Eld.).
C. gibbosa Hbst. g. überall.
C. transversalis Gyll. h. Dz. (Frantz.), Ggbg. (Kr.).
C. distinguenda Com. s. Kbg. aus Baummoos (Sauter).
C. similata Gyll. *parvula* Mannh. s. Neustadt (Fritzen).
C. fuscula Humm. *trifoveolata* Redt. n. s. wie *distinguenda*, Kbg. (Ltz.).
C. truncatella Mannh. s. ebenso.

Mycetophagidae.

- Mycetophagus 4-pustulatus* s. h. in Weiden-schwämmen.
M. piceus Fabr. *variabilis* Hellw. n. s. F. F. (Stnr.), Kbg. (Ltz.).
M. 10-punctatus Fabr. s. Dz. (Helm), Wernsdorf (Kuwert).
M. atomarius Fabr. n. s. Wilkie (Eld.), Kleinhaide (Stnr.).
M. multipunctatus Hellw. n. s. im Eichen- und Weidenschwamm, Margen (Ltz.).
M. fulvicollis Fabr. s. Wicken, an alten Kastanienbäumen (Sauter), Kapkeim (Ltz.).
M. populi Fabr. s. F. F. (Stnr.).
M. 4-guttatus Müll. s. Spittelhof (Eld., Ltz.), Kbg. Holzwiesen (Stnr.), Dz. (Helm).
Triphylloides punctatus Fabr. s. Warnicken (Ltz.), Dz. (Czw.).
Litargus bifasciatus Fabr. h. an Birken, Margen, Kbg. Holzwiesen (Czw., Stnr., Ltz.).
Typhaea sumata L. g. an Ställen u. Scheunen überall.
Diphyllus lunatus Fabr. s. s. einmal bei Putzig, Juni (Stf.).

Dermestidae.

- Dermestes vulpinus* Fabr. s. Lyck (Sanio).
D. Frischii Kug. s. Osterode einigermal am Aase angetroffen (Kugel.), Dz. (Fritzen, Czw.).
D. murinus L. n. s. am Aase, Rauschen (Ltz.), Schwarzort in Reihernestern (Czw.).
D. atomarius Er. z. h. unter Pflanzenresten am sandigen Ufer des frischen Haffes, Margen (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).
D. mustelinus Er. s. Grebbiner Wald, an einem todten Fuchse (Dommer).
D. laniarius Illig. *affinis* Gyll. n. s. Margen (Ltz.); merkw. kleine Expl. Dz. (Helm).
D. cadaverinus Fabr. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).
D. lardarius L. g. überall.
D. bicolor Fabr. in Taubenschlägen n. s. (Dommer), Ktzn. (Czw.). Die Larven leben zum Theil parasitisch im Fleische der Vögel, auch an Stockfisch in Speichern (Fritzen).
Attagenus pellio L. g. überall.
A. Schäfferi Hbst. n. s. Osterode, auf Umbellaten (Kug.), Moosbude an Schwämmen (Ltz.).
A. megatoma Fabr. n. s. an Weidenblüthen Loppehnen, Kobbelbude (Eld., Ltz.).
A. 20-guttatus Fabr. s. s. Tolkemit am frischen Haff (Sieb.).
A. pantherinus Ahr. s. s. einmal Ludwigsdorf bei Ggbg. an Käsekasten (Kr.).
Megatoma undata L. n. s. auf blühenden Obstbäumen; die Larven nähren sich von Blatt-wespenlarven, Wernsdorf (Kuwert).
Hadrotoma marginata Pk. n. h. Moosbude (Ltz.), Schwarzort (Czw.).
Trogoderma elongatum Dst. s. s. Osterode, an alten Zäunen (Kug., Sieb.).
T. nigrum Hbst. s. s. auf Umbellaten, Putzig (Stf.).
Tiresias serra Fabr. s. Osterode an alten Buchen (Kug.), Dz. (Czw.), Kbg. an alten Wei-den (Pfeil, Ltz.), Kahlberg (Stnr.).
Anthrenus scrophulariae L. s. h. auf Garten-blumen, namentlich *Saxifraga caespitosa* (Ltz.)
A. pimpinellae Fabr. s. Dz. (Czw.), Oste-rode (Kug.).
A. verbasci L. *varius* Fabr. s. Putzig (Stf.).
A. signatus Er. s. s. in der F. F. 1 Stück (Czw.).

A. museorum L. leider überall g.

A. claviger Er. s. Kbg. (Star.), auf Umbellaten in Gärten, Neustadt (Fritzen).

Trinodes hirtus Fabr. n. s. Osterode auf *Corylus* (Kug.), Kbg. auf Eichen und Weiden (Ltz.), Oliva an Ulmen (Czw.).

Byrrhidae.

Nosodendron fasciculare Oliv. s. s. Sieb.

Syncalypta setigera Illig. s. an feuchten Stellen im Felde, Ggbg. (Kr.), Loppehnen (Stnr.).

S. spinosa Rossi. s. ebenso.

Byrrhus Dennyi Curt. s. s. Lyck 1 Stück (Sanio).

B. pilula L. h. Rauschen auf Sandboden (Ltz.).

B. fasciatus Fabr. h. ebenso.

B. dorsalis Fabr. n. s. ebenso.

B. murinus Fabr. h. ebenso.

Cytillus varius F. h. in trocknen sandigen Waldgegenden (Kug.), Dz. (Helm); die var? *auricomus* Dft., Kbg. Pregelwiesen (Czw., Dt. Ent. Z. XXII. 205).

Morychus aeneus F. n. s. Rauschen in Sandgruben (Ltz.), Dz. (Czw.).

M. nitens Pz. s. Ggbg. (Kr.), Neuhäuser (Stnr.).

Simplocaria metallica St. s. Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.).

S. semistriata Fabr. n. s. Kbg. bei Rosenau (Ltz.).

Limnichus pygmaeus St. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. Neue Bleiche (Czw.).

L. sericeus Dft. s. am Seeufer bei Fischhausen 2 St. (Ltz.), am Pregel (Stnr.).

Georyssidae.

Georyssus pygmaeus Fabr. n. s. am Ufer des Lauthschen Teiches (Eld., Ltz.), Dz., Glettka (Czw.), Radaune (Helm).

Parnidae.

Parnus prolifericornis Fabr. g. in Wasserpfützen auf Wiesen. Die var. *bicolor* Curt. Ggbg. (Kr.).

P. griseus Er. s. Kbg. Dammhof (Pfeil).

P. lutulentus Er. n. s. Kbg. Neue Bleiche (Czw.).

P. auriculatus Pz. n. s. Kbg. (Ltz.), Memel (Star.).

P. nitidulus Heer. s. Dz. (Helm).

Limnius tuberculatus Müll. s. Masuren (Mühl.).

L. troglodytes Gyll. s. in einem Waldbach unter Steinen, im Frühjahr, Putzig (Stf.).

Elmis aeneus Müll. h. Rauschen, Loppehnen im Mühlenbache (Eld., Ltz.); Dz., Neustadt, Putzig (Stf.).

E. obscurus Müll. s. s. Osterode (Kug.), aber nicht wieder gefunden.

E. cupreus Müll. s. Dz. im Mühlenfliess bei Brentau (Fritzen, Helm).

E. Volkmar Pz. h. mit *aeneus* (Eld., Stf.).

E. opacus Müll. s. mit *aeneus* (Stf.).

E. Müller Er. s. Pohibels (Sauter).

Macronychus 4-tuberculatus Müll. s. s. in Pfützen, die mit Chara gefüllt sind: durch Röhren mit einem Stocke bringt man das träge Thier in Bewegung, Osterode im Spätsommer (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

Heteroceridae.

Heterocerus marginatus Fabr. s. macht wie die Maulwürfe Gänge im Lehm und Sand, welche man auf der Oberfläche bezeichnet findet (Kug.), Schwarzort (Ltz.).

H. intermedius Ksw. s. am Radauneufer (Dommer, Fritzen).

H. hispidulus Ksw. n. s. ebenso, Rhedatal bei Neustadt (Fritzen).

H. obsoletus Curt. s. am Seestrande bei Schwarzort (Ltz.).

H. laevigatus Pz. s. ebenso, Dz. (Fritzen).

H. fusculus Ksw. n. s. am Rande von Lehmpfützen, Wernsdorf (Kuwert), Kbg (Czw.), Dz. (Helm).

Lucanidae.

Lucanus cervus L. s. an Eichen in der Wannicker Forst, Galtgarben (Ltz.), die var. *hircus* Hbst. auf Kartoffelfeldern bei Rauschen (Ltz.).

Dorcus parallelepipedus L. n. s. ebenso.

Platycerus caraboides L. *rufipes* Hbst.
Osterode, an Ellern und Eichen s. h. (Kug.),
sonst n. h. Warnicken (Ltz.).

Ceruchus tenebrioides Fabr. s. s. Lötzen
(Eld.), Tilsit (Sieb.).

Sinodendron cylindricum L. n. s. im Mulf
alter Weiden, Eichen und Buchen, Rauschen
(Ltz.).

Scarabaeidae.

Copris lunaris L. n. s. im Pferdedünger auf
den Wiesen am Galtgarben (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

Onthophagus Schreberi L. n. s. im Rinder-
dünger, Rauschen (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

O. taurus L. n. h. im Rinderdünger, Pillau,
Kahlberg (Ltz.).

O. nutans Fabr. s. s. bei Kbg. (Kug., Sieb.).

O. austriatus Pz. bei Lyck im Kuhdüniger
auf sandigen Feldern h. (Sanio), Tilsit am Rom-
binus (Nanke).

O. vacca L. *medius* Pz. g. überall.
O. coenobita Hbst. n. s. Kbg. Sternwarte
an Excrementen (Ltz.).

O. fracticornis Preyssl. h. wie vacca.
O. nuchicornis L. h. Neuhäuser (Ltz.,
Stnr.).

O. camelus Fabr. s. s. bei der Allenstein-
schen Glashütte auf sandigem Wege, Juni 1789
(Kug.), aber nicht wieder gefunden.

O. ovatus L. n. h. Kbg. (Kug., Sieb.).
Oniticellus flavipes Fabr. s. s. Osterode
(Kug.), Thorn (Czw.), im Kuhdüniger, Ohra bei
Dz. (Fritzen).

Aphodius erraticus L. h. Kbg. (Ltz.).
A. subterraneus L. h. ebenso.
A. fossor L. mit var. *sylvaticus* Ahr. n. s.
ebenso.

A. haemorrhoidalis L. h. im Schafmist,
Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).

A. scybalaria Fabr. bei Osterode g. (Kug.),
bei Kbg. nicht bemerkt, bei Dz. s. (Helm).

A. foetens Fabr. g. überall.
A. fimetarius L. ebenso.
A. ater Deg. *terrestris* Fabr. n. s. im
Pferdedünger Dz. (Dommer), Neuhäuser (Stnr.).
A. constans Dft. s. Nehrung bei Pillau
(Sauter).
A. granarius L. h. Kbg. (Ltz.).

A. putridus Hbst. *foetidus* Fabr. n. s.
wie ater, Ggbg. (Kr.), Fahrwasser bei Dz.
(Dommer), Galtgarben (Eld.).

A. sordidus Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
A. rufescens Fabr. s. Danziger Sanddünen
(Czw.).

A. lugens Creutz. s. frische Nehrung bei
Pillau (Sauter), Ggbg. (Kr.).

A. nitidulus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).
A. immundus Creutz. s. ebenso.
A. bimaculatus Fabr. n. s. im Schafdünger,
Dz. (Dommer).

A. niger Pz. s. Dammhof, Neuhäuser (Stnr.),
Schwarzort (Czw.).

A. plagiatus L. n. s. am Pregeldamm (Ltz.),
Neuhäuser (Stnr.).

A. inquinatus Fabr. g. überall.
A. melanostictus Schm. n. s. im Pferde-
dünger Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

A. sticticus Pz. n. h. Putzig (Stf.), Kbg.
(Ltz.).

A. conspurcatus L. s. Blaustein (Ltz.).
A. tessulatus Pk. s. (Sieb.).
A. maculatus St. s. Neustadt (Fritzen).

A. Zenkeri s. s. 1 St. Juli 78 im Walde
bei Oliva (Czw.).

A. lutarius Pk. s. s. Grebbiner Wald (Dom-
mer), Bludauer Forst (Eld.), Masuren (Mühl.).

A. scofa Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Lyck
im Schafsmist (Sanio), Dz. (Helm), Neustadt
(Fritzen).

A. tristis Pz. s. Dz. (Czw.).
A. pusillus Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
A. 4-guttatus Hbst. s. auf den Rauschener
Dünen im Pferdedünger (Ltz.).

A. 4-maculatus L. s. ebenso, Caporn.
Haide (Nanke), Nahrungsforst im Rehdünger
(Dommer), Galtgarben (Eld.).

A. merdarius Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
A. prodromus Brahm. g.
A. punctatosulcatus St. g.
A. contaminatus Hbst. s. s. Osterode
(Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

A. rufipes L. n. h. Warnicken (Ltz.).
A. bipunctatus Fabr. Osterode auf sandi-
gen Wegen im Pferdedünger (Kug.), war bis
etwa 1840 bei Braunsberg nicht gerade selten,
ist aber seitdem verschwunden.

A. luridus Pk. mit der ganz schwarzen
var. g.

- A. depressus* Kug. n. s. im Pferde- und Rinderdünger, Osterode, Dz., Lyck (Kug., Dommer, Sanio).
- A. pecari* Fabr. s. an Exrementen Dz. (Dommer).
- A. arenarius* Oliv. h. Kbg. (Ltz.).
- Oxymus sus* Hbst. n. h. an Exrementen, Rauschen (Ltz.).
- O. testudinarius* Fabr. s. in trocknem Pferdedünger, Margin (Ltz.).
- O. villosus* Gyll. s. s. 2 St Juli 78 im Walde bei Oliva (Czw.).
- O. porcatus* Fabr. s. h. Kbg. in den Speicherrevieren (Ltz.).
- Rhyssemus germanus* L. asper Fabr. n. h. Kapkeim (Ltz.), Dz. (Helm).
- Psammodius vulneratus* St. n. s. in Sandgruben bei Ludwigsort (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).
- P. sulcicollis* Illig. z. s. Schwarzort (Ltz.), Dz. (Helm), Hlgbl. (Stnr.).
- Aegialea sabuleti* Pk. s. s. Kug., Sieb., von Fritzen bezweifelt.
- A. rufa* Fabr. s. Kbg. (Erichs. K. D. III. 919); bei Pasewark auf der Nehrung (Dommer).
- A. arenaria* Fabr. *globosa* Kug. n. h. auf den Sanddünen bei Pillau und Neuhäuser (Ltz.), unter ausgeworfenem Seegras (Sieb.), Glettkau, Schwarzort (Czw.).
- Ochodaeus chrysomelinus* Fabr. s. s. Dz., unter altem trocknem Kuhdüniger (Fritzen).
- Odontaeus mobilicornis* Fabr. s. s. Insterburg (Bachmann).
- Geotrypes Typhoces* L. s. s. Kbg., Dz., Rastenburg (Sieb.).
- G. stercorarius* L. *putridarius* Er. g. im Pferdedünger.
- G. spiniger* Marsh. *stercorarius* Er. h. ebenso.
- G. mutator* Marsh. g. ebenso.
- G. sylvaticus* Pz. h. Rauschen (Ltz.).
- G. vernalis* L. n. s. mit var. *autumnalis* Er. ebenso.
- Lethrus cephalotes* Fabr. nach Kug. bei Schwarzort am Meeressufer unter versaulen Gevächsen, auch im Dünger gefunden, nachher nicht wieder; dürfte in Pr. nicht vorkommen.
- Trox concinnus* Er. s. s. Putzig (Stf., von Fritzen bezweifelt).
- T. hispidus* Pontopp. s. Kbg. vor dem Sackheimer Thore, in Lumpen (Pfeil).
- T. cadaverinus* Illig. s. Putzig (Stf.).
- T. sabulosus* L. n. s. in Lumpen, in Haaren von Thierfellen (Kug.). Kbg. (Ltz.).
- T. scaber* L. h. Wernsdorf (Kuwert).
- Hoplia philanthus* Füssl. *argentea* Fabr. s. s. Rhedathal bei Neustadt (Fritzen), Glettkau (Czw.).
- H. farinosa* L. *squamosa* Fabr. s. s. Kbg. (Sieb.).
- H. pollinosa* Er. *minuta* Illig. n. s. auf den Dünen zwischen Pillau u. Neuhäuser, Juni (Ltz.), Bohnsack bis zur Pommerschen Grenze (Fritzen), Dünengräser bei Fahrwasser (Dommer), Memel (Stnr.).
- H. graminicola* Fabr. n. s. ein Dünenkäfer (Ltz.), aber auch auf dem Quednauer Berge (Stnr.).
- Homaloplia ruricola* Fabr. n. s. Braunsbg., Kbg. in den Strandgegenden auf Weiden (Ltz.).
- Serica holosericea* Scop. n. h. auf Brachäckern, an den Wurzeln versch. Pflanzen, Scleranthus, Erica, Osterode (Kug.), am Seestrande (Ltz.).
- S. brunnea* L. h. in den Strandgegenden, Cranz, Rauschen (Lz.).
- Rhizotrogus solstitialis* L. n. s. auf Brachäckern, Kbg. (Lz.), Hlgbl. (Stnr.).
- R. ruficornis* Fabr. s. Putzig (Stf.), Lyck (Gortitzta), Ggbg. (Kr.).
- R. aequinoctialis* Hbst. 2 St. von Kugel. an Hellwig übersandt u. von diesem als aequin. bestimmt, aber bisher nicht wieder gefunden.
- Polyphylla fullo* L. n. s. in den Strandgegenden von Pillau bis Cranz auf Kiefern (Ltz.), Dz., Rastenburg, Lyck (Sieb.).
- Melolontha vulgaris* Fabr. mit var. *albida* Friv. h. überall, letzterer am besten auf Sandboden, der beim Ausschlüpfen keinen Widerstand bietet und das Haarkleid nicht abreibt.
- M. hippocastani* Fabr. h. ebenso.
- Anisoplia fruticola* Fabr. s. Kug., Sieb.
- A. agricola* Fabr. sand Kugel. in 2 versch. Sammlungen vaterländ. Insecten: bis jetzt nicht wieder gefunden.
- A. crucifera* Hbst. s. von Stf. in Litthauen gefangen (Dommer), von Fritzen bezweifelt.
- A. austriaca* Hbst. s. Braunsbg. (Sieb.), von Fritzen bezweifelt.
- Phyllopertha horticola* L. g. überall.
- Anomala Frischii* Fabr. g., namentlich in den Strandgegenden auf Weiden.

Oryctes nasicornis L. n. s. in Gerberlohe, Kbg. (Ltz.).

Oxythyrea stictica L. s. bei der Allenstein-schen Glashütte auf jungen Eichen (Kug.), Cadienen (Dommer, Frantzius).

Cetonia hirtella L. s. Braunsbg. (Seydler), Dz. (Sieb.).

C. speciosissima Scop. *fastuosa* Fabr. s. s. Osterode 1 St. auf *Thalictrum flavum* (Kug.), Thorn (Eld.), Pelplin, wo die Larve im Mulme alter Linden wohnt (Fritzen).

C. marmorata Fabr. n. h. an alten Weiden Fchstein. (Ltz.), Dz. (Czw.), Hgbl. (Stnr.).

C. aenea Gyll. *metallica* Fabr. h. Lyck (Sanio).

C. aurata L. s. h auf *Spiraea ulmaria* und auf Rosenblüthen, überall.

Osmaderma eremita Scop. n. h. an alten Birnbäumen u. Weidenstämmen, August (Kug.), Dz. (Czw.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

Gnorimus variabilis s. an Eichenstubben Osterode (Kug.), Carmitten (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).

G. nobilis L. n. s. auf blühendem *Cirsium oleraceum*, Warnicken in der Wölsschlucht (Ltz.), Neuhausen, Kleinheide (Stnr.).

Trichius fasciatus L. n. s. auf blühendem Chrysanthemum, Warnicker Forst (Ltz.), F. F. (Stnr.).

Valgus hemipterus L. s. Osterode (Kug.), Pillau (Nanke), Dz., Thorn (Sieb.).

Buprestidae.

Chalcolephora Mariana L. fehlt in den Strand-gegenden, ist aber tiefer nach Süden in Kiefer-wäldern n. s. Osterode (Kug.), Elbing, Rastenburg, Tucheler Haide, Lyck (Sieb.).

Dicerca Berolinensis Hbst. *calcarata* Fabr. s. s. an Baumstämmen der Laubwälder, Osterode (Kug.), Kbg. (Sieb.), Dz. (Helm.).

D. aenea L. s. s. Jäschkenthal 2 St. 1871 (Helm.).

D. acuminata Pall. s. s. auf der frischen Nehrung bei Pröbbernau 1 St. (Stf.).

D. alni Fisch. *fagi* Lap. s. s. Ortelsburg (Mühl.).

Poecilonota conspersa Fabr. einmal bei Pe-lonken (Dz.) auf Buchen und Pappeln zahlreich

(Stf.), sonst s., zuerst 1790 bei Kbg. an alten Pappelstämmen (Kug.).

P. rutilans Fabr. s. bei Liebemühl an den Knorren alter Lindenstämmen (Kug.), Rastenbg. (Sieb.), einmal in Mehrzahl an alten Linden in Catharinenhof bei Kbg. (Bender).

P. decipiens Mannh. s. Rastenbg. (Mühl.).

Ancylacheira rustica s. in Kieferwäldern an der Mittagseite der Stämme bei heissem stillem Wetter sich sonnend, Osterode (Kug.), Kahlberg (Ltz.).

A. punctata Fabr. n. h. Kahlberg (Bachmann, Ltz.).

A. flavomaculata Fabr. ebenso, Tuchelsche Haide (Sieb.).

A. octoguttata L. s. Braunsbg., Heilsbg., Rastenbg., Tuchel. Haide (Sieb.), Schwarzort (Ltz.).

A. splendida Pk. s. s. Thorn (Sieb.).

Eurythyrea austriaca L. s. s. Osterode im Lubninschen Wäldchen auf einer gefällten Buche Juli 1789 (Kug.), ein zweites St. Juli 1877 von einem Gymnasialschüler (Stadie) bei Neukuhren gef. (Czw.).

E. carniolica Hbst. s. s. ein von einem Schüler in den Holzgärten in Kgb. gef. St. be-sitzt Kuwert-Wernsdorf.

Melanophila cyanea Fabr. *tarda* Fabr. n. s. im Kiefernwalde von Schwarzort (Ltz.).

M. appendiculata Fabr. s. ebenso.

Anthaxia nitida Rossi. s. Cadinen (Stf.).

A. nitidula L. *laeta* Fabr. s. in Wäldern auf Blumen, Osterode (Kug.), Elbing (Sieb.).

A. morio Fabr. s. s. in einer ostpr. Forst (Dossow).

A. sepulchralis Fabr. s. s. Braunsberg (Eld.).

A. 4-punctata L. h. auf Syngenesien, bes. Hieracium, Loppehnen (Eld. Ltz.).

Chrysobothris chrysostigma L. s. an alten Weidenstämmen (Kug.), Braunsbg. (Sieb.).

C. affinis Fabr. s. Osterode (Kug.), Elbing (Sieb.), Ggbg. (Kr.).

C. Solieri Lap. s. s. in Masuren auf Kiefernholz (Mühl.).

Agrylus sexguttatus Hbst. s. Greibensche Forst (Ltz.).

A. biguttatus Fabr. n. h. auf jungen Eichen, Elbing, Braunsbg. (Sieb.), Wilkie (Ltz.).

A. mendax Mannh. s. in *Sorbus*-Stämmen, Warnicken (Dossow).

A. subauratus Gebl. coryli Ratz. s. s.
Dammhof (Pfeil).

A. viridis L. h. auf Haseln und Eichen,
Braunsbg., Kbg. (Ltz.); var. *linearis* Fabr. h.
auf Weiden (Kug. Eld.); var. *nocivus* Kbg.
(Ltz.); var. *fagi* Ratz., Aubei Lap., *querceinus*
Ratz. (Dossow, Sauter).

A. betuleti Ratz. s. Elbing, Kbg. (Sieb.).

A. pratensis Ratz. n. h. Löwenhagen (Ltz.).

A. tenuis Ratz. n. h. Kbg. (Ltz.).

A. angustulus Ill. n. s. ebenso.

A. laticornis Ill. n. h. an den Beeren von
Daphne mezereum (Dommer), Brandenburger
Haide (Ltz.), Oliva (Czw.).

A. olivicolor Ksw. h. Braunsbg. (Mühl.),
auf Rüstern in Westpr. (Strübing, Berl. Ent.
Ztg. IV. 322).

A. integrerrimus Ratz. s. Lyck (Sanio).

A. hyperici Creutz. s. Albrechtsthal bei
Wehlau (Sauter).

Aphanisticus pusillus Oliv. s. s. Waldenburg
bei Neustadt auf einer feuchten Wiese, August
(Fritzen).

Trachys minutus L. s. h. auf blühenden
Weiden, Kbg. (Ltz.).

T. pygmaeus Fabr. s. Ggbg. (Kr.).

T. troglodytes Gyll. s. Lyck (Sanio).

T. nanus Hbst. s. Cadienen (Stf.), Gelguhnen
(Ltz.).

Eucnemidae.

Throscus dermestoides L. s. h. auf Eichen,
Kbg. (Ltz.).

T. carinifrons Bonv. n. s. Dammhof (Ltz.,
Czw.).

T. elateroides Heer. s. ebenso; Kbg.
(Pfeil).

T. obtusus Curt. s. ebenso; an Weiden am
Pregel (Stor.), Neustadt (Fritzen).

T. Duvalii Bonv. n. s. bei Dz. an Wiesen-
rändern unter alten Weiden (Czw.).

Drapetes equestris Fabr. s. s., Osterode (Kug.),
Ggbg. (Kr.).

Melasis buprestoides L. s. s. Osterode, im
Holze eines alten Kastanienbaumes, dann auf
Blumen im Eichen- u. Buchenwalde (Kug.), seit-
dem nicht wieder gefunden.

Tharops melasoides Lap. s. s. Kbg. in einem
Garten (Borgien).

Eucnemis capucinus Ahr. s. Kbg. in alten
Weiden bei Fort Friedrichsburg (Pfeil, Ltz.),
Löwenhagen (Czw.).

Microrrhagus pygmaeus Fabr. s., zuerst 1795
an alten Pappelstämmen (Kug.), dann Putzig
(Stf.), Warnicker Park (Ltz.).

M. clypeatus Hampe in Pr. von Kug. ent-
deckt (als *Eucnemis gibbicollis*), aber bisher
nicht wiedergefunden, vergl. Erichs. K. D. IV.
p. 205.

Xylobius alni Fabr. s. s. unter Buchen- und
Eichenrinde (Kug.), frische Nehrung, Cadienen
(Stf.), Ggbg. (Kr.).

Hylochares cruentatus Gyll. s. s. Elbing
(Eld.).

Elateridae.

Adelocera lepidoptera Pz. s. s. Elbing (Sieb.).

A. fasciata L. s. s. Kbg., Rastenbg. (Sieb.).

A. varia Oliv. s. s. einmal an einer Tanne
bei Labiau (Nanke teste Kug.), sonst nicht
wieder gefunden.

Lacon murinus L. h Kbg. (Ltz.).

Drasterius bimaculatus s. s. Pillauer Strand
(Sauter).

Elater (Ampedus) sanguineus L. n. h. auf
Birken, Lyck (Sanio), Zinten (Ltz.).

E. lythropterus Germ. *satrapa* Ksw. n.
h. ebenso.

E. ephippium Oliv. n. h. Kbg. (Ltz.).

E. pomonae Steph. h. Dz. (Helm), Kbg.
(Ltz.), ist hier wie in Livland die häufigste Art
(Seidl. Fn. Balt. p. 119).

E. praeustus Fabr. s. Dz. (Ltz.).

E. pomorum Hbst. s. Kbg. (Ltz.).

E. crocatus Lac. n. h. ebenso.

E. balteatus L. n. s. auf Nadelholz Kbg.
(Ltz.); auf Birken, Lyck (Sanio).

E. elongatulus Fabr. s. Neustadt (Fritzen).

E. erythrogonus Müll. n. h. auf Tannen,
Bludauer Forst (Pfeil, Eld., Ltz.).

E. scrofa Germ. s. Kbg. (Pfeil).

E. nigrinus Pk. n. Wilkie (Ltz.).

Megapenthes subcarinatus Germ. s. s. auf
Tannen, Kbg. (Pfeil).

Cryptohypnus riparius Fabr. n. h. Palmburg
am Pregel (Ltz.).

C. 4 pustulatus Fabr. h. auf den Dünen,
Pillau-Cranz (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

- C. elongatus* Redt. s. Dz. (Helm).
- C. pulchellus* L. n. s. am Fuss der Dünen unter trockenen Blättern, Schwarzort, Cranz (Ltz.).
- C. sabulicola* Boh. n. s. ebenso, Dz. (Helm, Czw.).
- C. dermestoides* Hbst. *tetraphagus* Germ. s. Putzig, am Seestrande (Stf.), Pillau (Sauter).
- C. lapidicola* Germ. wird von Zebe als pr. angeführt.
- Cardiophorus thoracicus* Fabr. s. Sieb.
- C. ruficollis* L. n. s. auf Tannen, Bludauer Forst (Ltz.).
- * *C. rufipes* Fourer. s. Dz. (Ltz.).
- C. ebeninus* Germ. s. Dz., im Grebbiner Walde (Dommer).
- C. atramentarius* Er. wird von Zebe als pr. angeführt.
- C. musculus* Er. n. s. bei Pillau auf den mit spärlichem Grase bewachsenen Dünen, Juni (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).
- C. a sellus* Er. n. h. Dz. (Helm), Neuhäuser (Hensche), Neustadt (Fritzen) auf jungen Kiefern im Mai, Juni.
- C. cinereus* Hbst. n. s. Pillau (Sauter, Stnr.), Ludwigsort auf Sandboden (Ltz.).
- * *C. equiseti* Hbst. n. s. ebenso.
- Melanotus (Cratonychus) niger* Fabr. s. Kug. Sieb.
- M. brunnipes* Germ. s. Sieb.
- M. castanipes* Pk. h. auf *Corylus*, Kbg. (Sauter, Ltz.).
- M. rufipes* Hbst. mit var. *bicolor* Fabr. n. s. ebenso, F. F. (Stnr.), Neustadt (Fritzen).
- M. crassicollis* Er. s. Neustadt (Fritzen).
- Limonius nigripes* Gyll. s. h. auf Weidengesträuch, Kbg. (Ltz.).
- L. cylindricus* Pk. s. h. ebenso.
- L. minutus* L. s. Sieb.
- L. parvulus* Pz. s. Neumark in Westpr. (Janke teste Kramer).
- L. lythroides* Germ. s. Ggbg. (Kr.).
- L. Bructeri* Pz. s. im Radaunethal auf Blumen (Dommer).
- Athous rufus* Deg. s. unter Kiefernholzstapeln, Dz., Elbing, Thorn (Sieb.); Kahlberg, Schwarzort (Ltz.).
- A. niger* L. *hirtus* Hbst. *pubescens* Koch mit var. *scrutator* Hbst. h. auf Gebüschen, Kbg. (Ltz.).
- A. haemorrhoidalis* Fabr. g. überall.
- A. vittatus* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), var. *semipallens* Muls. Neustadt (Fritzen).
- A. longicollis* Oliv. s. Sieb.
- A. trifasciatus* Hbst. *bifasciatus* Gyll. s. s. Kbg. (Kug.), Ohra bei Danzig (Sieb.).
- A. subfuscus* Müll. *atralis* Fabr. g. überall.
- A. Zebei* Bach. n. s. bei Putzig (Stf.).
- Corymbites pectinicornis* L. n. s. auf blühenden Ripsfeldern Kbg. (Ltz.).
- C. aeruginosus* Fabr. s. Pröbbernau auf d. frischen Nehrung (Schindowsky), Dz. (Helm).
- C. haematodes* Fabr. s. s. in den Wäldern bei der Allensteinschen Glashütte (Kug.), Cadinen (Sieb.).
- C. castaneus* L. s. Rossitten (Nanke), Dammhof, Blaustein (Ltz.).
- C. tessellatus* Eab. *assimilis* Gyll. s. h. auf Gebüschen und Wiesen Kbg. (Ltz.).
- C. holosericeus* Oliv. h. ebenso.
- Dianthus impressus* Fabr. n. h. Dammhof (Ltz.), Dz. (Dommer, Frantzius).
- D. metallicus* Pk. n. s. auf jungem Nadelholz Kbg. (Ltz.), Putzig (Stf.).
- D. melancholicus* Fabr. s. Dz. auf Blumen (Dommer).
- D. aeneus* L. h. unter Steinen, Kbg. (Ltz.), ebenso die var. *germanus* L. u. *nitens* Scop.
- D. latus* Fabr. n. s. bei Ggbg. (Kr.), Dz., Ktz. (Czw.), var. *milo* Germ. Neustadt (Fritzen).
- D. cruciatus* L. n. s. Neuhausen, Fuchs Höfen (Ltz.).
- D. bipustulatus* L. n. h. Conitz (Sieb.), Neustadt (Fritzen), an laufenden Birkenstellen im Mai, Blaustein (Ltz.), Aweiden (Stnr.), ebenso die ganz rothgelbe var., die häufiger zu sein scheint, Fchstein (Ltz.).
- Ludius ferrugineus* L. s. s. Kug. Sieb.
- Ectinus aterrimus* L. h. auf Gebüschen (Ltz.).
- Agriotes sputator* L. *graminicola* Redt. h. auf Wiesen (Ltz.).
- A. lineatus* L. h. ebenso.
- A. obscurus* L. h. ebenso.
- A. ustulatus* Schall. var. *sputator* Redt. s. Neustadt (Fritzen).
- Dolopius marginatus* L. h. auf Gebüschen.
- Sericosomus brunneus* L. *fugax* Fabr. n. s. Conitz (Sieb.), auf Nadelholz, Margen (Ltz.).
- Synaptus filiformis* Fabr. n. h. Elbing (Eld.), Cranz (Ltz.).

Adrastus pallens Fabr. *limbatus* Pk. *pussillus* Hbst. s. h. überall.

A. lateralis Er. s Kbg. (Ltz.), Wehlau (Sauter), fehlt bei Stein u. W.

Campylus linearis L. *mesomelas* L. n. h. auf Weiden, Ellern, Eschen (Kug.), Dammhof (Ltz.).

Dascillidae.

Dascillus cervinus L. n. h. auf Buchenstubben (Kug.), am Seestrande (Ltz., Eld.).

Helodes pallidus Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

H. marginatus Fabr. s. Kbg. (Kug.), Dz. (Dommer).

H. lividus Fabr. n. s. Lyck, in der Milchbuder Forst (Sanio), Kbg. (Ltz.).

H. Bohemanni Mannh. s. bei Neuhäuser von einem Gymnasialschüler (Hensche) gefunden, Neustadt (Fritzen).

Cyphon coarctatus Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).

C. nitidulus Thoms. s. Neustadt (Fritzen).

C. palustris Thoms. s. ebenso.

C. fuscicornis Thoms. s. ebenso (fehlt bei Stein u. W.).

C. padi L. g. überall auf Nadelholz.

C. variabilis Thunb. *pubescens* Fabr. ebenso.

C. pallidulus Boh. n. h. auf Weiden, Rauschen (Ltz.), F. F. (Czw.).

Prionocyphon serricornis Müll. s. Schellemühle bei Danzig (Dommer, Frantzius).

Hydrocyphon deflexicollis Müll. s. Echstein (Sauter).

Scirtes hemisphaericus L. h. Kbg. auf Preglwiesen (Ltz.)

S. orbicularis Pz. h. ebenso, wahrscheinlich nicht eigene Art, da Uebergänge vorhanden (Czw.).

Eucinetus haemorrhoidalis n. h. auf den Dünen bei Heub. unterdürrem Laube (Dommer, Helm), Ggbg. (Kr.), unter verrottendem Stroh, Ktzn. (Czw.).

Eubria palustris Germ. n. h. auf Wasserpflanzen an sumpfigen Stellen, Pampauer Thal bei Leesen (Dommer), Ggbg. (Kr.).

Thelephoridae.

9ηλη papilla (Ksw. in Berl. Ent. Zt. 1860 p. 95.).

Dictyoptera sanguinea L. n. s. F. F., Katharinenhof (Ltz.).

Eros Aurora Hbst. n. s. ebenso, einmal bei Osterode auf Buchenstöcken s. h. (Kug.), Dammhof (Stnr.).

E. minutus Fabr. n. h. in altem Buchenholz (Kug.), Kbg. (Ltz., Stnr.).

E. affinis Pk. s. Heilsberg (Sieb.), Hlgbl. (Stnr.).

Lampyris noctiluca L. n. s. unter Gebüschen im Moose, Georgenswalde (Ltz.), durch die ganze Prov. verbreitet, var. *Bellieri* Reiche Neustadt (Fritzen).

L. splendidula L. n. s. ebenso, Reimannsfelde (Ltz.).

Phosphaenus hemipterus Geoffr. s. Leesen bei Danzig (Sieb.), Schromb. (Czw.), Warnicker Park (Ltz.), Kbg. Landgraben (Eld.), nasser Garten (Czw.), var. *brachypterus* Motsch. Neustadt (Fritzen).

Podabrus alpinus Pk. n. s. auf jungen Kiefern, Capornische Haide (Ltz.), Oliva, Zoppot (Helm), var. *rubens* F. Neustadt (Fritzen).

Thelephorus violaceus Pk. s. Kbg. im botanischen Garten, Georgenswalde (Czw.).

T. fuscus L. g. überall, bes. auf Doldengewächsen u. an Kornähren.

T. rusticus Fall. g. ebenso.

T. obscurus L. g. ebenso.

T. nigricans Müll. h. Margin (Ltz.).

T. pellucidus Fabr. h. Kbg. (Ltz.).

T. lividus L. *dispar* Fabr. h. ebenso.

T. assimilis Pk. *dilatatus* Redt. s. Putzig (Stf.).

T. clypeatus Illig. n. s. Kbg. (Ltz.).

T. figuratus Mannh. s. Dz., Heub. auf torfigen Waldwiesen, Neustadt (Czw., Fritzen).

T. rufus L. *lituratus* Fall. *bicolor* Pz. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

T. thoracicus Oliv. *fulvicollis* Redt. g. überall.

T. flavilabris Fall. s. Dz. (Dommer).

T. paludosus Fall. n. s. Dammhof (Ltz., Stnr.), Neustadt (Fritzen).

T. oralis Germ. *lateralis* Gyll. h. Wicken bei Domnau (Sauter), F. F. (Stnr.).

T. pilosus Pk. n. h. Wilkie (Sauter), Putzig (Stf.), Masuren (Mühl.).

T. prolixus Märk. s. Neustadt (Fritzen).

- T. fulvicollis* F. ebenso.
Rhagonycha melanura Oliv. g. auf Garten-spiräen.
R. fuscicornis Oliv. n. h. Kbg., Eichen-krug, Oliva (Czw.).
R. testacea L. g. überall.
R. pallipes Fabr., *pallida* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
R. atra L. n. s. Dammhof (Ltz.).
R. elongata Fall. *paludosa* Redt. n. h. Metgethen (Ltz., Stnr.).
Silis nitidula Fabr. *spinicollis* Charp. n. h., die ♀ s. Dammhof (Ltz.).
S. ruficollis Fabr. s. s. Kbg. auf einer Holzwiese (Czw.).
Malthinus slaveolus Pk. h. auf jungen Eichen (Ltz.).
M. fasciatus Oliv. s. Neustadt (Fritzen).
M. biguttulus Pk. h. ebenso.
M. frontalis Marsh. s. Ggbg. (Kr.).
Malthodus sanguinolentus Fall. n. s. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.).
M. pellucidus Ksw. s. Sieb.
M. nigellus Ksw. s. Schromb. (Czw., Stnr.).
M. marginatus Latr. n. s. Kbg. (Ltz.).
M. crassicornis Mäkl. s. Neustadt (Fritzen).
M. dispar Germ. ebenso.
M. flavoguttatus Ksw. s. Oliva (Czw.).
M. misellus Ksw. n. s. auf Doldengewächsen, Kbg. (Sauter, Ltz.).
M. fibulatus Ksw. s. 2 ♂ Juni 1867 Geor-genswalde (Czw.).
M. mysticus Ksw. n. h. Kbg. (Ltz.).
M. trifurcatus Ksw. s. F. F. Juli 1867 (Czw.).
M. guttifer Ksw. s. Neustadt (Fritzen).
M. brevicollis Pk. h. auf Vaccinium. Kbg. (Ltz.).
M. spathifer Ksw. n. s. F. F., Oliva (Czw., Stnr.), Neustadt (Fritzen).
Drilus concolor Ahr. s. s. Dz. (Sieb.), Rauschen (Stnr.).
Haplochrus femoralis Er. s. vom Dünen-grase geschöpft, Heub. (Helm), Schwarzort, Cranz (Ltz.), Memel (Stnr.); bei Glettkau hat ihn Czw. mit Tabaksdampf aus dichten Büscheln von *Elymus arenarius* erhalten.
Malachius aeneus L. auf Blumen g. überall.
M. bipustulatus L. ebenso.
M. scutellaris Er. s. Dz. (Stf.).
- M. viridis* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
M. marginellus Oliv. n. h. Rosenau bei Kbg. (Ltz.), Neuhausen (Stnr.).
M. elegans Oliv. n. h. ebenso, Wehlau (Sauter).
M. pulicarius Fabr. s. h. Kbg. (Ltz.).
M. rubricollis Marsh. s. Dz. (Dommer).
Anthocomus sanguinolentus Fabr. n. h. Juditten, Wilkie (Eld.), Ggbg. (Kr.).
A. equestris Fabr. s. h. Kbg. (Ltz.).
A. fasciatus L. h. ebenso.
Ebaeus pedicularius Schrk. g. überall.
E. appendiculatus Er. s. s. Westpr. (Strübing, Berl. Ent. Z. IV. p. 322) 1 ♂.
E. flavipes Fabr. s. Sieb.
Charopus pallipes Oliv. s. h. überall.
C. flavipes Pk. s. Neustadt (Fritzen).
Dasytes niger L. n. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
D. coeruleus Deg. *cyanus* Fabr. s. Trenker Waldhaus (Ltz.).
D. plumbeus Müll. *flavipes* Fabr. g. überall.
D. fusculus Illig. n. h. Kbg. (Ltz.); Ra-dunenthal, bei Kahlbude (Dommer).
Dolichosoma lineare Rossi. s. h. auf Dünen-gräsern, Rauschen, Schwarzort, Cranz (Ltz.).
Haplocnemus tarsalis Sahlb. n. h. Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).
H. nigricornis F. n. s. Pampauer Thal (Dommer), Kbg. (Ltz.), Schromb. (Czw.).
H. basalis Küst. s. s. Lyck, 1 St. (Sanio).
Julistus floralis Oliv. s. Conitz (Sieb.).
J. memnonius Ksw. s. Schwarzort auf einer blühenden Linde u. auf Espen (Ltz.), Heub. (Czw.).
Byturus fumatus Fabr. h. auf *Rubus idaeus*, Kbg. (Ltz.).
B. tomentosus Fabr. h. ebenso.

Cleridae.

- Tillus elongatus* L. n. h. Osterode, auf *Chaerophyllum silvestre* (Kug.), Rauschen (Ltz.).
Opilo mollis L. n. s. in Häusern auf frischen Dielen, Kbg. (Ltz.), im Freien an einer Pappel bei Putzig (Czw.).
O. domesticus St. n. h. ebenso, Dz. (Czw.), Neustadt (Fritzen).

Clerus mutillarius Fabr. Osterode, auf Schirmblumen (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

C. formicarius L. s. h. an Kiefern-Klafterholz (Ltz.).

C. rufipes Brahm. substriatus Gebl. s. ebenso, Blaustein (Ltz.), Putzig (Stf.).

Tarsostenus (Opilo) univittatus Rossi. s. s. Danzig, aus morschem Weidenholz erzogen (Stf.).

Trichodes alvearius Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Dz. (Kumm.).

T. apiarius L. h. auf Gartenspiräen (Ltz.).

Corynetes coeruleus Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).

Necrobia violacea L. h. in thierischen Abfällen (Ltz.).

Opetiopalpus scutellaris Panz. n. h. Osterode, auf Coronilla varia (Kug.); an Scheunenwänden, Liep, Margin (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

Hylecoetus dermestoides L. proboscideus F. morio F. s. Cadienen, Pr. Holland, Braunsbg. (Sieb.), h. in Buchenstubben bei Neustadt (Fritzen).

H. flabellicornis Uddin. s. in Bohrlöchern der zweijährigen Abiesstubbchen, Mai. Zinten, Dammhof, Blaustein (Ltz.), F. F. (Czw.), Hlgb. (Stnr.).

Lymexylon navale L. s. im Holze alter Eichen, Moosbude, Elbing auf dem Schiffsbauplatze (Ltz.), Putzig, aus morschem Holz erzogen (Stf.).

Ptinidae.

Hedobia imperialis L. s. Osterode, in alten Weiden u. Linden (Kug.), Fehstein (Ltz.).

Ptinus dubius St. crenatus Pk. s. ♂ im Harzfluss einer Abies, F. F. (Czw.), im Winter unter Pinusrinde Neustadt (Fritzen).

P. rufipes Fabr. elegans Illig. h. auf Eichen, Pilzenkrug (Ltz.).

P. coarcticollis St. s. s. in einem Hause in Danzig, Ostern 78, 1 St. ♂ (Czw.).

P. bicinctus St. s. Ggbg. (Kr.).

P. fur L. g. leider überall.

P. pilosus Müll. pallipes Dft. s. Dz. Schweinsköpfe, unter Eichenrinde (Helm), Schwarzort (Czw.).

P. latro Fabr. s. ebenso, und in Häusern (Fritzen).

P. raptor St. bidens Thoms. s. Neustadt (Fritzen), Löwenhagen an einer alten Weide (Ltz.).

P. pusillus St. s. Liep (Ltz.), Jäschkenthal (Czw.).

P. suppirosus St. s. i. Häusern, Dz. (Fritzen).

Niptus crenatus Fabr. n. h. Dz. (Ltz., Czw.).

N. hololeucus Falld. s. s. Neustadt (Fritzen) in einem Spinnweben.

Mezium affine Boield. s. s. einmal in einem alten Herbarium gefunden (Sieb.).

Gibbum scotias Fabr. s. s. Dz. (Kug., Sieb.).

Anobiidae.

Dryophilus pusillus Gyll. n. s. Putzig auf Kiefernspalten (Stf.), Schwarzort (Ltz.), Neuhäusern, F. F., Vierbrkr. (Stnr.).

Priobium castaneum Fabr. s. s. Osterode, an alten Eichen (Kug., Sieb.).

Anobium pertinax L. h. in Häusern (Ltz.).

A. striatum Oliv. h. ebenso.

A. fulvicorne St. h. an Buchen u. Ellern Neustadt (Fritzen); var. *rufipenne* Dft. s. Kbg. (Ltz.).

A. nitidum Hbst. n. s. Dz. (Dommer), Glettkau (Czw.), Kbg. (Ltz.).

A. emarginatum Dft. s. Wehlau (Sauter), Blaustein (Ltz.).

A. rufipes Fabr. n. h. an Eichen, Rauschen (Ltz.), an Erlen, Glettkau (Czw.).

A. paniceum L. h. bei Bäckern u. Brauern (Ltz.).

A. tessellatum Fabr. n. h. Osterode, in altem Weidenholz (Kug.); auf Linden u. Eichen, Kbg. (Ltz.), Vierbrkr. (Stnr.).

A. plumbeum Illig. s. s. Osterode (Kug.), aus Fichtenzweigen gezogen, aus denen der Käfer im April erschien, Neustadt (Fritzen).

Ernobius abietinus Gyll. s. Blaustein, auf Abies (Ltz.), Putzig (Stf.), F. F. (Stnr.).

E. angusticollis Ratz. s. Dz. (Helm).

E. abietis Fabr. n. s. Wilkie (Eld.), Rauschen, Arnau (Stnr.).

E. mollis L. n. s. ebenso, Blaustein (Ltz.), Kbg. (Stnr.).

E. pini Muls. s. Kbg. (Sauter), Dz. (Helm).

E. parens Muls. s. s. Schromb. 1 St. ((Czw.), Neustadt (Fritzen)).

E. parvicolle Muls. s. Kbg. (Ltz.), F. F. (Stnr.).

E. longicornis St. s. Kbg. (Ltz., Sauter), Neustadt (Fritzen), aus Pinus gezogen.

- E. fuscus* Muls. s. Kbg. Plantage (Czw.), Ggbg. (Kr.).
E. nigrinus St. s. Pr. Stargard (Sieb.), Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).
Oligomerus brunneus Oliv. s. an alten Eichen, Moosbude (Ltz.).
Gastrallus laevigatus Oliv. immarginatus Redt. s. ebenso.
G. sericatus Lap. s. s. Kbg. (Ltz.).
Ptilinus pectinicornis L. s. h. in Bohrlöchern alter Weiden, Juli, Cranz, Rauschen (Ltz.).
P. costatus Gyll. h. ebenso.
Trypopitys carpini Hbst. serricornis Dft. s. Moosbude, Margin (Ltz.), Neuhausen, Metzethen (Stnr.).
Xyletinus ater Pz. s. in faulem Holze, Putzig (Stf.), Schwarzort (Ltz.).
X. pectinatus Fabr. n. s. in vermodertem Eichenholz, Osterode (Kug.), Moosbude (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).
X. laticollis Dft. s. Pampauer Thal (Dommer).
Doreatoma dresdensis Hbst. s. in Schwämmen an Eichen und Buchen, Osterode (Kug.), Schwarzort, Blaustein (Ltz.).
D. chrysomelina St. n. s. auf Eichen, Neukuhren, Schwarzort, Moosbude (Eld., Ltz.).
D. flavicornis Fabr. n. s. ebenso.
D. bovistae Hoffm. s. Cadienen (Stf.), Blaustein (Ltz.), Memel (Stnr.).
D. affinis St. s. s. auf Eichen, Wehlau (Mühl.), Ggbg. (Kr.).
D. subglobosa Muls. s. Kbg. (Kraatz Berl. E. Z. XV. p. 148); auf Eichen, Loppehnen (Eld.).
D. rubens Hoffm. s. s. aus faulem Eichenholz gezogen, Putzig (Stf.), aus Buchen (Fritzen).
Sphindus dubius Gyll. Gyllenhalii Chevrol. s. in Staubpilzen auf alten Stubben, Sperlings (Eld.), Warnicken, Fuchshöfen (Ltz.), F. F. (Stnr.).
Aspidiphorus orbiculatus Gyll. n. s. Loppehnen, Fuehshöfen (Eld., Ltz.), Putzig (Stf.), F. F., Vierbrkr. (Stnr.).
Apate capucina L. n. h. in altem Eichenholz. Elbing, Braunsberg (Sieb.), Wernsdorf, Craam (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).
Dinoderus elongatus Pk. Osterode in altem Eichenholz (Kug.), bisher nicht wieder gefunden.

- Lyctus fuscus* L. canaliculatus Fabr. pubescens Pz. Dft. n. s. in alten Weiden, Löwenhagen (Ltz.).
Cis boleti Scop. g. in Schwämmen.
C. micans Hbst. h. Grebbiner Wald (Dommer), Kbg. (Ltz.).
C. hispidus Pk. g. wie boleti.
C. elongatus Gyll. s. Neustadt (Fritzen).
C. laminatus Mell. s. in faulendem Holze, Putzig (Stf.).
C. bidentatus Oliv. s. Osterode (Kug.), Warnicken (Ltz.).
C. nitidus Hbst. n. s. Kbg. im Schwamm einer alten Esche (Pfeil), Warnicken (Ltz.).
C. Jaquemartii Mellé. s. Neustadt (Fritzen).
C. alni Gyll. n. h. auf Erlen, Warnicken (Ltz.).
C. festivus Pz. h. wie boleti: auffallend ist im Catalog die Bezeichnung Alp. P., da das Thier in Dtschld. sehr häufig ist. Kiesw. K. D. IV. 186.
Rhopalodontus perforatus Gyll. s. in einem Birkenschwamm, Labiau (Mühl.).
R. fronticornis Pz. h. Kbg. (Ltz.).
Ennearthron affine Gyll. h. ebenso.
E. cornutum Gyll. n. s. Wicken bei Domnau (Sauter), Kbg. (Ltz.).
Octotemnus mandibularis Gyll. s. ebenso.
O. glabriulus Gyll. h. Kbg. (Ltz.).
- ### Tenebrionidae.
- Blaps mortisaga* L. n. s. in stockigen Stuben, Kellern, Rauschen (Ltz.).
B. fatidica St. obtusa Curt. s. Culmsee (Janke teste Kramer), Dz. (Ltz.).
Crypticus quisquilius L. h. auf dem Dünen-sande kriechend, Pillau (Ltz.).
Pedinus femoralis L. wird zwar von Kug. aus „Südpreußen“ angeführt, dies gehörte jedoch nicht zu dem jetzigen Pr.; er ist auch in der Prov. nicht weiter gefunden worden.
Heliopates gibbus Fabr. s. h. auf den Sand-dünen, Pillau u. Dz. (Ltz., Czw.).
Opatrium sabulosum L. s. h. überall.
Microzoum tibiale Fabr. h. Dünenkäfer.
Bolitophagus reticulatus L. crenatus Fabr. s. in Baumsehwämmen (Kug.), Warnicken (Ltz.).
Heledona agaricola Pz. s. h. ebenso.

Diaperis boleti L. n. s. ebenso, Georgenswalde (Ltz.).

Hoplocephala haemorrhoidalis Fabr. s. s. im zunderartigen Schwamm einer alten Buche bei der Allensteinschen Glashütte (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

Scaphidema bicolor Fabr. s. s., zuerst 1794 in Angerburg unter der Rinde eines abgestorbenen Pflaumenbaumes gefunden (Nanke), Kbg. (Dommer, Ltz.), Aweiden (Strn.).

Platydema violaceum Fabr. s. Grebbiner Wald, in Moos an Eichen (Dommer), Putziger Stadtwald (Stf.), Neustadt (Fritzen).

Alphitophagus 4-pustulatus Steph. einmal h. Ggbg. (Kr.).

Pentaphyllus testaceus Hellw. n. h. in morschem Eichenholz, Moosbude (Ltz.), Bantau (Dommer), in alten Weiden, Neustadt (Fritzen).

Tribolium ferrugineum Fabr. *castaneum* Hbst. s. Putzig (Stf.), in Kleie bei Bäckern in Neustadt (Fritzen).

T. madens Charp. s. lebt in Scheunen und Strohdächern (Dommer, Fritzen).

Hypophloeus depressus Fabr. an alten Eichen Moosbude (Ltz.), Dz. (Helm).

H. castaneus Fabr. n. h. unter Buchenrinde, auch in Schwämmen, Osterode (Kug.), Wannicken, Elbing (Eld.).

H. fraxini Kug. n. s. im Holz alter Eschen, Osterode (Kug.); unter Tannenrinde, Samitten (Ltz.).

H. pini Pz. s. s. Lyck (Sanio).

H. suturalis Pk. s. Kapkeim (Ltz.), Masuren (Mühl), Grünhöfchen bei Hlgbl. (Czw.).

H. bicolor Oliv. s. Hlgbl. (Seydler), Putzig (Stf.).

H. fasciatus Fabr. s. an Eichen bei Moosbude (Pfeil, Ltz.).

H. linearis Fabr. s. Kbg. (Pfeil), Ggbg. (Kr.).

Uloma culinaris L. s. in altem Holz und unter Rinde (Kug.), unter Holzspähnen in der Tucheler Haide (Schmidt), unter Pinusrinde bei Hela (Fritzen).

Heterophaga dia perina Pz. s. s. Kbg. unter Kiefernrinde (Kug.), Gr. Zünder an einem hölzernen Gebäude (Dommer).

Upis ceramboides L. in einer Sammlung pr. Käfer 4 St. gesehen (Kug.), aber nicht wieder gefunden.

Tenebrio obscurus Fabr. s. Masuren, Mai 1863 (Mühl), Neustadt (Fritzen).

T. molitor L. s. h. bei Bäckern im Mehl.

T. picipes Hbst. *transversalis* Dft. s. unter morscher Eichenrinde, Masuren (Mühl), Neustadt (Fritzen).

Menephilus curvipes Fabr. *Ioripes* Illig. s. s. Osterode, an einem Eichenstubben, Kbg. unter Weidenrinde (Kug.), Dz. (Sieb.).

Helops lanipes L. s. s. in Wäldern, Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

H. quisquilius Fabr. s. Lyck (Sanio), Ggbg. (Kr.), Heub. (Sieb.).

Cistelidae.

Allecula morio Fabr. s. in faulem Eichenholz, Oliva, Putzig (Stf.).

Cistela fulvipes Fabr. s. Kug., Sieb.

C. ceramboides L. s. Schwarzort (Ltz.), Vierbrkr. (Strn.).

C. saperdoides Küst. s. Sieb.

C. rufipes Fabr. s. Dz. (Ltz.).

C. murina L. *thoracica* Fabr. *evonymi* Fabr. n. s. auf *Evonymus europ.*, Kbg. (Ltz.).

Prionychus ater Fabr. n. h. Fuchshöfen (Ltz.), Glettkau an alten Weiden (Czw.).

Hymenorius Doublieri Muls. s. s. einmal im Juni 1862 in Masuren in morschem Eichenholz (Mühl); das Vaterland ist das südliche Frankreich (Berl. Ent. Z. VII. 233).

Mycetochares axillaris Pk. *morio* Redt. s. Moosbude (Pfeil), an Eichenschwämmen, Liep (Ltz.).

M. flavipes Fabr. *humeralis* Fabr. *bimaculata* Mannh. s. Moosbude (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

M. bipustulata Illig. *scapularis* Gyll. n. s. an Weiden- und Hainbuchenstämmen, ebenso.

M. barbata Latr. *brevis* Pz. n. s. ebenso, Arnau (Strn.).

Cteniopus sulphureus L. h. Osterode, Zoppot, Elbing (Ltz.); seltener ist var. *bicolor* Fabr. auf *Matricaria*, Westpr. (Strübing Berl. Ent. Z. IV. 322).

Omophlus pinicola Redt. n. h. Ludwigsort (Sauter), Ggbg. (Kr.), Dz. (Ltz.), Braunsbgs. (Strn.).

O. lepturoides Fabr. s. Osterode (Kug.), auf jungen Kiefern Dz. (Sieb.), von Fritzen bezweifelt.

Lagriidae.

Lagria hirta L. h. auf Gesträuchen.

Melandryidae.

Tetratoma fungorum Fabr. s. im Schwamm einer alten Birke, Osterode (Kug.), Dz. (Helm, Ltz.).

T. ancora Fabr. s. an *Carpinus*, Grebbiner Wald (Dommer), Kleinhäide (Eld.), Neustadt (Fritzen).

Eustrophus dermestoides Fabr. n. s. in Schwämmen an Weiden und Eichen, Osterode (Kug.), Moosbude (Ltz.), Glettkau (Czw.), Holstein (Stnr.).

Orchesia micans Pz. s. in Buchenschwämmen, Osterode (Kug.), Dz. (Dommer), Wilkie (Eld.), Dammhof (Stnr.).

O. luteipalpis Muls. s. s. aus einem Baum-schwamm gezogen, Neustadt (Fritzen).

O. sepicola Rosenh. s. aus trocknem Laube Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).

O. fasciata Pk. n. h. von einer *Carpinus* geklopft, Fehstein (Ltz.), Osterode (Kug.), Dz. (Dommer), Wilkie (Eld.).

Hallomenus humeralis Pz. n. h. in Schwämmen an versch. Bäumen, Gr. Zünder (Dommer), Kbg. nasse Garten (Ltz., Stnr.).

H. fuscus Gyll. s. Ggbg. (Kr.).

Abdera 4-fasciata Curt. s. s. 2 St. von einer Eiche in der Brandenburger Haide geklopft, Juli 1876 (Ltz.).

A. triguttata Gyll. s. s. unter Kiefernrinde bei Pr. Stargard (Schmidt).

A. affinis Pk. s. s. an Ellern in einem den Stamm überziehenden Pilz, aus welchem der Käfer im April und Mai sich entwickelt, Putzig (Stf.), Neustadt (Fritzen).

A. flexuosa Pk. s. in morschen Erlenstöcken, Masuren (Mühl), Corjeiten (Ltz.), Dz. (Helm).

Anisoxya fuscula Illig Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

Dircaea 4-maculata Illig. 4-guttata Pk. ebenso.

D. discolor Fabr. n. h. an Stubben in der Caporn. Haide, Medenauer Wald, Wilkie (Eld.), Putzig (Stf.), Wehlau (Mühl), Vierbrkr. (Stnr.).

Serropalpus barbatus Schall. s. Osterode (Kug.), Kbg. (Ltz.), Hlgl. (Fritzen).

Hypulus quercinus Quens. s. an alten Eichen u. Ahorn im Grebbiner Walde (Dommer), Wehlau (Mühl), Neustadt (Fritzen).

H. bifasciatus Fabr. s. Braunsbg., Conitz (Sieb.), Dammhof (Ltz.), F. F. (Stnr.).

Melandrya caraboides L. s. Elbing (Sieb.), Gelgubnen (Ltz.)

M. canaliculata Fabr. s. Labiau (Nanke, Eld.); unter Pappel- und Birkenrinde, Masuren (Mühl).

M. flavicornis Dft. s. Kug., Sieb.

Phryganophilus nigriventris Hampe s. s.

1 St in der Forst Klein-Nuhr (Dossow).

Scaptia fuscula Müll. s. am Abende fliegend in Kiefernwaldungen (Dommer).

Anthicidae.

Notoxus monoceros L. s. h. überall.

Anthicus humilis Germ. s. Rauschen, Juli (Ltz.).

A. bimaculatus Illig. n. h. Dünen bei Heub. (Sieb.), Haffuser bei Schwarzort (Ltz.).

A. floralis L. h. an Scheunenwänden, Liep (Ltz.), Ktzn. (Czw.).

A. bifasciatus Rossi. s. im Sande, überwinternd an Kastanienstämmen (Dommer).

A. sellatus Pz. n. s. Schwarzort am Haffstrande (Ltz., Stnr.), Pillau (Nanke, Eld.), Dz. (Dommer).

A. gracilis Pz. s. Ktzn. (Czw.), Neuhäuser (Stnr.).

A. antherinus L. n. h. Georgenswalde (Ltz.).

A. 4-guttatus Rossi. s. s. Sieb.

A. hispidus Rossi. s. s. Cranz, am Seestrande (Stf.).

A. ater Pz. s. einmal 3 St. am Seestrande bei Zoppot (Ltz.), Kbg. (Sauter, Stnr.).

A. luteicornis Schmidt s. s. 1 St. am Pregeldamm (Ltz.).

A. flavipes Pz. h. am Haffstrande, Pillau, Schwarzort, Neuhäuser (Ltz., Stnr.).

Xylophilus amabilis Sahlb. s. s. Ggbg. (Kr.) Berl. Ent. Z. VII. 233, Masuren (Mühl).

X. pygmaeus Deg. *fennicus* Mannh. s. s. auf einer Weide bei Glettka 1 St. Juli 1871, ein zweites auf einer Pregelwiese 1874 (Czw.), auf Eichenstrauch einmal Neustadt (Fritzen).

X. populneus Pz. s. Liep (Ltz.), Putzig (Stf.), Kbg. Plantage (Stnr.).

X. nigrinus Germ. n. h. Danziger Nehrung, Putzig (Dommer, Stf.), Schwarzort (Ltz.), Vierbrkr. (Stnr.).

X. tyrolensis Gredl. s. s. unter abgefallenen Fichtennadeln auf Sandboden Neustadt (Fritzen).

Pyrochroidae.

Pyrochroa coccinea L. n. s. Hlgbl., Neuhausen (Stnr.), Elbing, Braunsbg., Pr. Holland (Sieb.), Margen (Ltz.).

P. rubens Schall. s. Dz. (Helm), Elbing (Sieb.).

P. pectinicornis L. s. Elbing, Braunsbg. (Sieb.), Trenker Waldhaus, Neuhäuser (Ltz.), Dz. (Helm).

Mordellidae.

Tomoxia biguttata Gyll. n. h. an morschen Weiden und Eschen Dz. (Helm), an einer abgestorbenen Sorbus Fchstein (Ltz.), Dammhof (Stnr.).

Mordella guttata Pk. n. s. in Pilzen auf Eichenstubben, Samitten (Eld., Ltz.), Löwenhagen (Ltz., Czw.).

M. fasciata Fabr. h. auf *Spiraea ulmaria*.

M. aculeata L. g. ebenso.

Mordellistena abdominalis Fabr. ventralis Fabr. s. auf *Hypericum perf.* (Kug.); auf Umbellaten, Putzig (Stf.).

M. grisea Muls. s. Neustadt (Fritzen).

M. brunnea Fabr. s. Albrechtsthal b. Wehlau (Sauter), Dammhof (Stnr.).

M. humeralis L. n. s. Warnicken, auf *Spiraea ulm.* (Ltz.), Dammhof (Stnr.).

M. variegata Fabr. n. s. ebenso, Glettka (Czw.).

M. parvula Gyll. *pusilla* Redt. *Iiliputana* Muls. h. Dz. (Czw., Helm), Kbg. (Ltz.).

M. subtruncata Muls. *brevicauda* Boh. n. h. Kbg., Dz. (Czw.).

M. pumila Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).
M. episternalis Muls. s. Neustadt (Fritzen).
Anaspis phalerata Germ. s. s. F. F. (Czw.)

1 Stück.

A. frontalis L. *lateralis* Fabr. s. h. überall.

A. ruficollis Fabr. s. Dz. 1867 (Helm).

A. flava L. *thoracica* L. h. Kbg. (Ltz.).

A. rufilabris Gyll. s. h. überall.

A. varians Muls. s. auf blühendem *Cra-tae-gus* Schromb., Dz. (Czw.).

A. brunnipes Muls. s. Horst bei Fchstein (Stnr.).

Rhipiphoridae.

Pelecotoma fennica Pk. s. in Bohrlöchern alter Weiden und Eichen, bei Neue Bleiche (Künow), Blaustein (Ltz.), Kbg. neue Reiserbahn (Czw., Stnr.).

Metoecus paradoxus L. s. s. in einem Wes-penneste (Frantzius), Landsberg i. Ostpr. (Ltz.).

Cantharidae.

Meloe proscarabaeus L. h. im Frühjahr im Grase (Ltz.).

M. violaceus Marsh. n. s. ebenso.

M. variegatus Donov. n. s. Zinten (Ltz.), Dz. (Czw.).

M. scabriusculus Brandt n.h. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).

M. brevicollis Pz. n. s. Kbg. (Ltz.).

Cerocoma Schaefferi L. n. s. auf Chrysanthemum, Rauschen (Eld., Ltz.); Elbing, Dz., Braunsbg. (Sieb.).

Cantharis (Lytta) vesicatoria L. im Süden der Prov. h. auf *Syringa* u. *Fraxinus*, Ggbg. (Kr.).

Oedemeridae.

Calopus serraticornis L. s. unter Baumrinde, Osterode, Dz., Memel (Kug.); Braunsbg., Lyck (Sieb.), Zinten (Ltz.).

Ditylus laevis Fabr. s. s. in Erlenstubben, Kupstinen bei Labiau (Max Wahnschaffe), Greibener Forst bei Postnicken (Dossow).

Nacerdes (Anoncodes) melanura L. n. h. Kbg. (Ltz.).

N. adusta Pz. s. auf Holzplätzen in Dz. (Frantzius, Ltz.).

N. rufiventris Scop. einmal h. an einem Holzschuppen am Seeufer, Schwarzort (Ltz.), Elbing (Abs).

N. ustulata Fabr. s. wie adusta, Kbg. Plantage in Dielen eines Wohnhauses schädlich (Stnr.).

N. viridipes Schmidt. s. s. Dz. (Sieb.).

Asclera coerulea L. s. Kug. Sieb.

Oedemera podagrariae L. n. s Kbg. (Ltz.)

O. flavescentia L. h. ebenso.

O. marginata Fabr. s. bei Kobbelbude auf dem Silberberge (Kuwert).

O. croceicollis Gyll. s. s. am Saspersee bei Danzig (Sieb.).

O. flavipes Fabr. s. Sieb.

O. virescens L. h. auf Blüthen, Kbg. (Ltz.).

O. lurida Marsh. g. überall.

Chrysanthia viridissima L. s. Lyck (Gortzitz), Putziger Stadtwald (Stf.).

C. viridis Schmidt. h. in Laubwäldern im Grase, Schwarzort, Warnicken (Ltz.).

Pythidae.

Pytho depressus L. bei Osterode Ende März recht häufig unter der Rinde gefällter Fichtenstämme (Kug.), sonst s. Lyck (Eld.), Putzig (Stf.), Fuchshöfen (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).

Var. *castaneus* F. s. s. (Eld.).

Boros Schneideri Pz. *corticalis* Pk. s. s. beim Zersägen grosser Birkenklötze 2 St. gef. Osterode, auch vom Senator Schneider zugeschickt (Kug.), aber bis jetzt nicht wieder gefunden.

Salpingidae.

Lissodema denticolle Gyll. s. einmal unter Eichenrinde, Putziger Stadtwald (Stf.), Kbg. Plantage (Stnr.).

L. cursor Gyll. s. Warnicken, 1 St. Juli 1860 (Ltz.).

Salpingus ater Pk. s. Grebbiner Wald an Apfelbäumen überwinternd (Dommer), Dz. (Ltz.), Juditten (Stnr.).

S. castaneus Pz. *piceae* Germ. n. s. Kbg. (Ltz.), Schwarzort (Stnr.).

S. viridipennis Latr. *ruficollis* Pz. s. Neustadt (Fritzen).

S. soveolatus Ijung. s. s. unter einem Steine bei einer Eiche im Frühjahr 1 St. Moosbude (Ltz.).

Rhinosimus ruficollis L. *roboris* Pk. n. s. an Eichenrinde, Dz. (Kumm), Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

R. planirostris Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.); bei Osterode an Eichen (Kug.), auch an Aesculus Dz. (Fritzen).

R. viridipennis Steph. *ruficollis* Pz. s. Neustadt (Fritzen).

R. aeneus Oliv. einmal s. h. 280 St. an Eichenstämmen (Dommer, Berl. Ent. Zt. III. p. XXX), Böttchershöfchen (Ltz.), Juditten (Stnr.), an Ulmen Neustadt (Fritzen).

Cucujionidae.

Mylacus (Orias) rotundatus Fabr. s. Ggbg. (Kr.), Dz. (Czw.).

Otiorrhynchus tenebricosus Hbst. s. s. Pröbbernau auf der frischen Nehrung (Schindowsky).

O. niger Fabr. Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

O. irritans Hbst. Thorn am Weichselufer auf Haseln s. h. (Strübing, Berl. Ent. Zt. IV. p. 322).

O. laevigatus Fabr. s. Sieb.

O. atroapterus Deg. n. s. bei Putzig auf den Dünen, Juni-Aug. (Stf.), Dz. (Kumm, Czw., Helm).

O. raucus Fabr. n. s. auf Gebüschen, Kbg. (Ltz.).

O. porcatus Hbst. s. s. Sieb.

O. septentrionis Hbst. h. auf Nadelholz (Ltz.).

O. picipes Fabr. n. s. wie raucus.

O. gemmatus Fabr. Kug. im Berl. Manuser. p. 179 ohne Angabe des Fundorts, also sehr zweifelhaft, zumal da das Thier ein südeurop. Gebirgskäfer ist.

O. lepidopterus Fabr. wird von Zebe aus Pr. angegeben, möglicherweise richtig, da der Käfer weit verbreitet ist. Seidl. Fn. Balt. p. 400.

O. sulcatus Fabr. s. Warnicker Forst, Kbg. Plantage und im botan. Garten (Stnr., Eld.), an *Vitis vinifera* (Hensche).

- O. nigrita* Fabr. n. s. bei Kbg. (Ltz., Czw.),
h. bei Lyck (Sanio).
- O. ligustici* L. zuweilen h. am Seestrande,
Rauschen (Eld., Ltz.).
- O. ovatus* L. g. überall.
- O. rotundatus* Sieb. Dz. zuerst auf dem
Wege nach Heub. in Wagengeleisen von Sieb.
entdeckt (Stierlin Berl. Ent. Zt. XVI. 328), dann
auch von Helm u. Czw. gefunden, von letzterem
auch bei Oliva am Zaun des Königl. Gartens
neben dem Wege nach dem Karlsberge, Juli
1878 sehr zahlreich, aber erst nach Sonnen-
untergang vorkommend. Sieb. Pr. Prov.-Blätter
1847 p. 431.
- Peritelus hirticornis* Hbst. s. Dammhof
(Sauter).
- Phyllobius maculicornis* Germ. n. s. Kbg.
(Ltz.), Kleinhaide (Stnr.).
- P. glaucus* Scop. *calcaratus* Fabr. *alneti*
Fabr. *brevitalus* Thoms. s. h. auf *Urtica dioica*.
- P. psittacinus* Germ. h. Kbg. (Ltz.), Lyck
(Sanio).
- P. argentatus* L. g. auf *Carpinus*.
- P. betulae* Fabr. s. Ggbg. (Kr.).
- P. oblongus* L. g. auf Obstbäumen.
- P. piri* L. *vespertinus* Fabr. s. h. ebenso.
- P. scutellaris* Redt. s. Ktzn. (Czw., Seidl.
Fn. Balt. p. 402).
- P. pomonae* Oliv. h. Kbg. (Ltz.).
- P. uniformis* Marsh. n. s. ebenso, auf
Eichen (Dommer, Frantzius).
- P. viridicollis* Fabr. n. s. Putzig (Stf.),
Lyck auf der Karbogiu (Sanio).
- P. cinercus* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).
- P. brevis* Gyll. s. Dz., Neustadt auf *Galium verum* (Fritzen).
- P. mus* Fabr. s. s. (Ktzn.) auf Weiden am
Nogatufer (Czw.), Neustadt (Fritzen).
- Polydrosus undatus* Fabr. h. auf jungen
Laubhölzern (Ltz.).
- P. fulvicornis* Fabr. Kug. im Manusr. II.
122. II ohne Angabe des Fundorts, bisher nicht
wieder gefunden.
- P. impressifrons* Gyll. s. Dz. (Ltz.).
- P. flavipes* Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).
- P. coruscus* Germ. n. s. (Helm), Kbg.
(Ltz.), Ktzn. (Czw.).
- P. bardus* Gyll. s. Neustadt (Fritzen).
- P. cervinus* L. h. Kbg., Blaustein (Ltz.).
- P. confluens* Steph. s. Ggbg. (Kr.).
- P. picus* Fabr. h. wie *undatus*.
- P. micans* Fabr. n. s. ebenso.
- P. sericeus* Schall. n. s. ebenso.
- Metallites atomarius* Oliv. n. h. auf Kiefern,
Preil (Stnr.), Lyek (Sanio), Glettka (Czw.).
- Scythropus mustela* Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).
- Sciaphilus muricatus* Fabr. h. auf Nadelholz,
ebenso.
- Platytarsus (Omius) setiger* Gyll. *pruinosus* Schh. n. s. Dz. (Helm, Fritzen).
- P. hirsutulus* Fabr. auf Gesträuchen, Kbg.
(Ltz.).
- Foucartia (Strophosomus) squamulata* Hbst.
s. Loppehnen (Eld.), Heub. (Czw.).
- Barypithes (Omius) mollicomus* Ahr. h.
Heiligenbrunn bei Dz. (Helm, Czw.), Heub.
(Fritzen).
- Strophosomus coryli* F. *obesus* Thoms. s. h.
auf allerlei Gebüschen.
- S. obesus* Marsh. g. ebenso.
- S. faber* Hbst. n. s. auf sandigen Bergen,
Osterode (Kug.), Ggbg. (Kr.).
- Eusomus ovulum* Illig. s. auf den Danziger
Dünen am Riedgrase (Dommer).
- Brachyderes incanus* L. h. auf Nadelholz,
Kbg. (Ltz.).
- Sitones griseus* Fabr. n. h. F. F. (Stnr.), auf
den Pillauer Dünen (Ltz.), Dz. an *Sarothamnus*
(Czw.).
- S. flavescentia* Marsh. *8-punctatus* Germ.
s. h.
- S. sulcifrons* Thunb. *medicaginis* Redt.
h. Wehlau (Sauter), Kbg. (Ltz.).
- S. tibialis* Hbst. h. *ambiguus* Gyll. auf
den Danziger Dünen (Dommer), Loppehnen
(Eld.).
- S. crinitus* Oliv. *lineellus* Schh. g. auf
Kleefeldern.
- S. Regensteinensis* Hbst. s. Lyck (Sanio),
Kbg. (Ltz.).
- S. cambricus* Steph. s. Neustadt (Fritzen).
- S. puncticollis* Steph. s. im Braunsberger
Stadtwalde (Schindowsky).
- S. lineatus* L. g. wie *crinitus*.
- S. lateralis* Gyll. s. Ggbg. (Kr.), Lyck
(Sanio), Neustadt (Fritzen).
- S. hispidulus* Fabr. h. wie *crinitus*.
- S. humeralis* Steph. s. Lyck, auf einer Feld-
wiese (Sanio).
- Trachyplochus spinimanus* Germ. Sieb.

T. scabrieulus L. *setarius* Gyll. *erinaeus* Redt. n. s. Ggbg. (Kr.).
T. scaber L. *squammosus* Gyll. h. Kbg. (Ltz.).
T. aristatus Gyll. s. Kbg. (Grabowski teste Ltz.), Neustadt (Fritzen) unter Erica vulg.
T. squamulatus Oliv. n. h. Loppehnens (Eld.), Ggbg. (Kr.).
T. setiger Schh. s. Sieb.
Cheorhinus geminatus Fabr. s. h. auf den Pillauer und Danziger Dünen, Juni.
Barynotus obscurus Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.), Dz. (Czw.).
Lioptilocus nubilus Fabr. n. s. ebenso.
L. Herbstii Gyll., von Sieb. angegeben ohne Fundort; ist mir zweifelhaft: ich habe noch kein pr. St. gesehen.
Thylacites pilosus Fabr. s. s. Ggbg. (Kr.), Dz. (Helm).
Chlorophanus viridis L. n. s. auf Weiden, Kbg. (Ltz.), Hlgbl. (Stnr.).
C. salicicola Germ. n. h. Dz. (Helm).
Tanymecus palliatus Fabr. n. s. auf Nadelholz Kbg. (Ltz.).
Tropiphorus mercurialis Fabr. n. h. Dammhof (Ltz.).
T. carinatus Müll. s. s. 2 St. Loppehnens (Eld.).
Gronops lunata Fabr. s. in Sandgruben der Strandgegenden, Rauschen (Stnr., Ltz.).
Alophus triguttatus Fabr. n. h. Kbg. (Eld., Ltz.).
Phytonomus (Hypera) punctatus n. s. ebenso, Dz. (Czw.).
P. fasciculatus Hbst. n. s. Vierbrüderkr. (Künow), Heub. (Helm).
P. Julini Sahlb. s. aus Moos von Bersecken (Ltz.).
P. polygoni Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
P. murinus Fabr. n. s. Dz. (Czw.).
P. variabilis Hbst. h. Lyck (Sanio).
P. plantaginis Deg. n. s. ebenso, Dammhof (Ltz.).
P. arundinis Pk. n. s. wohnt in Sium, Phellandrium u. ähnlichen Umbellaten, Brückenkopf bei Tilsit, Dammhof (Ltz.).
P. pollux Fabr. n. h. wie plantaginis.
P. rumicis L. s. h. überall.
P. contaminatus Hbst. s. Sieb.
P. striatus Boh. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).

P. meles Fabr. n. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).
P. posticus Gyll. s. Dz. (Dommer, Frantzius), Loppehnens (Eld.).
P. elongatus Pk. s. Dz. auf Wasserpflanzen (Dommer, Helm), Ggbg. (Kr.). (Berl. E. Z. XV. p. 190.)
P. suspiciosus Hbst. h. Lyck (Sanio).
P. viciae Gyll. n. s. Loppehnens (Eld.), Fuchsberg (Sauter), Hochwasser b. Dz. (Czw.).
P. nigrirostris Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
Limobius dissimilis Hbst. s. s. Dz. (Czw.).
Cleonus albidus Fabr. n. h. in Kiefernwäldern, in Fanggräben, Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz., Grabowski).
C. nebulosus L. n. h. Dz. (Dommer).
C. turbatus Schh. *glaucus* Gyll. h. wie albidus (von nebulosus verschieden?).
C. ophthalmicus Rossi. einmal bei der Allensteinschen Glashütte gefunden (Kug.), aber nicht wieder.
C. varius Hbst. s. in einer pr. Forst (Dossow).
C. alternans Oliv. *cinerous* Schrk. s. ebenso.
C. costatus Fabr. in Kug. Berl. Manuser. p. 174 durch Hellwig nachgetragen, ohne Angabe des Fundorts; neuerlich nicht wieder gefunden.
C. trisulcatus Hbst. s. Spittelhof 1843 (Eld.), Goldap, Lyck (Sanio).
C. marmoratus Fabr. n. h. wie albidus.
C. sulcirostris L. h. auf Sandboden.
Lixus paraplecticus L. h. wohnt in Phellandrium, Dammhof (Eld., Ltz.).
L. turbatus Gyll. n. s. ebenso; auf Cicuta virosa, Lyck (Sanio).
L. angustus Hbst. s. Lyck (Sanio).
L. ascanii L. s. zwischen Pillau u. Fischhausen (Nanke), Dz. (Sieb.).
L. angustatus Fabr. s. s. wie angustus.
L. bardanae Fabr. n. s. auf Rumex-Arten, Oletzko, Lyck (Sanio).
L. junci Boh. s. Oliva, Juli (Stf.).
L. pollinosus Germ. s. Dz. in Sandgruben (Dommer).
Larinus sturnus Schall. s. Neuhausen (Sauter), Bludauer Forst (Dossow), Pogrommen bei Darkehmen (Hensche).
L. jaceae Fabr. n. s. auf Centaurea jacea, Lyck (Sanio).

L. planus Fabr. u. var. *carlinae* Oliv.
(Kraatz B. E. Z. XVI. 144) n. h. Ggbg. (Kr.),
auf *Cirsium arvense* Lyck (Sanio), Dammhof
(Ltz.).

L. senilis Fabr. s. auf *Carlina vulgaris*, Lyck
(Sanio).

Molytes coronatus Goeze s. s. Sieb.

M. germanus L. s. s. Kug., Sieb.

M. carinaerostris Küst. n. h. Hlgbl. (Stnr.),
Tilsit (Ltz.).

Trachodes hispidus L. n. h. Putziger Stadt-
wald, Oliva (Stf.), Kbg. (Sauter, Czw.), Ggbg.
(Kr.) F. F. (Stnr.).

Lepyrus colon Fabr. h. auf Weiden.

L. binotatus Fabr. n. s. ebenso, Kbg.
(Ltz.).

Hylobius pineti Fabr. n. h. Galtgarben (Eld.),
Wilkie (Ltz.).

H. abietis L. g. überall auf Nadelholz.

H. pinastri Gyll. bei Kbg. h. (Ltz.), bei
Lyck s. (Sanio).

H. fatuus Rossi. s. Ludwigsort (Sauter),
Dz. (Zebe).

Pissodes piceae Illig. s. Pr. Stargard (Schmidt).

P. pini L. s. Lyck (Sanio), Wilkie (Eld., Ltz.).

P. notatus Fabr. s. h. auf Nadelholz.

P. strobili Redt. n. s. Kbg. (Ltz.), Loppehnen
(Eld.), Lyck Neuendorfer Wald (Sanio).

P. piniphilus Hbst. s. Ggbg. (Kr.), Kbg.
Holzwiesen, Schwarzort (Czw.).

Grypidius equiseti Fabr., *atrirostris* Fabr.
n. s. Kbg. (Ltz.)

G. brunnirostris Fabr. n. h. ebenso.

Erirhinus bimaculatus Fabr. n. h. Damm-
hof (Pfeil, Ltz.), Dz. (Czw.).

E. scirpi Fabr. h. Dammhof (Kuwert, Ltz.).

E. acridulus L. s. h. überall.

E. Märkelii Boh. n. h. Loppehnen (Eld.).

E. aethiops Fabr. n. h. ebenso, Palmburg
(Ltz.), Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.).

E. festucae Hbst. n. s. Dammhof (Stnr.,
Czw., Ltz.).

E. nereis Pk. n. s. ebenso.

E. scirrhosus Gyll. n. s. ebenso.

Dorytomus vorax Fabr. *macropus* Redt. n.
s. Kapkeim (Ltz.).

D. tremulae Pk. h. auf Espen, Kbg. (Ltz.).

D. variegatus Gyll. s. Dz. Neustadt (Fritzen).

D. costirostris Gyll. *bituberculatus*
Zett. n. s. auf Weiden, Dammhof (Sauter,
Ltz.).

D. affinis Pk. s. Kbg. (Ltz.).

D. suratus Gyll. s. Kbg. Plantage (Stnr.),
Neustadt (Fritzen).

D. taeniatus Fabr. n. s. ebenso.

D. occalescens Gyll. s. Loppehnen (Eld.),
Dz. (Helm.).

D. flavipes Pz. s. Neustadt (Fritzen).

D. agnathus Boh. n. h. Ggbg. (Kr.), F. F.
(Stnr.).

D. majalis Pk. n. s. auf Weiden, Kbg.
(Ltz.), Lyck (Sanio).

D. pectoralis Pz. n. s. auf *Salix fragilis*,
ebenso.

D. tortrix L. n. s. wie majalis.

D. minutus Gyll. s. Dz. (Helm.), Wernsdorf
(Stnr.).

D. villosulus Gyll. s. Neustadt (Fritzen).

D. filirostris Gyll. s. Kbg. (Czw.), Kapkeim
(Ltz.), Neustadt (Fritzen).

D. dorsalis L. n. h. auf Weiden, Dammhof
(Ltz.).

Pseudostyphlus (*Erirhinus*) *pilumnus* Gyll.
n. h. Ggbg. (Kr.), Warnicker u. F. F. (Ltz.
Czw.).

Smicronyx politus Boh. s. aus Röhricht vom
Pregeldamm (Sauter, Ltz., Stnr.).

Brachonyx indigena Hbst. h. auf Nadelholz
(Ltz.).

Anoplus plantaris Naezen, *roboris* Suffr.
n. s. auf Birken, Kbg. (Ltz.).

Tanysphyrus lemnae Fabr. h. an Lemnaarten,
Dammhof (Ltz.).

Bagous (*Lyprus*) *cylindrus* Pk. n. s. Gold-
bach an der Deime (Ltz.), Dz. (Frantzius).

B. rotundicollis Boh. s. s. Dammhof
(Pfeil).

B. nodulosus Schh. s. Dz. auf nassen Wiesen
an der Weichsel (Fritzen).

B. binodulus Hbst. h. auf *Stratiotes aloides*,
Dammhof (Kuwert, Ltz.).

B. subcarinatus Gyll. s. Kbg. Pregelwiesen
am Holländer Baum (Czw.).

B. frit Hbst. s. Dammhof (Eld.).

B. diglyptus Boh. s. ebenso.

B. lutulosus Gyll. s. Lyck (Sanio), F. F.,
Neuhäuser (Stnr.).

B. tempestivus Hbst. s. Dz. (Ltz.).

B. limosus Gyll. s. an Sümpfen auf Wasser-pflanzen Dz. (Dommer, Frantzius), Dammhof (Czw.).
 B. lutosus Gyll. s. Kbg. (Ltz.), Memel (Stnr.).
 B. lutulentus Gyll. h. Dammhof (Eld., Stnr., Ltz.).
 B. nigritarsis Thoms. s. Kbg. auf Pregel-wiesen, Dammhof (Czw.), Neustadt (Fritzen).
Hydronomus alismatis Marsh. n. s. auf Wiesen Blaustein (Ltz.), Dz. (Helm), Kbg. (Sauter).
Cryptorhynchus lapathi Linn. n. s. am Stamme von Weidengesträuch, Kbg. (Eld., Ltz.).
Acalles camelus Fabr. s. fehlt im Norden; aus Laub gesiebt, Ggbg. (Kr.).
 A. *ptinoides* Marsh. s. ebenso.
Magdalinus memnonius Fald. carbonarius Fabr. s. Nehrung bei Pillau (Sauter).
 M. *phlegmaticus* Hbst. s. Ggbg. (Kr.).
 M. *linearis* Gyll. s. Löwenhagen (Ltz.), Rauschen (Stnr.).
 M. *duplicatus* Germ. n. s. ebenso, von Abies geklopft, Pr. Stargard (Schmidt).
 M. *frontalis* Gyll. s. Schwarzort (Czw.).
 M. *violaceus* L. n. h. Ludwigsort (Ltz.).
 M. *nitidus* Gyll. einmal h. bei Fchstein (Ltz.), Dz. (Helm).
 M. *cerasi* L. n. s. Kbg. (Ltz.).
 M. *aterrimus* Fabr. stygius Gyll. s. Dz. (Frantzius), Pröbbernau (Schindowsky).
 M. *carbonarius* L. atramentarius Germ. s. Warnicken (Ltz.).
 M. *flavicornis* Gyll. s. Zoppot (Czw.).
 M. *barbicornis* Latr. s. Dz. (Frantzius), Loppehnen (Eld.).
 M. *pruni* L. h. namentlich auf Ebereschen, Liep (Ltz.).
Balaninus venosus Germ. s. im Gutsgarten von Liep von Eichen geklopft Ende Mai (Ltz.).
 B. *nucum* L. n. h. auf Corylus, Warnicken (Ltz.).
 B. *turbatus* Gyll. s. s. Luckneiner See bei Nicolayken, 1 St. (Sanio).
 B. *villosus* Fabr. n. h. auf Eichen, Neu-hausen, Arnau (Stnr.), Juditten (Ltz.), Oliva (Czw.).
 B. *cerasorum* Hbst. n. s. auf Birken und Erlen, Pillauer Plantage (Eld., Ltz.), Oliva (Czw.), Memel (Stnr.).
 B. *rubidus* Gyll. s. Dz. (Dommer), Glettkau (Czw.).

B. *crux* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
 B. *brassicae* Fabr. h. ebenso.
 B. *pyrrhoceras* Marsh. n. h. auf Weiden, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.), Preil (Stnr.).
Anthonomus rubi Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
 A. *pubescens* Pk. h. im ganzen Sommer auf Nadelholz, Bludauer Forst (Ltz.), Schromb. (Stnr.).
 A. *varians* Pk. n. h. ebenso.
 A. *cinctus* Redt. s. Heub. Dünen (Fritzen).
 A. *ulmi* Deg. s. Dz. (Ltz.).
 A. *pedicularius* L. s. ebenso.
 A. *spilotus* Redt. n. h. auf blühendem Crataegus, Schromb. (Czw., Stnr., Ltz.), Dz. (Helm).
 A. *pomorum* L. n. s. an Obstbaumblüthen, Kbg. (Ltz.).
 A. *incurvus* Pz. n. h. Putzig (Stf.), von Ebereschen geklopft, Dammhof (Sauter).
 A. *druparum* L. g. auf blühender Prunus padus, Arnau, Aweiden (Ltz.).
Acalyptus carpini Hbst. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).
Eileschus scanicus Pk. n. h. Schwarzort (Ltz.).
 E. *bipunctatus* L. h. Fchstein, Margen, auf Weiden (Ltz.).
Tychius 5-punctatus L. n. s. auf Poten-tilla verna, Loppehnen (Eld.), Rauschen (Ltz.).
 T. *polylineatus* Germ. s. auf Anthyllis vulneraria, Pillauer Dünen Juli (Ltz., Stnr.).
 T. *Schneideri* Hbst. s. Dz. (Zebe), Kbg. (Ltz.).
 T. *squamulatus* Gyll. n. h. auf Melilotus, Cranz (Ltz.).
 T. *venustus* Fabr. Dz. auf Sarothamnus h. (Ltz.), Kleinhäide (Stnr.).
 T. *medicaginis* Bris. s. Ggbg. (Kr.).
 T. *junceus* Reich. h. auf Lotus cornic. Pillau, auf Melilotus vulgaris Arnau (Ltz.), Memel (Stnr.), Dz. (Czw.).
 T. *tomentosus* Hbst. g. überall.
 T. *picirostris* Fabr. n. s. Dz. von Haide-kraut geschöpft (Dommer, Frantzius, Czw.), Kbg. (Ltz.), var. *posticinus* Schh. Neustadt (Fritzen).
Sibinia sodalis Germ. s. Ggbg. (Kr.).
 S. *primita* Hbst. s. ebenso, Dz., Neustadt (Fritzen).
 S. *cana* Hbst. n. s. auf grasigen sandigen Anhöhen, Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).

- S. viscariae* L. s. Dz. (Dommer).
- S. potentillae* Germ. h. auf *Spergula arvensis*, Rauschen (Ltz.), Dammhof (Stnr.).
- Mecinus piraster* Hbst. n. h. Rauschen (Ltz.).
- M. collaris* Germ. n. h. in Sandgruben bei Ludwigsort (Pfeil); Kbg., Tilsit (Ltz.).
- Gymnetron pascuorum* Gyll. s. Loppehnen (Eld.). Kbg. (Ltz.).
- G. villosulum* Gyll. s. auf *Veronica beccabunga* Kbg. (Ltz.).
- G. veronicae* Germ. h. überall.
- G. beccabungae* L. n. h. Kbg. (Ltz.).
- G. labile* Hbst. n. h. Hirschau (Ltz.).
- G. stimulosum* Germ. s. s. 1 St. Lyck (Sanio).
- G. rostellum* Hbst. n. h. Palmburg (Ltz.), Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen).
- G. netum* Germ. s. am Seestrande (Ltz.).
- G. linariae* Pz. h. auf *Lin. vulgaris*, Rauschen (Ltz.).
- G. tetricum* Fabr. n. h. ebenso, Lyck (Sanio).
- G. antirrhini* Germ. h. wie *linariae*.
- G. noctis* Hbst. s. Rauschen (Ltz.).
- G. pilosum* Gyll. s. Kbg. (Sauter), Lyck (Sanio).
- Der als *G. thapsicola* Germ. von Stf. bezeichnete Käfer (Putzig) ist wahrsch. *a sellus* Grav. gewesen (Seidl. Fn. Balt. p. 438 Anm.).
- Miarus longirostris* Gyll. s. 2 St. am Seestrande (Ltz.).
- M. graminis* Gyll. s. aus den Samenkapseln von *Campanula rapunculoides* gezogen (Sieb.), Lyck (Sanio).
- M. campanulae* L. s. h. in den Glocken von *Camp. latifolia*, Warnicker Park (Eld., Ltz.).
- M. micros* Germ. s. Neustadt (Fritzen).
- M. plantarum* Dej. s. Putzig (Stf.).
- Cionus serophulariae* L. h. auf der Nährpflanze.
- C. verbasci* Fabr. h. ebenso.
- C. Olivierii* Chevr. s. Kbg. (Eld.).
- C. thapsus* Fabr. h. auf *Verbascum th. Lyck* (Sanio).
- C. hortulanus* Marsh. s. Dz. (Dommer) auf *Verbascum*.
- C. blattariae* Fabr. Hellwig im Berl. Manusr. p. 172 bemerkte: „eines der von Kugel. als Curc. thapsi überschickten Expl. war blattariae“. Bis jetzt nicht wieder gefunden.
- C. pulchellus* Hbst. s. Dz. (Dommer, Frantzius), Ponarth (Ltz.).
- C. fraxini* Deg. s. auf jungen Eschen Putzig (Stf.), Fchstein (Ltz.).
- Nanophyes gracilis* Redt. s. Horst, auf einer Pregelwiese 4 St. (Kuwert), auf Rasenplätzen Neustadt (Fritzen), Juditten (Grabowski).
- N. globulus* Germ. s. auf *Populus tremula* Putzig (Stf.).
- N. lythri* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
- Orchestes quercus* L. h. auf Eichen, Warnicken (Ltz.).
- O. rufus* Oliv. s. auf Ulmen am Alleufer (Sauter), Dz. (Dommer).
- O. scutellaris* Fabr. n. s. F. F. (Stnr.), Loppehnen (Eld.) auf Birken; die var. *pubescens* Stev. s.
- O. alni* L. s. Friedland, am Alleufer, Wehlau (Sauter).
- O. Ilicis* Fabr. h. auf Eichen, überall (Ltz.).
- O. Jota* Fabr. n. h. auf *Rubus saxatilis* (Kug.), Fchstein (Ltz.), Vierbrkr. (Stnr.).
- O. fagi* L. h. auf *Carpinus*, Kbg. (Ltz.).
- O. pratensis* Germ. n. h. Dz. (Frantzius), Luckneiner Forst bei Nikolayken (Sanio).
- O. Ionicerae* Hbst. n. s. auf *Lon. xylosteum* Blaustein (Ltz.).
- O. rusci* Hbst. *bifasciatus* Gyll. h. auf Weiden Kbg. (Ltz.).
- O. signifer* Creutz. n. s. ebenso, Putzig (Stf.).
- O. decoratus* Germ. s. F. F., Juni (Czw.).
- O. salicis* L. h. wie *rusci*; die var. *rufitarsis* Germ. Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).
- O. stigma* Germ. h. wie *rusci*.
- O. populi* Fabr. s. h. überall auf Pappeln.
- O. saliceti* Fabr. n. s. wie *rusci*.
- Ramphus flavicornis* Clairv. h. auf versch. Gesträuchen, bes. Ellern, Kbg. (Ltz.).
- Mononychus pseudacori* Fabr. n. h. auf *Iris*, Kbg. (Ltz.), Dz. (Dommer).
- Coeliodes quercus* Fabr. h. auf Eichen, Warnicken (Ltz.).
- C. rubicundus* Pk. s. auf Birken, Putzig (Stf.), Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).
- C. epilobii* Pk. h. auf *Epil. angustif.* Putzig (Stf.), Löwenhagen (Ltz.).
- C. guttula* Fabr. n. h. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio), Neuhausen (Stnr.).

- C. subrufus* Hbst. h. F. F., Neuhäuser, Preil (Ltz., Stnr.).
- C. didymus* Fabr. g. überall auf Labiaten.
- C. lamii* Eabr. h. *punctulum* Hbst. auf Lam. *album*, Kbg. (Ltz.)
- C. geranii* Pk. *exiguus* Oliv. im Süden n. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio)
- Scleropterus serratus* Germ. n. s. an sumpfigen Stellen der F. F. (Czw., Ltz.), Fehstein, Liep (Eld.).
- S. (Rhytidosomus) globulus* Hbst. s. Dz. (Ltz., Czw.), F. F., Löwenhagen (Stnr.).
- Rhinocerus castor* Fabr. s. h. auf Rumex *acetosella*.
- R. bruchoides* Hbst. h. ebenso.
- R. inconspectus* Hbst. n. s. Pr. Holland (Sieb.), Kbg. (Ltz.).
- R. pericarpius* L. h. wie castor, Kbg. (Ltz.).
- R. guttalalis* Grav. *subfasciatus* Gyll. n. s. ebenso, Lyck (Sanio), Pregelwiesen (Czw.).
- R. albicinctus* Gyll. s. s. Sieb.
- Phytobius* Waltoni Boh. *notula* Germ. s. Dz. (Dommer), Ggbg. (Kr.), an sumpfigen Stellen der F. F. und Löwenhagen (Czw.).
- P. canaliculatus* Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.).
- P. 4-nodosus* Gyll. s. Dz. (Frantzius), Lyck (Sanio).
- P. comari* Hbst. n. h. Dammhof (Ltz.).
- P. 4-tuberculatus* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
- P. 4-cornis* Gyll. s. wie 4-nodosus.
- Litodactylus leucogaster* Marsh. s. Lyck (Sanio), Neuhäuser (Stnr.).
- L. velatus* Beck. s. Blaustein (Ltz.).
- Amalus scortillum* Hbst. h. auf Cruciferen, Kbg. (Ltz.).
- Orobites cyaneus* L. s. Georgenswalde (Ltz.).
- F. F. (Stnr.), Heub. (Sieb.).**
- Ceuthorhynchus troglodytes* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).
- C. apicalis* Gyll. s. Sieb.
- C. depressicollis* Gyll. s. Sieb.
- C. melanarius* Steph. *convexicollis* Boh. s. Loppehnen (Eld.).
- C. quercicola* Pk. s. Wehlau (Sauter), Lyck (Sanio).
- C. floralis* Pk. s. h. auf Cruciferen.
- C. achilleae* Gyll. s. Lyck (Sanio).
- C. constrictus* Marsh. s. Neustadt (Fritzen).
- C. pulvinatus* Gyll. s. Wehlau (Sauter).
- C. pumilio* Gyll. s. Ggbg. (Kr.).
- C. querceti* Gyll. n. h. Kbg. (Ltz.).
- C. arator* Gyll. s. wie *pumilio*.
- C. syrites* Germ. *alauda* Fabr. h. ebenso, Kbg. (Ltz.).
- C. assimilis* Pk. h. ebenso.
- C. erysimi* Fabr. h. auf Cruciferen, Kbg. (Ltz.).
- C. contractus* Marsh. *hirtulus* Germ. h. ebenso.
- C. cochleariae* Gyll. n. h. Putzig (Stf.), Wehlau (Sauter), Lyck (Sanio).
- C. nanus* Gyll. n. s. Lyck (Sanio).
- C. ericae* Gyll. n. h. auf Er. vulgaris, Rauschen (Stnr., Ltz.), Putzig (Stf.).
- C. sphaerion* Schh. s. Neustadt (Fritzen).
- C. echii* Fabr. s. Kbg. (Ltz.), häufiger bei Dz. (Czw.).
- C. viduatus* Gyll. s. Rosenau b. Kbg. (Ltz.)
- C. raphani* Fäbr. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).
- C. borraginis* Fabr. s. s. Loppehnen (Eld.).
- C. abbreviatulus* Fabr. s. Dahlheim (Wohlfrohm), Kbg. (Ltz.).
- C. cruciger* Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).
- C. litura* Fabr. n. h. Lyck, Nicolayken (Sanio), Warnicken (Ltz.).
- C. trimaculatus* Fabr. s. Lyck (Sanio).
- C. albosignatus* Gyll. s. Löwenhagen (Ltz.).
- C. asperifoliarum* Gyll. n. s. ebenso, Dz. (Frantzius).
- C. cämpestris* Gyll. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).
- C. pubicollis* Gyll. s. F. F. (Czw.).
- C. triangulum* Boh. s. Lyck (Sanio), Ggbg. (Kr.), Kbg. (Grabowski).
- C. chrysanthemi* Gyll. *figuratus* Gyll. s. ebenso, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.), Lyck (Sanio), F. F., Neuhausen (Stnr.).
- C. rugulosus* Hbst. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Grabowski), wohl mit dem vorigen identisch (Thoms.).
- C. arquatus* Hbst. s. Ggbg. (Kr.).
- C. melanostictus* Marsh. s. Dz. Hochwasser (Czw.), var. *lycopi* Gyll. Ggbg. (Kr.).
- C. quadridens* Pz. n. s. Kbg. (Ltz.).
- C. marginatus* Pk. *punctiger* Gyll. h. ebenso.
- C. pollinarius* Forst. n. h. ebenso.
- C. obsoletus* Gyll. s. Loppehnen (Eld.), Waldau (Ltz.).

- C. tarsalis* Boh. s. Loppehnen (Eld.).
C. rapae Gyll. n. h. Dz. (Franzius), Lyck (Sanio).
C. barbareae Suffr. *cyanopterus* Redt. s. s. Lyck (Sanio).
C. ignitus Germ. s. Dz. (Czw.).
C. cyanipennis Germ. h. auf Brassica-Arten Kbg. (Ltz.).
C. suturellus Gyll. s. Lyck (Sanio).
C. chalybaeus Gyll. s. ebenso.
Poophagus sisymbrii Fabr. n.s.Dammhof(Ltz.)
Tapinotus sellatus Fabr. n. h. auf Moorwiesen, Juditten, Dammhof (Ltz.), F. F. (Czw., Stnr.).
Marmoropus Besseri Gyll. s. Kbg. (Sauter).
Coryssomerus capucinus Beck. s. Kbg. Ausfallthor, Neuhäuser, Oliva (Stnr., Czw.).
Baridius nitens Fabr. s. in den Danziger Dünen (Dommer, Frantzius).
B. artemisiae Hbst. n. s. auf Artem. vulgaris Kbg (Ltz., Stnr.).
B. picinus Germ. n. s. Lyck (Sanio), Neuhäuser (Stnr.).
B. chloris Fabr. s. Sieb.
B. lepidii Germ. n. s. wie *picinus*, Dz. (Frantzius).
B. abrotani Germ. s. Kbg. (Ltz.), Dz. (Helm).
B. T-album L. n. s. auf Wiesen ebenso.
Sphenophorus abbreviatus Fabr. auf *Cornus sanguinea*, Osterode (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.
Calandra granaria L. zuw. h. an sonnigen Frühlingstagen an den Wänden der Kornspeicher (Ltz.);
Dryophthorus lymexylon Fabr. s. Gelguhnen (Ltz.).
Cotaster uncipes Boh. s. s. Georgenswalde unter Seetang Juli 1860 (Ltz.).
Cossonus linearis Fabr. n. s. im Mulf alter Weiden und Linden, Osterode (Kug.), Kbg. (Nanke, Ltz.).
C. ferrugineus Clairv. s. in Holzwerk, Dz. (Schmidt).
C. cylindricus Sahlb. n. s. wie *linearis*.
Phloeophagus spadix Hbst. s. s. Memel (Stnr.).
Rhyncolus chloropus Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).
R. elongatus Gyll. n. h. Pröbbernau (Schindowski).
R. culinaris Germ. s. Kbg. Plantage (Eld., Stnr.), Dz. (Frantzius).
- R. lignarius* Marsh. *cylindrirostris* Oliv. s. Kbg. (Ltz.).
R. reflexus Boh. s. Dammhof, Wilkie(Sauter).
R. porcatus Germ. s. wie *elongatus*, Dz. (Helm).
R. truncorum Germ. s. Sieb.
Apion pomonae Fabr. g. auf Nadelholz.
A. opeticum Bach. s. Ggbg. (Kr.), Dammhof, Neuhausen (Stnr.).
A. eraccae L. h. Kbg. (Ltz.).
A. cerdo Gerst. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).
A. subulatum Kirb. n. h. Milchbuder Forst bei Lyck (Sanio), F. F., Kleinhäide (Stnr.).
A. ochropus Germ. s. s. Braunsbg., von jungen Buchen geklopft (Schindowsky).
A. carduorum Kirb. h. Kbg. (Ltz.).
A. basicorne Illig s. Sieb.
A. tenue Kirb. s. Neustadt (Fritzen).
A. penetrans Germ. s. Westpr. (Strübing Berl Ent. Z. IV. p. 322), Lyck (Sanio).
A. onopordi Kirb. s. Lyck (Sanio).
A. confluens Kirb. *stolidum* Germ. n. h. wie *penetrans*, Kbg. (Stnr.).
A. vicinum Kirb. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
A. atomarium Kirb. n. s. Dammhof (Eld.), Putzig (Stf.).
A. Hookeri Kirb. h. Kbg. (Ltz.).
A. difficile Hbst. s. Dz. (Dommer).
A. fuscirostre Fabr. h. aus den Früchten von *Sarothamnus erzogen*, Redlau b. Dz. (Eld.), Zoppot (Ltz.).
A. pallipes Kirb. s. Dz. (Dommer).
A. vernale Fabr. h. auf *Urtica dioica*.
A. aeneum Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
A. radiolus Kirb. n. s. ebenso.
A. astragali Pk. n. h. Dz. (Dommer), Kbg. (Ltz.), auf Astr. *glycyphyllos*.
A. ononis Kirb. s. Neustadt (Fritzen).
A. dispar Germ. s. Loppehnen (Eld.).
A. striatum Marsh. s. Neustadt (Fritzen).
A. pubescens Kirb. *civicum* Germ. n. s. Putzig (Stf.).
A. simile Kirb. n. h. auf Birken, Loppehnen (Eld.), Putzig (Stf.), Lyck (Sanio).
A. alcyoneum Germ. s. Neustadt (Fritzen).
A. seniculus Kirb. n. s. ebenso; Dz. Nehnung (Helm).
A. elongatum Germ. s. s. Lyck (Sanio).

- A. rufirostre Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.).
 A. viciae Pk. h. Lyck (Sanio).
 A. dissimile Germ. s. Oliva (Czw.).
 A. varipes Germ. s. Loppehnen (Eld.).
 A. apricans Hbst. fagi Kirb. g. überall auf Trifolium.
 A. ononidis Gyll. s. Loppehnen (Eld.).
 A. assimile Kirb. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
 A. trifolii L. aestivum Germ. h. Dz. (Dommer, Frantzius), die var. *ruficrus* Germ. seltener (Helm).
 A. flavipes Fabr. g. wie apricans.
 A. nigritarse Kirb. s. s. Lyck (Sanio).
 A. ebeninum Kirb. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
 A. sulcifrons Hbst. s. Dz. (Dommer, Frantzius).
 A. punctigerum Pk. s. ebenso.
 A. virens Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
 A. validirostre Gyll. s. ebenso, Lyck (Sanio).
 A. Gyllenhali Kirb. s. Kbg. (Sieb.), Lyck (Sanio).
 A. ervi Kirb. n. h. Kbg. (Ltz.).
 A. filirostre Kirb. s. Dz. (Helm), Kbg. (Ltz., Stnr.).
 A. minimum Hbst. n. s. Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.), Dammhof (Stnr.).
 A. pisi Fabr. n. s. Loppehnen (Eld.), Kbg. (Ltz.).
 A. aethiops Hbst. h. ebenso, Dz. (Dommer).
 A. sorbi Hbst. n. s. wie pisi.
 A. angustatum Kirb. loti Kirb. n. h. Waldau (Ltz.).
 A. columbinum Germ. s. Wehlau (Sauter), Dz. (Helm).
 A. Spencei Kirb. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.).
 A. vorax Hbst. h. Kbg. (Ltz.).
 A. pavidum Germ. s. auf Coronilla varia, Dz. (Czw.).
 A. minutum Germ. n. s. Dz. (Dommer), Lyck (Sanio), auf Rumex obtusifolius.
 A. frumentarium L. haematodes Kirb. cruentatum Watton h. Kbg. (Ltz.).
 A. rubens Steph. s. Löwenhagen (Ltz.), Lyck (Sanio).
 A. sanguineum Deg. n. s. Kbg. (Ltz.).
 A. brevirostre Hbst. s. Loppehnen (Eld.), F. F. (Stnr.).
 A. aciculare Germ. s. Sieb.

- A. violaceum Kirb. n. s. Kbg. (Ltz.).
 A. hydrolapathi Kirb. bei Lyck h. (Sanio).
 A. marchicum Hbst. n. s. Kbg. (Ltz.).
 A. humile Germ. s. h. überall.
 A. simum Germ. s. Kbg. Hlgl. (Stnr.).
 Anm. A. difforme Ahr. von Eld. (Loppehnen) angegeben, aber das St. seiner Sammlung war varipes ♀ (Ltz.).
Auletes basilaris Gyll. s. s. Neustadt (Fritzen), Strübing (Berl. Ent. Z. IV. p. 323).
Rhynchites betuleti Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
 R. populi L. h. ebenso.
 R. auratus Scop. s. auf Obstblüthen, Margen (Ltz.).
 R. Bacchus L. s. Blaustein (Ltz.).
 R. aequatus L. n. s. auf blühenden Ebereschen, Arnau, Liep (Ltz.).
 R. alliariae Pk. n. s. Loppehnen (Eld., Ltz.), Neuhausen (Stnr.).
 R. germanicus Hbst. minutus Gyll. h. Dz. (Frantzius), Kbg. (Ltz.).
 R. aeneovirens Marsh. s. Wargen (Sauter).
 Dz. (Helm).
 R. cupreus L. n. s. wie aequatus.
 R. nanus Pk. n. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).
 R. megacephalus Germ. s. in den Strandgegenden (Ltz.), Dammhof (Stnr.).
 R. pubescens Fabr. s. Elbing (Kug.), Dz. (Sieb.).
 R. ophthalmicus Steph. s. auf jungem Hasellaube, Neustadt (Fritzen).
 R. coeruleocephalus Schh. s. Kug., Sieb.
 R. betulae L. h. auf jungen Birken, überall.
Attelabus curculionoides L. n. h. Lyck (Sanio), Preil (Ltz.).
Apoderus coryli L. avellanae L. h. auf Haseln, Bludauer Forst (Ltz.).
 A. intermedius Hellw. zuw. h. auf Cormarum palustre von Moorwiesen, Margen, Dammhof (Pfeil, Ltz.), Neuhausen (Stnr.).
Diodyrhynchus austriacus Oliv. s. Hlgl. (Stnr), Blaustein, Metgethen, von Abies geklopft (Ltz.), Schromb. (Czw.).
Rhinomacer attelaboides Fabr. n. h. Bludauer Forst, auf Nadelholz (Ltz., Stnr.).
- Anthribidae.**
- Platyrrhinus latirostris* Fabr. n. h. an Pinus-stubben, Elbing (Sieb.), Putzig (Stf.), Neustadt (Helm), Fchstein (Ltz.).

Tropideres albirostris Hbst. s. Kug., Sieb.
T. Edgreni Schh. s. s. auf einem Gras-
 platze neben Rothbuchen und Espen, Neustadt
 (Fritzen).

T. sepicola Fabr. s. Vogelsang bei Elbing
 (Eld.), Putzig (Stf.), Alexwangen (Ltz.).

T. niveirostris Fabr. s. in Eichenholz,
 Osterode (Kug.), Putzig (Stf.), Wargen (Sauter),
 Löwenhagen (Ltz.).

T. cinctus Pk. zuw. h. bei Osterode (Kug.),
 einmal bei Tilsit (Stf.).

Anthribus albinus L. n. h. Kgb. (Ltz.), Eichen-
 krug (Stnr.).

A. (Brachytarsus) scabrosus Fabr. s. auf
Rhamnus cathartica, Putzig (Stf.).

A. varius Fabr. s. h. auf *Abies*, Schwarzort
 in den kugelförmigen ♀ von Schildläusen, be-
 sonders *Lecanium racemosum* Ratz. (Künow).

Choragus Sheppardi Kirb. s. auf Garten-
 spiräen, Blaustein (Ltz.), Bludauer Forst (Dossow),
 Glettkau (Czw.).

Bruchidae.

Spermophagus cardui Boh. n. s. Ggbg. (Kr.),
 bei Lyck vor wenigen Jahren g. (Sanio).

Bruchus marginalis Fabr. s. in den Samen
 von *Oxytropis pilosa* Graudenz (Körnicke).

B. olivaceus Germ. n. s. Karbojin bei Lyck
 (Sanio).

B. pisi L. s. Lyck (Sanio).

B. rufimanus Boh. bei Kbg. jetzt kaum
 bemerkt (Stnr.), bei Lyck auf *Vicia Faba* n. s.,
 auch überwinternd im Moose (Sanio), Neustadt
 (Fritzen).

B. luteicornis Illig. n. h. Ggbg. (Kr.),
 Lyck (Sanio), Aweiden (Stnr.).

B. granarius L. g. in Leguminosen, bes.
 in *Vicia sepium*.

B. loti Pk. n. h. auf *Lathyrus pratensis*,
 Waldau (Körnicke), Lyck (Sanio), Schromb.
 (Czw.).

B. cisti Pk. ater Marsh. n. s. Allenstein
 (Kug.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).

B. bipunctatus Sulz. Kbg. (Nanke), seit-
 dem nicht wieder gefunden.

Scolytidae.

Hylastes ater Pk. s. h. auf Kiefern.

H. cunicularius Er. n. s. Dammhof (Ltz.),
 Wilkie (Eld.).

H. attenuatus Er. s. unter *Pinusrinde*, Neu-
 stadt (Fritzen).

H. angustatus Hbst. n. s. wie cunicul.

H. opacus Er. n. s. Dz. (Ltz.).

H. palliatus Gyll. g., wie ater.

H. trifolii Müll. in der Juraer Forst bei
 Tilsit n. s. (Andersch).

Hylurgus ligniperda Fabr. n. h. an gefäl-
 ten alten Kiefern, Putzig (Stf.).

H. piniperda L. g. in Kiefernstubben.

H. minor Hartig. s. Ggbg. (Kr.).

Dendroctonus micans Kug. s. Mohrungen
 (Eld.).

Carphoborus pilosus Ratz. s. Braunsbg.; unter
 Fichtenrinde (Schindowsky).

Phloeophthorus rhododactylus Marsh. n. h.
 Palmburg (Ltz.), Wilkie (Pfeil), F. F. (Stnr.).

Hylesinus crenatus Fabr. s. an den Wurzeln
 alter Eschen, Osterode (Kug.), Kbg. (Ltz.).

H. oleiperda Fabr. s. s. Warnicker Park
 (Eld.), Kbg. Plantage (Stnr.), sicherlich auf
 Eschen, welche botanisch mit *Olea* verwandt
 sind; früher auch bei Stettin und Hamburg ge-
 funden (Berl. E. Z. XI. 429, XVIII. 128).

H. fraxini Fabr. varius Fabr. g., eine Pest
 der Eschen.

H. vittatus Fabr. s. Kbg. (Andersch).

Polygraphus pubescens Fabr. n. h. Juraer
 Forst (Andersch), Blaustein (Ltz.).

Scolytus (Eccoptogaster) Ratzeburgii Janson.
destructor Ratz. s. Kbg. (Ltz.).

S. destructor Oliv. Eccopt. scolytus
 Fabr. n. h. ebenso, in Birken u. Ulmen (Andersch).

S. multistriatus Marsh. s. in Ulmen, Kbg.
 (Andersch, Ltz.).

S. pruni Ratz. piri Ratz. s. Westpr. (An-
 dersch).

S. intricatus Ratz. pygmaeus Gyll. n. h.
 ebenso.

S. rugulosus Ratz. s. in Pflaumenbäumen,
 Braunsbg. (Dossow), Glettkau (Czw.), Neuhausen
 (Stnr.).

S. carpini Ratz. n. h. in einem *Carpinus*-
 Stamme auf dem Tragheim in Kbg. (Eld., Ltz.).

Crypturgus pusillus Gyll. n. s. Wilkie (Eld.,
 Ltz.), Vierbrkr., F. F. (Stnr.).

C. cinereus Hbst. n. s. ebenso.

Cryphalus abietis Ratz. n. s. Zinten, in der Damerau (Ltz.).

C. tiliae Pz. n. s. Fchstein. aus Linden zweigen (Ltz.).

C. fagi Nördl. s. aus Rothbuchen bei Ludwigsort (Dossow).

C. asperatus Gyll. *binodulus* Ratz. s. im Greibenschen Revier in Espenrinde (Dossow), F. F. (Stnr.).

Pityophthorus Lichtensteinii Ratz. n. h. Löwenhagen (Ltz.), Masuren (Mühl.), Gauleden in absterbenden Rothtannenästen (Dossow).

P. pityographus Ratz. s. nach dem Zeugniss Ratzeb. Forstins. 182 (Andersch).

Tomicus (Bostrychus) bispinus Dft. s. Braunsberg (Sauter).

T. bicolor Hbst. s. Schwarzort, Dammhof (Stnr.).

T. stenographus Dft. n. s. in Kiefernrinde, Braunsbg., Lyck, Wilkie (Andersch).

T. typographus L. h. in allen Nadelholzwäldern.

T. acuminatus Gyll. s. s. Eichholz bei Mehlsack (Andersch).

T. rectangulus Eichh. *duplicatus* Sahlb. s. s. Kbg. Holzwiesen bei der Plantage (Czw.).

T. laricis Fabr. h. in Nadelholz.

T. suturalis Gyll. *nigritus* Gyll. s. wie acuminatus; Kbg. (Czw.), Metgethen (Stnr.).

T. curvidens Germ. h. Kbg. (Ltz.), Braunsberg, Tilsit, Rastenbg. (Andersch).

T. chalcographus L. h. Brandenbrger Haide (Ltz.), Osterode (Kug.).

T. bidens Fabr. h. ebenso.

T. autographus Ratz. h. in allen Nadelholzwäldern (Andersch).

T. villosus Fabr. s. s. Sieb. teste Andersch.

T. dispar Fabr. n. h. Osterode an alten Buchen (Kug.), Dz. aus Birkenholz (Dommer), unter Apfelrinde Wernsdorf (Kuwert).

T. cryptographus Ratz. s. unter Pappelrinde in der F. F. ♂ u. ♀ (Dossow, Czw., Stnr.).

T. Saxeseni Ratz. s. unter Pappelrinde, Kbg. (Pfeil, Dossow).

T. dryographus Ratz. s. Eichholz bei Mehlsack (Andersch).

T. monographus Fabr. n. s. an den Eichen bei Moosbude (Ltz.).

Xyloterus domesticus L. s. unter Tannenrinde (Andersch).

X. lineatus n. s. ebenso, Braunsbg. (Sieb.), Zinten, Samitten (Ltz.).

Platypus cylindrus Fabr. s. s. Kbg., in Eichenholz (Kug., Andersch).

Cerambycidae.

Ergates faber L. s. in Kiefernwäldern, Elbing, Rastenbg., Thorn (Sieb.), Neidenburg (Ltz.).

Tragosoma depsarium L. s. s. Elbing (Sieb.).

Prionus coriarius L. n. s. in Kiefernwäldern, Rauschen (Ltz.).

Cerambyx (Hammaticherus) heros Scop. s. s. Kug., Sieb.

C. cerdo Scop. s. Elbing (Ltz.).

Purpuricenus Köhleri L. s. s. 1 St. in der Sammlung des Museums, Thorn.

Rosalia alpina L. s. s. einmal bei der Allensteinschen Glashütte (Kug.), bisher nicht wieder gefunden.

Aromia moschata L. n. s. an Weiden Kbg. (Ltz.).

Callidium clavipes Fabr. s. Dz. (Schmidt), Elbing (Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

C. femoratum L. s. Labiau (Nanke), Liep auf Sorbus aucup. (Ltz.), Dz. Grebbiner Wald (Dommer, Frantzius).

C. violaceum L. n. s. auf Spiräen, Arnau (Ltz.).

C. dilatum Pk. in dem Ziegeleigebäude bei Wernsdorf h. (Kuwert), sonst n. h. an Kiefernholz, Zinten (Ltz.).

C. sanguineum L. s. s. Tilsit (Nanke), Mehlsack (Sieb.).

C. alni L. einmal s. h. an einem alten Zaune, der von Ellernstrauch geflochten war (Kug.), bisher aber nicht wieder gefunden.

C. variabile L. mit seinen Varietäten n. s. wie *violaceum*.

C. undatum L. s. s. Kbg., Elbing (Andersch), Wehlau (Ltz.).

Hylotrypes bajulus L. g. an Getreidespeichern.

Tetropium (Criomorphus) luridum L. aulicum Fabr. *fulcratum* Fabr. h. unter Tannenrinde, Zinten (Ltz.), Braunsbg., Kbg. (Sieb.).

T. fuscum Fabr. n. h. bei Schaaken auf Weiden (Eld.), F. F. (Czw., Stnr.).

Notorhina muricata Schh. s. s. einmal unter Kiefernrinde bei Osterode (Kug.), 1 St. auf

einer Espe neben dem Pfarrhause von Schwarzort, Juli 1864 (Ltz.); Neustadt (Fritzen) an alten Pinusstämmen, Juli — August.

Spondylis buprestoides L. h. in Kiefernwäldern, Kahlberg (Ltz.).

Asemum striatum L. n. h. Schwarzort (Ltz.); die var. agreste Fabr. bei Osterode (Kug.), Neustadt (Fritzen).

Criocephalus rusticus L. n. s. Braunsbg., Pr. Holland, Rastenbg. (Sieb.), Schwarzort (Ltz.).

C. ferus Kraatz. *epibata* Schiödt. s. Kbg. (Guthzeit), Dz. (Dommer), Neustadt (Fritzen) in Pinusstubben.

Clytus detritus L. n. h. an den Moosbuder Eichen (Ltz.).

C. arcuatus L. n. s. Löwenhagen (Ltz.).

C. rusticus L. *hafniensis* Fabr. zuw. h. Osterode im Pappelgehölz (Kug.), Heilsberg, Tilsit (Sieb.), Gelguhnen (Ltz.).

C. arietis L. n. h. Rauschen (Ltz.).

C. antilope Illig. s. s. wird von Kug. im Manuserc angegeben, ohne Fundort, ist aber bis jetzt nicht wieder gefunden.

C. Herbstii Brahm. *verbasci* Fabr. s. Elbing, Lyk (Sieb.). Blaustein (Ltz.).

C. verbasci L. *ornatus* Hbst. s. s. Dz. (Dommer).

C. massiliensis L. s. s. in Ostpr. von Stf. gefangen (Dommer).

C. plebejus Fabr. s. Osterode (Kug.), so dann nur an einer ganz beschränkten Stelle im Wiesengrunde bei Craam auf *Spiraea ulm.* und auf Doldengewächsen mehrfach gefunden (Ltz.).

C. mysticus L. *rusticus* Scop. *hieroglyphicus* Hbst. n. h. Margin (Ltz.), Oliva (Czw.), F. F. (Stnr.).

Obrium ferrugineum Fabr. s. s. Kug. Sieb.

O. brunneum Fabr. s. s. Dz. am Seestrande (Dommer).

Gracilia pygmaea Fabr. s. s. unter den Duplis der Eldittschen Sammlung fand ich 2 St. bezeichnet: Kapkeim (Frisching) von Patze gefunden 1865 (Ltz.).

Molorchus minor L. *dimidiatus* Fabr. n. s. auf Gartenspiräen Margin (Ltz.).

M. umbellatarum L. s. Elbing (Sieb.), Neubausen (Stnr.).

Necydalis major L. *salicis* Muls. s. an Weiden, Ludwigsort (Ltz.), Kbg. (Guthzeit), Dz. (Brischke).

Lamia textor L. n. s. Rauschen, Cranz (Ltz.), Memel (Stnr.).

Monochamus sartor Fabr. s. Kbg. (Ltz.).

M. sutor L. n. h. Schwarzort (Ltz.).

M. galloprovincialis Oliv. [s. s. Danzig, Braunsbg. (Dommer).]

Acanthoderes varius Fabr. s. an Buchen, Osterode (Kug.), Cadienen (Stf.), Norkitten (Ltz.).

Astynomus aedilis L. h. am Kiefernkleinholz, Mai Ludwigsort (Ltz.).

A. atomarius Fabr. s. s. Johannisburger Haide (Kug.), aber bisher nicht wieder gefunden.

A. griseus Fabr. n. h. Kbg., Braunsbg., Elbing (Stf., Ltz.).

Liopus nebulosus L. h. in Buchenwäldern (Kug.), auf Linden (Ltz.).

L. punctulatus Pk. s. s. F. F. an einem Pappelstamme 3 St. (Czw., Stnr.) Juni 1872; aus faulen Lindenästen gezogen, Neustadt (Fritzen).

L. fennicus Pk. s. Dz. (Frantzius, Dommer), Neustadt, Putzig (Stf.), Löwenhagen, Arnau, auf Linden (Ltz.).

Exocentrus balteatus Fabr. n. h. Arnau unter Linden (Ltz.), Dz. (Helm.).

Pogonocherus hispidus Schrk. *pilosus* Fabr. s. Sandgruben bei Ludwigsort (Sauter, Ltz.), Elbing (Sieb.).

P. fasciulatus Deg. n. s. Elbing, Pr. Holland (Sieb.), Löwenhagen (Ltz.).

P. ovalis Gmel. s. Kbg. (Ltz.).

Mesosa carculionoides L. s. s. Thorn (Kug.), Elbing (Sieb.).

M. nebulosa Fabr. s. s. Osterode (Kug.), bei Schöneberg (Dommer).

Anaesthetis testacea Fabr. s. s. Osterode (Kug.), Dz. Nehrung an Weidengeflecht (Fritzen).

Agapanthia cardui Fabr. s. Kug. Sieb.

A. angusticollis Gyll. n. s. Grebbiner Wald auf *Urtica dioica* (Dommer), Kleinhäide (Eld.), Deimewiesen (Ltz.), Schromb., Ktzn. (Czw.).

Saperda carcharias L. n. s. an Pappelstämmen, Kbg. (Ltz.).

S. phoca Fröl. s. s. Wehlau (Sauter); 1 St. auf *Spiraea ulm.* Warnicken (Ltz.).

S. scalaris L. n. h. an Eichenholz, Braunsberg (Sieb.), Zinten (Ltz.).

S. Seydliei Fröl. s. Elbing, Braunsbg. (Sieb.), F. F. (Czw., Stnr.).

- S. tremulae* Fabr. s. Wehlau (Andersch).
S. populnea L. n. s. an Espen, Kbg. (Ltz.).
Menesia bipunctata Zubk. s. s. Kbg. (Kug.).
Horst am Pregel (Kuwert).
Tetrops praestata L. h. auf Sorbus, Liep (Ltz.).
Oberea oculata L. n. h. an Espenstrauch Schwarzort (Ltz.), auf Weiden Dz. (Czw.), Kbg. (Guthzeit).
O. pupillata Gyll. s. s. Heilsberg (Sieb.).
O. erythrocephala s. s. Litthauen (Kug.), Masuren (Sieb.).
O. linearis L. s. s. Masuren (Mühl.), n. s. Hlgbl. (Stnr.), Dz. auf Haseln (Czw.).
Phytoecia affinis Harrer. s. Elbing (Sieb.).
P. virgula Charp. punctum Muls s. Heilsberg auf einem Brachacker (Ltz.), Oliva (Czw.).
P. lineola Fabr. s. ebenso; Dz. auf Viburnum-Blüthen (Dommer).
P. cylindrica L. s. Elbing (Ltz.).
P. nigricornis Fabr. s. Jäschkenthal (Czw.).
P. virescens Fabr. s. s. aus Litthauen (Kug.), neuerlich nicht wieder gefunden.
P. molybdæna Dalm. s. s. in der Eldittschen Sammlung 1 St. Kbg.
Rhamnusium salicis Fabr. n. h. auf Garten-spiräen, Arnau, Blaustein (Ltz.).
Rhagium mordax Fabr. n. h. am Eichenholze, Lauth (Ltz.).
R. inquisitor Fabr. n. s. an Abiesstubben, Zinten (Ltz.).
R. indagator Fabr. h. ebenso.
R. bifasciatum Fabr. von Kug. angemerkt ohne Angabe des Fundorts, später nicht wieder gefunden; meistentheils ein Gebirgskäfer.
Toxotus cursor L. noctis L. n. s. im Warnicker Park auf Spiraea ulm. Juli (Ltz.), Dz. am Carlsberge (Schmidt), Vierbrkr. (Stnr.).
T. meridianus L. n. s. ebenso, Grebbiner Wald (Sieb.). Die schöne var. c. (Thoms. VIII. 54) in der Eldittschen Sammlung.
Pachytia lamed L. spadicea Pk. s. s. Braunsberg (Sieb.), Warnicken (Ltz.).
P. 4-maculata L. n. s. auf Dolden und Spiräen, Georgenswalde (Ltz.).
P. interrogationis L. s. s. bei Kbg. 1788 in Kiefernwäldern auf Farnkraut (Polypodium, Pteris) gefunden (Kug.), später jedoch nicht wieder.
P. strigilata Fabr. s. s. (Sieb.).
- P. marginata* Fabr. aus Kugel. Beschreibung seiner Leptura spreta im Manusc. vermuthet Kraatz Berl. Ent. Ztg. XII. 303, dass er eine Var. der marginata vor Augen gehabt und dieselbe als strigilata angeführt habe.
P. collaris L. h. auf Spiräen, Kbg. (Ltz.).
P. virginea L. n. h. ebenso, Vierbrkr. (Stnr.).
P. sexmaculata L. s. s. 1 St. Masuren auf einer Dolde (Mühl.).
P. octomaculata Fabr. n. s. Warnicken auf Cirsium oleraceum (Ltz.), Carthaus im Radaunethal (Helm.).
P. septemsignata Küst. s. s. 1 St. an Kiefernklesterholz bei Ludwigsort (Pfeil).
Strangalia 4-fasciata h. auf Spiräen, Kbg. (Ltz.).
S. revestita L. s. Dz., Elbing (Sieb.).
S. pubescens Fabr. s. s. auf Wiesen an Scabiosa succisa und Carduus nutans gefunden, 2 St. Osterode (Kug.), seitdem nicht mehr.
S. atra Fabr. n. h. auf Dolden, Gelguhnen (Ltz.).
S. armata Hbst. calcarata Fabr. n. h. auf Spir. ulmar. Warnicken auf dem Wilhelmshorster Gestell, Gelguhnen (Ltz.).
S. annularis Fabr. s. s. Osterode, in Kiefernwäldern auf Orchis bifolia und Stachys sylvatica; Kbg. (Kug.), Masuren (Mühl.).
S. attenuata L. h. auf Gartenspiräen, Wernsdorf (Ltz.).
S. nigra L. h. Arnau (Ltz.).
S. bifasciata Müll. s. Kug., Sieb.
S. melanura L. h. Löwenhagen (Ltz.).
Leptura sanguinosa Gyll. s. s. Sieb.
L. virens L. s. s. Kug., Sieb.
L. rubra L. rubrotestacea Illig. h. auf Spiräen, Warnicken (Ltz.).
L. variicornis Dalm. s. s. Braunsbg. (Sieb.), Zinten (Ltz.).
L. scutellata Fabr. s. s. Allenstein (Kug., Sieb.).
L. tomentosa Fabr. s. s. Dz. u. Osterode einmal im Garten auf Schirmblumen (Kug., Sieb.).
L. cincta Fabr. s. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).
L. sanguinolenta L. n. h. Schwarzort (Ltz.).
L. maculicornis Deg. g
L. livida Fabr. ebenso.

L. sexguttata Fabr. s. Corjeiten (Ltz.).

L. rufipes Schall. s. Masuren (Mühl.).

Grammoptera 4-guttata Fabr. s. nur die schwarze Var. *femorata* Fabr. Neuhausen (Ltz.), Pr. Stargard (Schmidt).

G. laevis Fabr. h. bes. auf *Phyteuma spicatum*, Fchstein (Ltz.).

G. analis Pz. s. am Waldrande beim Gainerberge geschöpft, Neustadt (Fritzen).

G. ruficornis Fabr. s. auf *Spir. ulm.* im Prangenauer Thal (Dommer), Zoppot (Ltz.).

G. ustulata Schall. *praeusta* Fabr. s. aus Eichenzweigen erzogen, April, Neustadt (Fritzen).

Chrysomelidae.

Orsodacna cerasi Fabr. nebst Var. n. s. bes. auf *Lonicera xylosteum*, Kellermühle (Ltz.), Braunsbg. (Sieb.).

Donacia crassipes Fabr. h. auf Nuphar-Blättern sitzend, Rauschener Teich, Dammhof (Ltz.).

D. cineta Germ. n. s. auf den Blättern von Wasserpflanzen Kbg. (Ltz.).

D. dentata Hoppe n. s. ebenso.

D. sparganii Ahr. s. Dz. (Czw.).

D. dentipes Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).

D. lemnae Fabr. n. s. Dammhof (Ltz.).

D. sagittariae Fabr. h. ebenso.

D. obscura Gyll. n. s. ebenso, an Schilf auf der Dz. Nehrung (Dommer), Lyck (Sanio).

D. thalassina Germ. s. Pregelufer bei Holstein (Czw.).

D. impressa Pk. *brevicornis* Ahr. h. Neuhäuser, Dammhof (Ltz.); die var. *platysterna* Thoms. (Czw. Dt. Ent. Zt. XXII. 204) n. h. da-selbst, Memel (Stnr.).

D. antiqua Kunze. *simplicifrons* Lac. *brevicornis* Gyll. s. Pr. Friedland (Föllmer teste Czw.).

D. sericea L. *violacea* Gyll. n. h. auf Schilf, Rosenau (Ltz.).

D. nigra Fabr. s. Cranz (Ltz.), Pregelmündung (Stnr.).

D. discolor Hoppe n. s. auf der Moorwiese bei Dammhof (Ltz.), Lyck (Sanio), Osterode auf Potamogeton natans (Kug.).

D. affinis Kunze n. s. Kbg. auf den Pregel-

wiesen, ebenso die var. *rustica* Kunze (Czw. Dt. Ent. Zt. XXII. 205), vielleicht eigene Art, Neuhausen (Stnr.), Neustadt (Fritzen) auf *Caltha palustris*.

D. semicuprea Pz. *simplex* Fabr. h. auf Schilf überall.

D. Menyanthidis Gyll. n. s. auf der Nährpflanze, Dammhof in den Blattwinkeln von *Phragmites*, Juditten (Ltz.), bei Lyck h. (Sanio).

D. linearis Hoppe n. h. auf Carex-Arten, Kbg. (Ltz.), Dammhof (Czw.).

D. typhae Brahm n. s. Putzig (Stf.), Lyck (Sanio), F. F. (Czw., Stnr.).

D. fennica Pk. s. Dammhof; die var. *Malinovskii* Ahr. häufiger, beide unter Wasser auf *Sparganium natans* (Czw.), Grebbiner Wald (Dommer).

D. hydrocharidis Fabr. n. s. Leesen, auf Schilf (Dommer) auf *Typha latif.*, Lyck (Sanio), Dammhof (Ltz.).

D. tomentosa Ahr. s. auf *Butomus umbellatus*, im Bach von Rosenau (Ltz.).

Haemonia zosterae Fabr. *Sahlbergii* Lac. *Curtisii* Thoms. n. s. zuerst bei Putzig (Bogeng), dann Rauschener Teich an *Myriophyllum* (Ltz.), Dz. in einem salzhaltigen Teiche an der Küste auf *Potamogeton marinus* in Menge (Helm).

H. equiseti Fabr. s. s. aus dem Dammtteich (Czw.).

Zeugophora subspinosa Fabr. h. auf Pappeln (Ltz.).

Z. frontalis Suffr. s. einmal im Kbg. botan. Garten (Eld.), Neustadt (Fritzen).

Z. flavidollis Marsh. h. wie subspinosa.

Z. Turneri Power. *rufotestacea* Kraatz. s. Dz. Westerplatte (Helm), Ggbg. (Kr.), Hlgbl., Preil (Stnr.).

Lema rugicollis Suffr. n. h. Kbg. (Ltz.).

L. cyanella Fabr. h. überall auf Wiesen.

L. Erichsonii Suffr. s. s. Lyck (Sanio), Dammhof (Stnr.).

L. flavipes Suffr. s. s. 1 St. im Königsthal bei Dz. gefangen (Helm).

L. melanopa L. h. wie cyanella.

L. cyanipennis Dst. s. Neustadt (Fritzen).

Crioceris merdigera L. n. s. an *Lilium candidum* (Ltz.).

C. brunnea Fabr. n. h. Liep (Ltz.).

C. 14-punctata Scop. s. Dz., Allenstein (Kug.), auf Spargel, Graudenz (Schmidt).

- C. 12-punctata* L. var. *dodecastigma*
Suff. s. s. Osterode (Kug.), Pelplin (Fritzen).
- C. asparagi* L. h. auf Spargelkraut (Ltz.).
Clytbra tridentata L. s. auf Weiden und Birken, Dz. (Sieb.), Rauschen (Ltz.).
- C. longimana* L. h. bei Loppehnen auf *Trifolium* (Eld., Ltz.).
- C. longipes* Fabr. s. s. auf Birken, Osterode (Kug.), ist bisher nicht wieder gefunden.
- C. 4-punctata* L. n. s. auf Weidengesträuch Kbg. (Ltz.); die *4-signata* Märk. seltener, Wilkie unter Ameisen (Eld.).
- C. laeviuscula* Ratz. s. Sieb.
- C. aurita* L. s. auf *Salix caprea*, auf Birken, Osterode (Kug.), Dz. (Czw.).
- C. affinis* Hellw. s. Kbg., Elbing, Dz., Putzig (Stf.).
- C. flavicollis* Charp. s. Neuhausen (Stnr.).
- C. cyanea* Fabr. n. h. Fuchshöfen, Blaustein, Gelguhnen (Ltz.), Lyck (Sanio), Kellermühle (Stnr.).
- C. bucephala* Schall. s. s. auf *Betula nana*, Osterode (Kug., Hellw.), bisher aber nicht wieder gefunden.
- C. 4-maculata* L. h. auf *Peucedanum*, Neuhäuser, Littausdorf (Ltz.), Lyck (Sanio).
- C. scopolina* Fabr. s. Dz. (Dommer).
Anm. *C. taxicornis* Fabr. wird zwar von Dommer angegeben, doch von den 3 St. seiner Sammlung sind 2 nichtpr., das dritte ist *tridentata* (Czw.).
- Cryptococephalus laetus* Fabr. s. Elbing (Sieb.), Hlgbl. (Seydler), Lyck (Sanio).
- C. coryli* L. n. h. Margen (Ltz.).
- C. cordiger* L. s. Sieb.
- C. variegatus* Fabr. s. Putzig (Stf.).
- C. variabilis* Schneid. n. s. auf Birken, Rauschen (Ltz.).
- C. sexpunctatus* L. s. ebenso.
- C. violaceus* Laich. n. s. auf allerlei Synthesisten, ebenso.
- C. aureolus* Suffr. h. ebenso, Warnicken (Ltz.).
- C. sericeus* L. I St. Warnicken (Ltz.), wahrscheinlich mit dem vorigen zusammengehörig, was mir die sehr zahlreichen Stücke der Sufrianschen Sammlung in Halle zu beweisen scheinen: namentlich ist der Unterschied der Biegung der Halsschildseitenränder hinfällig.
- C. hypochoeridis* L. h. auf *Achyrophorus maculatus*, Warnicken (Ltz.), Lyck (Sanio).
- C. nitens* L. n. h. Rauschen (Ltz.), Dz. (Dommer).
- C. nitidulus* Gyll. s. Heilsberg (Sieb.), Lyck (Sanio), Hlgbl. (Stnr.).
- C. 4-pustulatus* Gyll. s. Lyck (Sanio).
- F. Moraei* L. h. auf *Hypericum perforatum*, Rauschen (Ltz.).
- C. flavipes* Fabr. n. s. auf *Corylus ebenso*, Dz. (Dommer).
- C. 10-punctatus* L. mit var. *bothnicus* L. s. Horst bei Fchstein (Stnr.), aber h. im Süden der Prov., namentlich bei Lyck auf Weiden (Sanio).
- C. frenatus* Laich. mit *flavescens* Schneid. h. ebenso, und bei Dz. (Sieb.), bei Kbg. nicht bemerkt.
- C. punctiger* Pk. s. Warnicken (Ltz.), Loppehnen (Eld.).
- C. janthinus* Germ. s. auf Weiden, Ortelsburg (Mühl.).
- C. fulcratus* Germ. s. Warnicken (Ltz.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen) auf *Viburnum opulus*.
- C. flavidabris* Fabr. h. Rauschen (Ltz.).
- C. marginatus* Fabr. s. s. von Kugel. angegeben ohne Fundort; bisher nicht wieder gefunden.
- C. pallifrons* Gyll. n. h. Ggbg. (Kr.), Lyck (Sanio).
- C. bipunctatus* L. *bipustulatus* Fabr. *lineola* Fabr. n. h. auf sonnigen Hügeln auf niedrigen Haseln (Kug.), Rauschen, Fchstein (Ltz.).
- C. bistripunctatus* Germ. Tilsit (Stf.), Hlgbl. (Seydler).
- C. vittatus* Fabr. n. h. Warnicken, Gelguhnen (Ltz.).
- C. bilineatus* L. s. Kug., Sieb.
- C. vittula* Suffr. h. bei Dz. auf *Thymus serp.* (Stf.).
- C. minutus* Fabr. g. überall, ebenso.
- C. pusillus* Fabr. s. auf Ellern u. Haseln (Kug.); Loppehnen, Lauth (Eld.), Putzig (Stf.), Preil (Ltz.).
- C. gracilis* Fabr. n. h. auf *Melampyrum pratense*, Galtgarben (Eld.), Georgenswalde am Waldhäuschen (Ltz.), Neuhausen, Dammhof (Stnr.).

C. Hybneri Fabr. n. s. Conitz (Sieb), Rauschen (Ltz.), Metgethen (Stnr.).

C. labiatus L. h. mit var. *digrammus* Suffr. Rauschen (Ltz.), Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).

C. Wasastjerna Gyll. s. auf nassen Wiesen, Lyck (Sanio), F. F. (Czw.).

C. geminus Gyll. n. s. Lyck (Sanio).

C. querceti Suffr. s. Dz. (Czw.).

C. frontalis Marsh. s. Corjeiten (Ltz.).

C. pini L. *abietis* Suffr. n. h. Rauschen (Ltz.).

Pachybrachis hieroglyphicus Leach. *histrio* Fabr. h. bei Loppehnen auf Trifolium (Eld., Ltz.).

Pachnephorus tesselatus Dft. s. s. Lyck (Sanio), Memel (Stnr.).

P. arenarius Fabr. bei Osterode in sandigen Gegenden g. (Kug.), auch sonst n. s. Rauschen (Ltz.).

Eumolpus obscurus L. n. s. auf Epilobium angustif. Löwenhagen (Ltz.).

E. vitis Fabr. s. im Frühjahr auf Buchenstrauch, Neustadt (Fritzen).

Timarcha coriaria Laich. s. s. Arnstein bei Zinten (Schiefferdecker).

Chrysomela staphylea L. n. s. auf Grasplätzen Kbg. (Ltz.).

C. varians Schall. h. auf Hypericum (Ltz.).

C. gottingensis L. n. s. wie staphylea.

C. haemoptera L. n. h. Rauschen (Ltz.).

C. gypsophilae Küst. s. s. Dz. (Stf.).

C. sanguinolenta L. n. s. Rauschen, Kahlberg (Ltz.).

C. marginalis Dft. n. h. Putzig (Stf.), unter Steinen auf Sandboden (Ltz.), Neuhäuser (Stnr.).

C. limbata Fabr. n. s. in Sandgräben, Rauschen (Stnr.).

C. carnifex Fabr. n. s. Dz. (Ltz.).

C. marginata L. h. in den Strandgegenden unter Steinen (Eld., Ltz.); auf Anchusa offic. und Achillea millef. Lyck (Sanio).

C. analis L. Schach Fabr. n. s. Rauschen (Ltz.), Dz. (Helm).

C. lurida L. s. Dz. (Ltz.).

C. menthastris Suffr. n. s. Westpr. auf *Mentha silvestris*, Juli (Strübing).

C. graminis L. h. auf Tanacetum, Warnicken (Ltz.).

C. fastuosa L. g. auf Lamium album.

C. cerealis L. h. auf Thymus serp. Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen), die var. *alternans* Pz. Megerlei Fabr. h. Pillau (Ltz.); var. *violacea* Schall. mixta Suffr. h. Neustadt (Fritzen).

C. polita L. n. s. Warnicken (Ltz.), Lyck (Sanio).

C. lamina Fabr. n. h. ebenso; zuerst Oct. 1795 von Kug. auf Nesseln gefunden.

C. fucata Fabr. zuw. h. auf Hypericum perf. Lyck (Sanio), Putzig (Stf.), Ggbg. (Kr.), Dz., Westerplatte (Helm).

C. geminata Pk. s. Sieb.

Lina aenea L. g. auf Ellern.

L. collaris L. n. s. auf *Salix rosmarinifolia* Heub. (Sieb.), Lyck (Sanio), Putzig (Bogeng), Schwarzort (Ltz.); die var.? *alpina* Zett. seltener, auf dem Sarker Bruche (Sanio), Glettkau (Czw.).

L. 20-punctata Scop. n. h. Elbing, Pr. Holland (Sieb.), Hlgbl., einmal 1868 auf Weidenblättern sehr zahlreich (Stnr.), Masuren (Mühl.).

L. cuprea Fabr. n. h. Dammhof (Eld., Ltz.).

L. lapponica L. s. Margen (Ltz.), Braunsberg (Sieb.), die var. *bulgharensis* Fabr. Dz. auf *Alnus glutinosa* Neufahrwasser (Helm), Hlgbl. (Stnr.); zw. Zoppot a. Oxhöft auf Weiden, die Hauptform bes. in trocknen heißen Sommern (Fritzen).

L. populi L. h. auf Espen Kbg. (Ltz.).

L. tremulae F. h. auf *Salix purpurea*, Lyck (Sanio).

L. longicollis Suffr. s. Wernsdorf (Kuwert), Lyck (Sanio), Putzig (Stf.).

Gonioctena rufipes Deg. s. Dz. (Dommer), Putzig (Bogeng), Oliva (Czw.).

G. viminalis L. g. auf Weidenstrauch; die var. *haemorrhoidalis* Fabr. n. s. Kbg. (Ltz.).

G. triandrae Suffr. affinis Schh. n. h. Putzig (Stf.).

G. sexpunctata Pz. von Kug. angegeben ohne Fundort, auch bisher nicht wieder gefunden.

G. litura Fabr. n. s. auf Sarothamnus, Zoppot (Ltz.).

G. 5-punctata Fabr. n. h. Putzig (Stf.).

G. pallida L. n. h. Wehlau (Ltz.).

Gastrophysa polygoni L. g. überall.

G. raphani Fabr. n. s. Kbg. am Pregel-damm auf Cruciferen (Ltz.).

Colaphus sophiae Schall. n. h. ebenso.

- Plagiodesma armoraciae* L. n. s. ebenso.
- Phaedon pyritosus* Ross. *graminicola* Dft. s. unter Weidenblättern, Kbg. (Sauter).
- P. betulae* L. Suffr. *cochleariae* Gyll. n. s. Lyck (Sanio).
- P. concinnus* Steph. s. auf Triglochin maritima, Putzig (Stf.).
- P. cochleariae* Fabr. s. Osterode (Kug., von Fabr. selbst anerkannt), Neustadt (Fritzen).
- Phratora vitellinea* L. g. überall auf Weiden.
- P. vulgatissima* L. n. s. Dz., Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.); auf *Salix viminalis*, Lyck (Sanio); hieher *tibialis* Suffr. Loppehnen, Lauth, Dz., Putzig, Kbg., Lyck (Stf., Eld., Ltz.); nach Sanio nur auf *Salix purpurea*; den Uebergang bildet die von Sanio i. l. *nigripes* genannte Form (Lyck).
- P. atrovirens* Corn. s. Dammhof von jungen Espen geklopft (Czw.).
- Prasocuris (Helodes) aucta* Fabr. *egena* Gyll. n. s. in Gräben auf *Ranunculus*, Kbg. (Ltz.); Stücke mit rothgelbem Rande der Fld. habe ich hier noch nicht gefunden.
- P. marginella* L. h. auf *Caltha pal.* Kbg. (Ltz.).
- P. hannoverana* Fabr. n. s. ebenso, auch auf *Cardamine prat.* (Kug., Ltz.).
- P. phellandrii* L. h. auf der Nährpflanze, Dammhof (Ltz.).
- P. beccabungae* Illig. n. s. wie *aucta*.
- Adimonia tanaceti* L. h. auf der Nährpflanze (Ltz.).
- A. rustica* Schall. h. ebenso.
- A. fontinalis* Boh. n. h. Dz. (Czw., Helm).
- A. Dahlii* Joann. s. Neustadt (Fritzen).
- A. Oelandica* Boh. unter den Duplis der Eld. Sammlung fand ich unter *tanaceti* einige St. (Ltz.).
- A. interrupta* Oliv. s. Loppehnen (Eld.).
- A. haematidea* Germ. s. s. im Pampauer Thal auf Erlengebüsch (Dommer), Wernsdorf (Kuwert).
- A. sanguinea* Fabr. s. auf Weidengebüsch, Dz. (Ltz.).
- A. cupreae* L. g. auf Weiden.
- Galeruca viburni* Pk. h. auf Vib. *opusum*, Zinten (Ltz.).
- G. crataegi* Forst. n. h. aus einer pr. Forst (Dossow), im Danziger Lazarethgarten (Helm).
- G. nymphaea* L. *sagittariae* Gyll. g. auf Nupharblättern, Rauschener Teich (Ltz.).
- G. lineola* Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
- G. calmariensis* L. h. ebenso.
- G. tenella* L. h. ebenso.
- Agelastica alni* L. g. auf Ellern.
- A. halensis* L. n. s. Arnauer Kirchhof (Ltz.), Bohnsack, Jäschkenthal (Helm).
- Phyllobrotica 4-maculata* L. h. am Sasper See (Dommer). im Ellernbruch bei Craz (Ltz.), Baranner Forst Lyck (Sanio).
- Luperus (Calomicrus) pinicola* Dft. n. h. Tapiau, im Frischingswald auf Kiefern (Patze), Dz. (Czw., Helm), bei Neusstadt s. h. (Fritzen).
- L. rufipes* Fabr. n. h. Heilsberg, im Simserthale (Ltz.).
- L. flavipes* L. n. h. ebenso, Memel (Nanke), Neustadt (Fritzen).
- Haltica erucae* Oliv. n. s. auf Weiden und Birken, Trenker Waldhaus, Rastenbg. (Ltz.).
- H. oleracea* L. g. auf Kohlblättern.
- H. lythri* Aubé n. h. wie *erucae*.
- H. mercurialis* Fabr. auf der Nährpflanze Warnicker Park s. h. Juni (Ltz.).
- H. (Crepidodera) impressa* Fabr. h. auf feuchten Wiesen Kbg. (Ltz.).
- H. ferruginea* Scop. g. überall.
- H. rufipes* L. n. h. ebenso, Lyck (Sanio).
- H. nitidula* L. s. Ggbg. (Kr.).
- H. aurata* Marsh. *versicolor* Kutsch. h. auf Weiden, Kbg. (Ltz., Czw.).
- H. chloris* Foudr. n. h. Nogatufer bei Ktzn. (Czw.).
- H. helxines* L. s. h. auf Weiden.
- H. femorata* Gyll. wird von Zebe als pr. angeführt; ich habe sie noch nicht gefunden.
- H. nigritula* Gyll. n. s. Kbg. (Ltz.).
- H. Modeeri* h. Conitz (Sieb.), Kbg. (Ltz.).
- H. salicariae* Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).
- H. pubescens* Koch. n. s. auf sehr versch. Pflanzen, ebenso.
- H. rubi* Pk. h. ebenso.
- H. (Balanomorpha) rustica* L. h. Dz. (Dommer), auf Rumex, Neuhäuser (Ltz.).
- H. chrysanthemi* Koch. h. ebenso.
- H. obtusata* Gyll. n. h. Dz. (Dommer).
- H. (Podagraria) fuscipes* Fabr. s. auf Schilf, Dz. (Dommer).
- H. malvae* Illig. s. s. Dz. (Zebe).
- H. fuscicornis* L. s. Kug. Sieb.

- H. (Phyllotreta) armoraciae** Koch. h. auf Meerrettig, Rosenau, Wernsdorf (Ltz.).
- H. tetrastigma** Com. einmal h. auf Cardamine amara, Schromb. (Czw.).
- H. flexuosa** Illig. h. Kbg. (Ltz.).
- H. brassicae** Fabr. h. ebenso.
- H. excisa** Redt. h. ebenso; auf Flusswiesen, Lyck (Sanio).
- H. sinuata** Steph. h. ebenso.
- H. undulata** Kutsch. n. h. ebenso.
- H. nemorum** L. g. überall.
- H. vittula** Redt. n. s. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
- H. atra** Pk. obscurella Illig. s. h. überall auf Cruciferen.
- H. lepidii** Kch. s. h. ebenso.
- H. antennata** Koch. s. s. Lyck (Sanio).
- H. (Aphthona) cyparissiae** Koch. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
- H. lutescens** Gyll. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Stnr.), Neustadt (Fritzen).
- H. coerulea** Pk. h. auf Iris pseud. Cranz (Ltz.).
- H. hilaris** Steph. n. s. Kbg. (Czw.), Dz. (Helm, Fritzen).
- H. euphorbiae** All. g. auf Nadelholz.
- H. cyanella** Redt. n. h. Ggbg. (Kr.).
- H. violacea** Koch. s. Blaustein (Ltz.), Ktzn. (Czw.).
- Longitarsus echii** Koch. n. h. Sieb.
- L. Linnaei** Dft. s. Neustadt (Fritzen).
- L. anchusae** Pk. n. s. Rauschen (Ltz.).
- L. niger** Koch. s. wie Linnaei.
- L. ater** Fabr. parvulus Pk. g. auf Nadelholz.
- L. holsaticus** L. n. h. Kbg. (Ltz.).
- L. 4-pustulatus** Fabr. s. im Moose b. Kbg. (Ltz.).
- L. castaneus** Dft. s. F. F. (Czw.), Dz. (Helm).
- L. luridus** Scop. h. Wernsdorf (Ltz.).
- L. brunneus** Dft. h. wie castaneus.
- L. minusculus** Foudr. s. Neustadt (Fritzen).
- L. nasturtii** Fabr. n. h. Rosenau (Ltz.).
- L. thoracicus** Steph. All. s. Kbg. Plantage (Czw.), Neustadt (Fritzen).
- L. tabidus** Fabr. verbasci Pz. h. bes. auf Senecio Jacobaea (Ltz.).
- L. atricillus** L. s. h. bes. auf Lepidium ruderale (Ltz.).
- L. atricapillus** Dft. n. h. Lyck (Sanio) Kbg. (Sauter).
- L. melanocephalus** Deg. atriceps Kutsch.
- s. Dz.** (Dommer), F. F. (Czw.).
- L. lycopi** Foudr. s. wie thoracicus
- L. pusillus** Gyll. s. bei Nicolayken (Sanio).
- L. femoralis** Marsh. s. wie melanoceph.
- L. pratensis** Pz. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
- L. ochroleucus** Marsh. einmal 1875 in Menge gefangen, sonst nicht, Lyck (Sanio), Neustadt (Fritzen).
- L. laevis** Dft. h. Kbg. Pregelwiesen (Czw., Stnr.).
- Plectroscelis semicoerulea** Koch. s. Ktzn. auf Weiden an der Nogat (Czw.), Memel (Stnr.).
- P. concinna** Marsh. dentipes Koch. g. überall.
- P. aridella** Pk. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
- P. aerosa** Letzn. s. am Ufer d. Dammteichs Juni (Czw.).
- P. Sahlbergii** Gyll. s. ebenso.
- P. Mannerheimii** Gyll. s. s. Belschwitz (Kr.).
- P. aridula** Gyll. s. Putzig (Stf.), Lyck (Sanio).
- Psylliodes dulcamarae** Koch. h. Kbg. (Ltz.).
- P. chaleomerus** Illig. s. Kbg. (Czw., Ltz.), Neustadt (Fritzen).
- P. hyoscyami** L. n. s. Dz. (Ltz.).
- P. chrysoccephalus** L. h. Kbg. (Ltz.), Putzig (Stf.); die var. f. Thoms. einmal Kbg. (Ltz.).
- P. rapae** Illig. h. auf Raphanus, Dz. (Dommer).
- P. cupreus** Koch. n. h. auf Sisymbrium officinale, Kbg. Plantage (Czw.).
- P. marcidus** Illig. s. Pillau, auf Elymus arenarius (Eld.), Dz. (Helm).
- P. affinis** Pk. n. s. Kbg., Dz. (Czw.).
- P. attenuatus** Koch. n. s. bei Lyck (Sanio).
- P. piceus** Redt. s. Kbg. auf dem nassen Garten (Czw.), F. F. (Stnr.).
- P. luteolus** Müll. s. Neustadt (Fritzen).
- P. cucullatus** Illig. s. h. überall.
- Dibolia occultans** Koch. n. h. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
- D. Foersteri** Bach. Neustadt (Fritzen).
- D. depressiuscula** Ltzn. s. s. Lyck (Sanio).
- D. cryptocephala** Koch. s. Kbg. (Sauter, Ltz.), Dz. (Helm).

- D. cynoglossi* Koch. s. Ggbg. (Kr.).
D. rugulosa Redt. s. Kbg. (Czw.), Dz. (Helm).
Mniophila muscorum Koch. n. h. aus Moos von Margen (Sauter, Ltz.), F. F. (Czw., Stnr.), Vierbrkr. (Stnr.).
Sphaeroderma cardui Gyll. zuw. h. Loppehnen (Eld.), Lyck (Sanio).
Argopus hemisphaericus Dft. n. s. auf Trollius europ. Ramukwald b. Allenstein (Müller), auf Pulsatilla patens Lyck (Sanio).
Hispa atra L. s. s. Warnicken (Ltz.), lebt auf Rubus caesius.
Cassida murraea L. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
C. sanguinosa Suffr. n. s. Putzig (Stf.), Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
C. rubiginosa Illig. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
C. thoracica Fourc. s. s. einmal Osterode (Kug.), Elbing (Sieb.), Lyck (Sanio).
C. vibex Fabr. n. h. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
C. seladonia Gyll. s. s. Kbg. (Czw.), Dz. 1 St. als prasina bestimmt in der Dommerschen Sammlung.
C. chloris Suffr. *languida* Cornel. s. im Luckneiner Forst bei Nicolayken wahrsch. auf Cirsium arvense (Sanio).
C. stigmatica Suffr. h. wie vibex, Quednau, Dammhof, Räuschen (Stnr.).
C. denticollis Suffr. s. Dz. (Czw.), Cranzer Plantage (Ltz.).
C. sanguinolenta Müll. n. s. Kbg. (Ltz.).
C. oblonga Illig. s. Sanio (Lyck).
C. nobilis L. *viridula* Pk. n. s. Kbg. (Ltz.).
C. margaritacea Schall. s. s. Dz., Putzig (Stf.).
C. subreticulata Suffr. s. Ggbg. (Kr.), Neustadt (Fritzen).
C. nebulosa L. g. auf Kleefeldern.
C. ferruginea Fabr. n. h. wie vibex.
C. obsoleta Illig. s. h. Kbg. (Ltz.).
C. atrata Fabr. s. s. auf der Karbojin bei Lyck (Sanio).
C. equestris Fabr. h. Kbg. (Ltz.).
C. hemisphaerica Hbst. s. Zinten (Ltz.), Lyck (Sanio).

Erotylidae.

- Engis bipustulata* Fabr. s. in Schwämmen, Grebbiner Wald (Dommer), Kbg. (Andersch).
E. rufifrons Fabr. s. Dz. ebenso (Stf.).
E. humeralis Fabr. g. in Weidenschwämmen.
E. sanguinicollis Fabr. s. wie bipust.
Triplax russica L. n. h. Hirschau (Eld., Ltz., Stnr.), Ottominer Wald (Dommer), Pr. Eylau (Andersch).
T. aenea Schall. n. s. Fchstein, Zinten (Ltz.), Hlgbl. (Stur.).
T. rufipes Fabr. n. h. ebenso, Neustadt (Fritzen), im Buchenschwamm, Osterode (Kug.).
Tritoma bipustulata Fabr. n. h. in Buchenschwämmen Osterode (Kug.), Warnicken (Ltz.).

Endomychidae.

- Lycoperdina succineta* L. s. in Baumschwämmen, Putzig (Stf.), Weichselmünde (Helm), Rauschen (Ltz.).
L. bovistae Fabr. s. Stangenwalder Forst (Dommer), Rauschen (Ltz.).
Mycetina cruciata Schall. s. Osterode, im Polyporus suaveolens (Kug.); im Schwamm einer morschen Birke Masuren (Mühl), Neustadt (Fritzen).
Endomychus coccineus L. n. h. Warnicken (Ltz.), Kbg. in Holzgärten (Czw., Stnr.).
Mycetaea hirta Marsh. g. in Kellern auf Me ruli us lacrimans u. Schimmel (Czw.), Moosbude in morschem Eichenholz (Ltz.).
Alexia pilifera Müll. s. s. im Moose von Heub. (Stf.).

Coccinellidae.

- Hippodamia 13-punctata* L. g. in den Strandgegenden.
H. 7-maculata Deg. s. s. Kug. Sieb.
H. 11-notata Schnd. s. Neustadt (Fritzen) auf Disteln am Zarnowitzer See.
Anisosticta 19-punctata L. n. s. Kbg. (Ltz.).
Adalia obliterata L. *M-nigrum* Fabr. h. auf Nadelholz, Bludauer Forst (Ltz.).
A. bothnica Pk. h. ebenso.

- A. bipunctata** L. mit vielen Var. g. überall.
Coccinella marginepunctata Schall. s. am Luckneiner See (Sanio), Metgethen (Ltz.), Weichselmünde (Helm).
- C. impustulata** L. n. s. Kbg. (Ltz.), Lyck (Sanio).
- C. 14-pustulata L. n. s. ebenso.
 - C. variabilis Fabr. mit vielen Var. h.
 - C. undecimpunctata L. s. Kbg. (Ltz.).
 - C. hieroglyphica L. n. h. ebenso.
 - C. 5-punctata L. g. überall.
 - C. 7-punctata L. g. ebenso.
 - C. distincta Fald. labilis Muls. s. s. Neuhäuser (Hensche), Calvarienberg bei Neustadt (Fritzen).
- Halyzia oblongoguttata* L. h. auf Nadelholz (Ltz.).
- H. ocellata n. h. ebenso.
 - H. tigrina L. s. ebenso, Margen, Wernsdorf (Ltz.), Weichselmünde (Helm).
 - H. 18-guttata L. h. ebenso.
 - H. 10-guttata L. s. Masuren (Mühl.), Ggbg. (Kr.).
 - H. bis 7-guttata Schall. s. s. Kug., Sieb.
 - H. 16-guttata L. n. s. Ludwigsort (Ltz.).
 - H. 12-guttata Poda. n. s. ebenso.
 - H. 22-punctata L. s. im Holsteiner Park (Ltz.).
 - H. 14-guttata L. n. s. Kbg. (Ltz.).
 - H. conglobata L. 14-punctata L. g. überall.
- Micraspis* 12-punctata L. h. an Baumwurzeln, Margen (Ltz.), Dz. (Dommer, Frantzius).
- Chilocorus renipustulatus* Scrib. h. auf Nadelholz (Ltz.).
- C. bipustulatus L. h. ebenso.
 - Exochomus* 4-pustulatus L. h. ebenso.
 - E. auritus Scrib. s. Oliva (Czw.).
 - Hyperaspis* campestris Hbst. s. Vierbrkr. (Ltz.).
 - H. reppensis Hbst. s. Cranz (Ltz.).
 - Epilachna* globosa Schneid. g. überall.
 - E. 11-maculata Fabr. s. s. Osterode, nur einmal (Kug.), nachher nicht wieder.
 - E. impunctata L. h. Kbg. (Ltz.).
 - Novius* cruentatus Muls. s. s. einmal unter Kiefernrinde bei Dz. (Stf.).
- Platynaspis villosa* Fourer. s. Lyck (Sanio), Kbg. (Ltz.).
- Scymnus* 4-lunulatus Illig. s. Kug., Sieb.
 - S. Redtenbacheri Muls. s. s. Lyck (Sanio), Ggbg. (Kr.).
 - S. bipunctatus Kug. biverrucatus Pz. s. Kug., Sieb.
 - S. nigrinus Kug. n. s. auf Pappeln u. Nadelholz, Lyck (Sanio).
 - S. pygmaeus Fourer. parvulus Fabr. s. nur einmal auf Rosen, Osterode (Kug.), Sieb.
 - S. marginalis Rossi. s. Dz. (Dommer), Lyck (Sanio).
 - S. frontalis Fabr. affinis Redt. bisbisignatus Redt. n. s. Kbg. (Ltz.).
 - S. abietis Pk. h. ebenso, Dammhof (Stnr.).
 - S. discoideus Illig. h. auf Nadelholz (Ltz.).
 - S. analis Fabr. s. Kug., Sieb.
 - S. haemorrhoidalis Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.), Neustadt (Fritzen).
 - S. capitatus Fabr. n. s. ebenso.
 - S. ater Kug. h. wie discoideus.
 - S. minimus Rossi. s. Sieb.
 - Rhizobius litura* Fabr. n. s. an Weiden und Eichen (Kug.), Lyck (Sanio).
 - Coccidula scutellata* Hbst. n. h. Kbg. (Ltz.).
 - C. rufa Hbst. h. an den Wurzeln von Weiden an Gräben (Kug.), Kbg. (Ltz.), Glettkau zwischen Elymus arenarius (Czw.).
- ### Corylophidae.
- Sacium* (*Clypeaster*) pusillum Gyll. s. s. unter Baumrinde, Putzig (Stf.).
- Sericoderus lateralis* Gyll. s. s. ebenso, Kbg. (Stnr.).
- Corylophus cassidoides* Marsh. s. Ktzn. (Czw.), Kbg. (Eld., Ltz.).
- Orthoperus punctatus* Wank. s. s. Kbg. (Czw.).
- O. Klucki Wank. s. Ktzn. unter Heu am Rande eines Baches (Czw.) Artrechte? Seidl. Fn. Balt. 197; Berl. Ent. Z. XV. 140.
 - O. brunnipes Gyll. piceus Steph. g. in faulenden Pflanzenstoffen.
 - O. punctulum Marsh. atomarius Heer. s. s. Rastenbg. (Czw.).

Während des Druckes dieser Arbeit gingen mir von Hrn. Calculator Fritzen in Neustadt (Westpr.) sehr schätzenswerthe Notizen und Beiträge zu, die ich nur zum Theil für dies Verzeichniss habe benutzen können. Die unmittelbare Nähe bedeutender Forsten (Darzluber und Piekelkener Forst), ferner der grosse Zarnowitzer See bieten dem Manne vortreffliche Gelegenheit, und seine sehr anerkennenswerthe Energie trägt zum Erfolge erfreulich bei.

Das nachzutragende ist folgendes: *Dromius melanocephalus* Dej., *Helophorus aeneipennis* Thoms., *Hydraena flavipes* St., *Cercyon aquaticus* Muls., *Gyrinus natator* L. var. *marginatus* Germ., alles bei Neustadt u. Danzig gefunden; *Anchomenus longiventris* Mannh. aus einer vom Sturm umgebrochenen Esche bei Ponarth bei Kbg. 7 St. (Fritzen).

Aber auch andere Sammler haben nicht gefeiert, von ihnen ist das Verzeichniss mit folgenden seltenen Arten bereichert: *Platystethus capito* Heer. Kbg. (Ltz.); *Synchita Mediolanensis* Villa. 1 St. Gelguhnen bei Allenstein (Ltz.); *Apion meliloti* Kirb. Kbg. (Ltz.); *Magdalinus coeruleipennis* Desbr. (fehlt bei Stein u. Weise) 2 St. mit *violaceus*, Löwenhagen (Ltz.); *Quedius picipes* Mannh. unter Buchenlaub bei Pelonken (Czw.); *Q. fumatus* Steph. *peltatus* Er. Schwedendamm bei Oliva u. Pelonken (Czw.); *Epuraea melanocephala* Marsh. im königl. Garten von Oliva (Czw.); *Agaricophagus cephalotes* Schm. Dz. Rheda u. Conradshammer (Czw.); *Stenus coxalis* I. Sahlb. bisher nur aus Finnland be-

kannt, mehrfach bei Dz. (Czw.) nach einem typ. Stücke durch Eppelsheim bestimmt; *Hygropora cunctans* Er. Dz. (Czw.); *Homalota villosula* Kraatz. ebenso. *Ceuthorh. Sahlbergi* Schh. Ggbg. (Kr.); *Calodera protensa* Er. s. Kgb. (Czw.). Auffallend ist der Fund eines lebenden Stückes von *Ochina hederae* Müll. in einem Zimmer, das einige Töpfe mit Epheu enthielt (Künow). Da der Epheu aber in manchen unserer Wälder sogar recht reichlich vertreten ist (ich erinnere nur an den Wald bei dem sog. Ziegenhals bei Elbing), so ist die Möglichkeit eines weiteren Vorkommens jenes Käfers nicht ausgeschlossen.

Das Resultat ist nun, dass wir in unserer Fauna 3255 Arten von Coleopteren haben, d. h. annähernd $\frac{1}{4}$ von den Europ. bei Stein u. Weise verzeichneten 14621 Arten, genauer 0,223. Von den grösseren Familien haben bei uns die meisten Repräsentanten: die Coccinellidae $\frac{125}{325} = 0,424$, die Wasserkäfer $\frac{110}{325} = 0,369$, die Nitidulidae $\frac{85}{325} = 0,348$, die Staphylinidae $\frac{84}{325} = 0,322$; die übrigen stehen tiefer, am niedrigsten die Tenebrionidae $\frac{44}{325} = 0,042$. Es fehlen uns nur die auch in Europa nur durch sehr wenige, mitunter durch eine einzige Art repräsentirten Familien der Paussidae, Rhysodidae, Derodontidae, Thorictidae, Cebrionidae, Rhipiceridae, Brentidae, Platypsyllidae.

Möchte meine Arbeit zu weiterem Forschen in bisher unberührten Gegenden Preussens veranlassen; es wird sicherlich nicht vergeblich sein!







3 2044 114 229 990

Date Due~~NOV 14 1951~~~~SEP 8 1952~~~~JUN 14 1953~~~~DEC 4 1955~~~~MAY 15 1963~~~~SEP 4 1968~~~~MAY 1976~~

